

ABE
0075

www.libtool.com.cn

ABE
0075

www.libtool.com.cn

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.

No. 13,863

22 May, 1897

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

MAY 22 1897

www.libtool.com.cn



L'ABEILLE
JOURNAL D'ENTOMOLOGIE

FONDÉ EN 1864 -

ET RÉDIGÉ PAR

S. DE MARSEUL

**Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes
nationales et étrangères**

*Nomina si variant, scientia perit,
traditione perstant!*

TOME XXII — 1884

QUATRIÈME SÉRIE — TOME IV

**Y
CHEZ**

**MM. S. de MARSEUL, boul. Pereire sud, 271, Ternes-Paris
RORET, libraire, rue Hautefeuille, 12, Paris.**

www.libtool.com.cn

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES DU XXII^e VOLUME

www.libtool.com.cn

NOUVELLES ET FAITS DIVERS, 2^e série, Nos 49-50, p. 193-200 :

Compte-rendus : Casey : Coléoptérologie des Etats-Unis, p. 194 ;
— Horn : Synopse des Anomala et des Notoxus des Etats-Unis,
p. 194 ; — Sénac : Monographie du genre Pimelia, p. 198 ; —
Société d'Hippone, Bulletin N^o 19, p. 198.

Ouvrages reçus : p. 196, 199.

Synonymies : p. 194, 198.

Nécrologie : Wehncke, Fähreus, Schiœdte, Heer, p. 196 ; — Hampe,
Chabrier, Chevrolat, Mors, Lartigue, p. 200.

Abonnements à l'ABEILLE : p. 195, 198, 199.

Correspondance : p. 195, 199.

Annonces et rectifications : p. 194.

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN-MONDE : Brachélytres Clavicornes, Paussides, Clavigers, Psélaphes, Scydménaes, Silphes, p. 145-168.

LES ENTOMOLOGISTES ET LEURS ÉCRITS, p. 121-144 :

Olivier, p. 121.

Le Conte J.-Eatton, p. 124.

Le Conte J.-Lawrence, p. 124.

Schœnherr, p. 136.

Ménétrières, p. 137.

Faldermann, p. 140.

Boheman, p. 141.

RÉVISION DES LAMPYRIDES, p. 1-56, 2 planches :

Lampyres, p. 4.

Phosphènes, p. 38.

Lucioles, p. 44.

Catalogue, p. 55.

Explication des figures, p. 56.

Note complémentaire, p. 1-4.

PRÉCIS DES SILPHIDES DE L'ANCIEN-MONDE, p. 1-204 :

Leptoderi, p. 5.

Leptini, p. 20.

Catopsi, p. 28.

Silphi, p. 139.

Table alphabétique des genres et espèces, p. 199.

NOUVEAU RÉPERTOIRE III, p. 1-86 :

VI. Clavicornes : Anisotomes, p. 1 ; — Clambides, p. 41 ; — Corylo-
phes, p. 53 ; Ptiliens, p. 60 ; Histérides, p. 64.

www.libtool.com.cn

NOUVELLES ET FAITS DIVERS DE L'ABEILLE

DEUXIÈME SÉRIE — N° 49 — 1884

Bibliographie (Suite).

La grande République des Etats-Unis vient de perdre le plus illustre de ses entomologistes, le Dr J.-L. Le Conte, dont nous déplorons tous la fin prématurée, et déjà surgissent de nouveaux émules. M. Thos. L. Casey publie un Mémoire important sur les Coléoptères du nord de l'Amérique, sous le titre modeste d'essai : *Contribution to the descriptive and systematic Coleopterology*. — Ce travail, que l'auteur a eu l'amabilité de nous offrir, comprend 60 pages avec une planche. Nous y trouvons des descriptions détaillées de nombreuses espèces nouvelles : dans les Carabiques, 2 *Pterostichus*, 4 *Amara*, 1 *Anisodactylus*, un genre nouveau (*Amerinus*) basé sur le *Bradycellus linearis* Le C., 1 *Bradycellus*, 9 *Harpalus*, 1 *Selenophorus*, 1 *Stenolophus*, 1 *Bembidium* et 1 *Tachys*; dans les Brachélytres, 2 nouveaux genres : *Tithanis* et *Emplenota*, chacun avec une espèce, 10 *Euessthetus*, 3 *Edaphus*, 1 *Tychus* et 2 *Bryaxis*; dans les Clavicornes, 1 *Carpophilus*, 1 *Epuræa* et 2 *Ennearthron*; dans les Lamellicornes, 1 *Lachnosterna*; dans les Hétéromères, 6 *Eurymetopon*, 1 *Emmenastus*, 1 *Coniontis*, 1 *Eleodes*, 3 *Platydema*; dans les Phytophages, 2 *Disonycha*, 1 *Chætocnema*, 2 *Psylliodes* et 2 *Tyloderma*. Les entomologistes qui s'occupent de Coléoptères exotiques ne peuvent se dispenser de consulter ce livre. Nous offrons à M. Casey nos sincères remerciements.

Le Dr George H. Horn marche à la tête de cette pléiade d'entomologistes qui exploitent les riches productions de cette vaste contrée, et ne cesse de publier le fruit de ses recherches sur différents groupes, sous titre de Notes, de Synopses, etc. Aujourd'hui, c'est un Mémoire sur les espèces du genre *Anomala* (3 sous-genres et 12 espèces dont une nouvelle); puis une Synopse des *Notoxus* et

Mecynotarsus, l'un compte 13 espèces dont 3 nouvelles : *nuperus*, *calcaratus*, *denudatus* ; l'autre 3 espèces dont une nouvelle : *delicatulus*. A ces deux Mémoires, extraits des *Annales de la Société entomologique de l'Amérique du Nord* (1884, p. 157-176), sont jointes les Notices biographiques si intéressantes sur notre ami le Dr J.-L. Le Conte, qu'il a publiées, de concert avec M. Lesley, sur sa vie intime et sur ses travaux entomologiques (1883, p. 291-299) accompagnées d'un beau portrait : nous lui sommes reconnaissant de ce précieux souvenir.

* *

Le Rév. M. A. Matthews, si connu par sa savante Monographie des Trichoptérygiens, prépare une autre Monographie tout aussi difficile, celle d'un groupe voisin, les CORYLOPHIDES, et il se propose non-seulement de classer toutes les espèces du globe, d'après leurs caractères extérieurs, mais d'étudier, comme il l'a fait pour les premiers, l'anatomie interne de ces coléoptères quasi-microscopiques. Il recevra avec plaisir toutes les espèces qu'on voudra bien lui communiquer, et les renverra déterminées avec le plus grand soin. (Rev. A. Matthews, rector of Gumley, Market Harborough, Angleterre.)

* *

Rectifications synonymiques sur les Longicornes.

(SUITE — Voir N° 48)

- Neodorcadion Abeillei Tourn. = var. *laqueatum* Waltl.
 — inclusum Ferrari = *exornatum* Friv.
 Parmena algerica Cast. = var. *pubescens* Dalm.
 — inclusa Muls. = var. id.
 — hirsuta Küst. = var. id.
 — pilosa Brul. = var. id.
 Pogonocherus ovalis Gmel. - scutellaris Muls. - multi-
 punctatus Georg = *ovatus* Fourc.
 — hispidus L. = *fasciculatus* De G.
 Belodera obliquetruncata Rosh. - Foudrasi Muls. = *Genei*
 Arrag.
 Liopus constellatus Muls. = ♀ *femoratus* Fairm.
 Astynomus Edmondi Fairm. = *xanthoneurus* Muls.
 — sibiricus Mots. = *carinulatus* Gebl.

- Agapanthia granulosa Chev. = var. *irrorata* F.
 — nicæensis Chev. = var. id.
 — pubiventris Muls. = var. id.
 — Reyi Muls. = *annularis* Muls.
 — insularis Gaut. = *asphodeli* Latr.
 — cardui F. - lineatocollis Muls. - Gyllenhali
 Ganglb. = *Dahli* Richt.
 — decora Kryn. = *cynaræ* Germ.
 — acutipennis Muls. - pyrenæa Bris. = var. *cynaræ* Germ.
 — trivittata Gebl. = *maculicornis* Gyl.
 — suturalis Muls. = *cardui* Lin.
 — Peragalloi Muls. = var. *cardui* Lin.
 — consobrina Chev. = var. id.
 — Osmanlis Reiche = *chalybea* Fald.

Ont réglé leur abonnement à L'ABEILLE, MM. Bellevoye, Binot, Croissandeau, Desbrochers, Eyquem, Gandolphe, Leveillé, Maisonneuve, Mason, Mayet, Ragusa, Renaud, de Saulcy jusqu'au n° 288, Friedlander jusqu'à 292, Leprieur jusqu'à 298, Oberthur jusqu'à 300, Fleutiaux, jusqu'à 301; Martínez jusqu'à 312, et Warnier jusqu'à 316.

Nous prions les abonnés en retard de régler tout de suite leur abonnement; sinon, dans la quinzaine, nous leur adresserons par la poste une facture augmentée d'un franc pour frais d'encaissement.

Une erreur s'est glissée sur la couverture de la 283^e livraison. Au lieu de Chrysomélines (5) pag. 97-120, il faut lire 97-108 : la suite n'est pas encore imprimée.

Correspondance. — MM. Del., à Bernay : envoyé livr. 283; pris note de l'adresse. — R., à Turin : Feuilles réclamées antérieures à votre abonnem. — M., à Gumley : Note dans le Bul. Soc. entom. de France et Nouvelle 49', demandant *Corylophides* en communication; recevrez bientôt les miens. — M., à Angers : L'ABEILLE vous sera envoyée en volumes. — L., à Reims : Reçu lettre et mandat. — H., à Francfort : Reçu mandat; *Saprinus* réclamés sont ici, à votre disposition. — G., à Angoulême : Envoyé par poste, en 2 paquets, catal. étiquettes. — U., à

Madrid : Envoyé poste n° 280 et reçu de M. Buquet. — M., à Madrid : Inscrit votre abonnement. — R., à Palerme : Reçu carte et mandat. — D'O., à Coïmbre : Votre lettre perdue, l'affaire est-elle sans espoir? Votre abonnement va jusqu'à 288.

www.libtop.com.cn

Ouvrages reçus.

Annales de la Société entomologique de France. 6^e série, III, 3^e trimestre 1883, p. 273-384; (31 janv. 84); Bul. p. LXXXI-CLII; Bedel Rhynchophores p. 65-80; Bibl., p. 33-64, pl. 3.

Wiener Ent.-Zeit. n° 1. p. 1-32, et 2, p. 33-64, 1884. 3^e année.

Société française d'entomologie : Revue 1844, III, n° 1, p. 1-20, pl. 1. et n° 2, p. 21-52, Catalogue de la Bibliothèque, p. 1-8.

Ent. Monthl. Mag. 1844 : févr., n° 237, p. 193-216; mars, n° 238, p. 217-240; avril, n° 239, p. 241-264.

P. de Borre : Les Méloïdes de l'Europe centrale (Extr. du Bul. Soc. Linnéenne de Bruxelles) 1884. p. 14.

Bulletin de l'Académie d'Hippone — Bul. 20, fasc. 1. 1884. in-4° p. 36. 2 pl.

Nécrologie.

Ernest Wehncke, né à Hambourg, le 16 mars 1835, décédé à Harbourg le 19 novembre 1883, s'appliquait spécialement aux Hydrocanthares et autres coléoptères aquatiques.

O.-J. von Fähreus, conseiller d'Etat, le Nestor des Entomologistes, membre de la Société entomologique de France depuis 1833, est décédé à Stockholm le 28 mai 1884, à l'âge de 88 ans.

Jean Schiødte, membre de l'Académie des sciences de Danemarck, directeur du Musée zoologique de l'Université, directeur du « Naturhistorisk Tids Schrift », à Copenhague, membre honoraire de la Société entomologique de France depuis 1874, décédé dans les premiers jours de juin 1884, à l'âge de 69 ans.

Oswald Heer, né le 31 août 1809 à Nieder Utzwil, près de St-Gall, professeur de botanique et d'entomologie à l'Université de Zurich depuis 30 ans, est décédé dans cette ville le 27 septembre 1884.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS DE L'ABEILLE

DEUXIÈME SÉRIE — N° 50 — 1885

Bibliographie (Suite).

1. *Essai monographique sur le genre PIMELIA*, par le docteur Sénac. 1^{re} part. in-8° pag. 106. — Dans ses *Col-laptérides*, Solier avait publié une Monographie de ce groupe (Annales Soc. ent. Fr. 1866), qui passait à juste titre pour un bon ouvrage ; mais c'était le premier pas et les matériaux n'étaient ni assez nombreux ni de provenance bien certaine. Vingt années de recherches avaient rendu nécessaire une révision des espèces accumulées dans les collections. Le docteur Kraatz en avait essayé dans ses *Beiheft* appelés à rendre de véritables services aux coléoptéristes, mais aussi éphémères que sa *Monats-blatter*, et le genre restait, au bout de vingt ans, dans un véritable chaos, je ne dirai pas inextricable, mais très difficile à débrouiller. C'est ce que vient d'entreprendre notre savant ami le docteur Sénac, et si nous en jugeons par cette première partie qui est sous nos yeux, il nous paraît y apporter la lumière. 55 espèces y sont décrites avec clarté et précision, mais encore, ce nous semble, avec trop d'étendue, quoique bien loin de ces détails fastidieux, interminables, au milieu desquels le lecteur se perd comme dans un dédale, sans avoir pu saisir les caractères différentiels de l'espèce, si tant est que l'auteur lui-même les ait soupçonnés. L'ouvrage commence par un exposé sobre des caractères du genre, et par un tableau synoptique des espèces aussi rigoureux que peut le permettre une réunion de semblables insectes. Nous n'avons pas rencontré de caractères sexuels bien saisissables, et nous le regrettons. L'étude consciencieuse et longue que le docteur Sénac a faite de son sujet, la comparaison réitérée des types authentiques de Solier que nous lui avons communiqués avec empressement, sont un sûr garant que cette Monographie sera menée à bonne fin et

rendra un véritable service aux coléoptéristes qui semblent en ce moment se préoccuper des insectes du nord de l'Afrique.

La Société d'Hippone, qui ne semble consacrée qu'à des travaux épigraphiques, nous donne, dans son Bulletin N° 19 (p. 192 et CLXVIII et supplément 28 pages) un mémoire assez étendu (p. 71-171) sur les Coléoptères et principalement sur les Curculionides de M. Desbrochers des Loges, l'entomologiste bien connu, et depuis longues années, des lecteurs de l'ABEILLE. Nous n'avons ni le temps ni l'espace pour en rendre compte ; il nous suffira de dire qu'il traite surtout des *Sitones*, *Polydrosus*, *Scythropus*, *Tanymecus*, *Thylacites*, *Cleonus*, *Apion*, *Orchestes*... , dont il décrit près de 50 espèces, la plupart nouvelles et algériennes.

* * *

Rectifications synonymiques sur les LONGICORNES.

(Suite — Voir N° 49.)

- Saperda maculosa Fald. = *scalaris* L.
 — carinata Blessig. = *16-punctata* Mots.
 Oxyilia languida Mén. - vestita Waltl. - argentata Mén.
 = *Duponcheli* Brul.
 Mallosia Kotschy Hampe = *mirabilis* Fald.
 Phytœcia excelsa Stierl. = *millefolii* Adams, Stev.
 — insignita Chvl. = *humeralis* Waltl.
 — fumigata Küst. - orbicollis Reiche = *flavescens*
 Brul.
 — flavipes Gyl. Küst. = *Bœberi* Gangl.
 — alboscuteolata Chvl. = var. *Wachanrui* Muls.
 — Jezabel Reiche = var. *Wachanrui* Muls.
 — flavimana Panz. = *rufimana* Schranck.
 — Baccueti Brul. = var. *rufimana* Schranck.
 — fuscicornis Muls. - orientalis Kr. = *geniculata*
 Muls.
 — simplonica Stierl. = *cylindrica* L.
 — obscura Bris. = *nigricornis* F.
 — Bolivari Per. Arc. = ♂ *malachitica* Luc.

* * *

Ont réglé leur abonnement à l'ABEILLE : MM. Barbat, Gambey, Grouvelle Ant., Mabile, jusqu'à 288 ; Eyquem,

jusqu'à 294 ; Carrara jusqu'à 297 ; Belon, Chardon, Desbrochers, Guédél, Guède, Hervé, Jullien, d'Orfeuille, de la Perraudière, Mario Rey jusqu'à 300 ; Valla jusqu'à 302, Lamey jusqu'à 308, Cepero, Ducoudré, Heyden, La-joye, Lethierry, Madon, d'Oliveira, Philibeaux jusqu'à 312.

* * *

Nouveaux abonnés à l'ABELLE, MM. :

- | | |
|--|---|
| <p>9^e Philip Brokes Mason, à Burton-on-Trent.</p> <p>10^e Gaston Eyquem, à Bordeaux.</p> <p>11^e J. Desbrochers-des-Loges, à Ardentes.</p> <p>12^e D. Croissandeau, à Orléans.</p> <p>13^e L. Carrara, à Lucques.</p> | <p>14^e F. Hermias, à Haïti.</p> <p>15^e A. Seyrig, à Paris.</p> <p>16^e H. de Saint-André, à Paris.</p> <p>17^e Borrani, à Paris.</p> <p>18^e d'Orfeuille, à Versailles.</p> <p>19^e Guède, à Paris.</p> |
|--|---|

* * *

Correspondance. — MM. C., à Lucca : *Asida* et *Endomychides* sont-ils arrivés ? — H., à Morlaix : Tout prêt à déterminer Hister. — O. Coïmbre : Merci carte et envoi. — G., à Nice : Doubles feuilles Entom. sont-elles retrouvées ? — L., à Elbeuf : Trop en avant pour abonnement ; tout disposé à examiner insectes ; merci des renseignements. — M., à Nava del Rey : Avez-vous reçu les feuilles réclamées et les tomes xvii-xix ? — B., à Châlons : Billet complète les 288 livr. parues en 1884. — F., à Bologne : Reçu mandat ; tout au mieux. — G., à Asnières : 7^e feuille Catalogue pour prochaine livr. — L., à Gray : Toujours à votre disposition. — G., à Southampton : Impossible de quitter Paris ; répondrai à loisir ; trop engagé en ce moment.

* * *

Ouvrages reçus.

- Courtes études des Coléoptères de l'Amérique du Nord, N° 2, par J.-L. Le Conte. (Extr. du Trans. Amér. Ent. Soc. xii. 1884. p. 1-32.)
- Synopsis des Philonthi de l'Amérique boréale, par George H. Horn. (Extr. des Trans. Amér. Ent. Soc. xi. 1884. pag. 177-244.)
- Etude de quelques genres d'*Elateridæ* de l'Amérique boréale, par G. Horn. (Extr. Amér. Ent. xii. p. 33-52.)
- Note sur les *Chrysomela* et Notes synonymiques par G. Horn. (Ext. Ent. Canad. p. 127 et 147.)

Observations sur *Chalicodoma muraria*, *Megachilus centuncularius* et *Osmia bicornis*, par Ad. Bellevoye. (Soc. Hist. nat. Metz. xvi. 1884. p. 81-99. Photogr.)

Énumération des Buprestides décrits postérieurement au Catalogue de Munich, par Ch. Kerreman. (Soc. ent. Belg. xxviii. 1884. p. 119-157), et Description d'une nouvelle espèce de Buprestide, par Ch. Kerreman. (Id. 1883. p. 2.)

Supplément et rectifications au Catalogue de Munich, sur la famille des Histérides, par J. Schmidt. (Berl. Zeits. xxviii. 1884. p. 147-160.)

Remarques sur le *Catalogus Coleopterorum Europæ* Auct. Heyden, Reitter et Weise, par E. Bergroth. (Berl. Zeits. 1844. p. 225-230.)

*
*
*
Nécrologie.

Clément Hampe, né à Luschwitz (Bohême), en 1802. décédé à Vienne, le 20 juillet 1884, docteur-médecin, attaché à la personne du prince de Liechtenstein, connu par ses découvertes d'insectes curieux.

Jules-Hubert Chabrier, né le 3 mai 1791 et décédé à Aix-en-Champagne dans le courant de 1884, laisse une belle collection d'insectes de tous les ordres, récoltés en grande partie par lui-même.

Louis-Alexandre-Auguste Chevrolat, né à Paris le 19 mars 1799, décédé à Paris le 16 décembre 1884, membre fondateur et honoraire de la Société entomologique de France et de plusieurs autres Sociétés savantes, connu par ses relations avec les entomologistes du siècle, sa nombreuse et typique collection, ses descriptions si multipliées de coléoptères, etc.

Louis Mors, décédé à Paris le 16 décembre 1884, ingénieur belge, membre fondateur de la Société entomologique de Belgique, de la Société entomologique de France depuis 1859.

Henri-Marie-Michel-Auguste Lartigue, décédé à Passy-Paris le 17 novembre 1884, à l'âge de cinquante-quatre ans, directeur de la Société générale des Téléphones, chevalier de la Légion-d'Honneur, membre de la Société entomologique de France depuis 1866.

Zonoptilus Mots.

- 2 piceus Solsky Ab. 5. 279 R.
 v Schuberti Mots. Ab. 16. 84.
 3 pennifer Mots. Ab. 4. 180 R.
 4 lateralis Fvl. Cat. 8. R^sSib.
 pennifer Solsky Turk. 71. 206
 5 sellula Kr. 894 Mésop.

301. PLANEUSTOMUS Duv. Rey.**Compsochilus** Kr.

- 1 cephalotes—Er. 817 Crète.
 miles Scrib. Rép. 382 IGR.
 2 procerus Eppel Wien. 80. 211 Dalm.
 3 Kahri Kr. Rey 229 Fvl. 128 F^sDalm.
 4 palpalis—Er. 318 Rey 232 BSFAI.
 5 elegantulus Kr. 896 Crète.
 6 Rossii Rtr. Deuts. 84. 105 Zante.
 7 africanus Fairm. Fr. 60. 338 Bône.
 8 curtispennis Fvl. Rép. 383 Alg.
 9 flavicollis Fvl Rép 384 Rey 234 Belg.
 10 Weberi Quedf. Berl. 82. 183 Maroc.
 11 filiformis Quedf. Berl. 82. 183 E.
 12 macellus Kr. Rép. 384 E.

302. ACROGNATHUS Er. Rey.

- 1 mandibularis—Gyl. Er. 817 Rey 237
 [Eur. Alg. Sib.]

303. DELEASTER Er. Rey.

- 1 dichrous—Grv Er 819 Rey 378 Eur As^o.
 Leachi Curt.
 brassicæ Schrank.
 v adustus Bielz.
 Erichsoni Hch. Msc. 51'. 57 R^s.

OMALIDÆ**304. ANTHOPHAGUS** Grav. Rey.

- 1 spectabilis Heer Rey 24 Fvl. 118 FA.
 ? picipennis Gredl. Tyr. 468.
 2 armiger—Grv. Er. 848 Rey 13 BSFAI.
 bicornis Block Fvl. 118.
 v nivalis Rey Alp.
 3 apenninus Baud. Rép. 385 Fvl. 119
 [Apen.]
 4 muticus—Ksw. Rey 27 Fvl. 120 Pyr.
 5 scutellaris Er. 851 Rey 43 F^sTyr.

- 6 forticornis Ksw. Fvl. 118 AHelv.

- 7 æneicollis Fvl. Sup. 13 Rey 17 F^s.

- 8 alpestris—Heer Rey 37 Fvl. 115 Alp.

austriacus Er. 849.

transversus Mots.

- 9 pyrenæus—Bris. Rép. 385 Rey 22 Pyr.

- 10 alpinus—Pkl. Er. 848 Rey 19 BSFAI.

mandibularis Gyl. Alp. Vosg.

♂ maxillosus Zett.

lapponicus Sahl.

flavipennis Lacd.

- 11 sudeticus—Ksw Rey 35 Fvl. 122 Alp A.

- 12 fallax—Ksw. Rey 35 Fvl. 122 Alp AI.

v carinthiacus Rey Carint.

- 13 omalinus—Zett Er. 849 Rey 40 BSFAI.

alpinus Sahl. Sib.

- 14 melanocephalus—Heer Rey 32 FAI^s.

- 15 Schneideri Eppel Led. 125 Cauc.

- 16 caraboides—LEr 850 Rey 29 BSFAI R.

fulvus Deg. Sib.

testaceus Lacd.

abbreviatus F. Er. 850.

angusticollis Manh.

Hoockeri Steph.

gracilis Heer.

obscuripes Mots.

- 17 testaceus—Grv. Er. 851 Rey 46 Eur.

palustris Heer.

caraboides Sahl.

- 18 rotundicollis—Heer Rey 51 Fvl Sup 30

brevicornis Ksw. Fvl. 113. [Alp.]

crassicornis Muls. Op. XII. 179.

- 19 præustus Mulr. Er. 852 Rey 48 FAI.

bimaculatus Lacd.

- 20 arpedinus Hoch. Mosc. 49. 201 R^s.

- 21 æmulus—Rosh Rey 64 Fvl 113 Alp Tyr.

cenisius Fairm.

Geodromicus Redt.

- 22 plagiatus—F. Er. 852 Rey 56 Eur. Sib.

suturalis Lacd.

v nigrita Mulr. Fvl. 108 Eur. Sib.

anthracinus Bris.

v lituratus Kr. Fvl. 108 Alp. Tyr.

v marginatus Fvl. 109 Cauc.

v major Mots Hoch Mosc. 62'. 102.

- v globulicollis* Zett. Rey 59.
flavipes Mots.
puncticollis WeiseBerl.75.364.
 ♂ *longipes* Manh.
v curtipennis Fvl. 110 Alp.
litturatus Fvl.
- 23 *brevicollis*-Fvl. Cat. 7. Cauc.
 Kunzei Hoch. Mosc. 49. 202.
- 24 *latiusculus*-Eppel Led. 126 Cauc.

305. LESTEVA Latr. Rey.

- 1 *nigra*-Kr. 934 Sic.
nivicola Fvl.
- 2 *Villardi* Rey 413 Drôme.
- 3 *pubescens*-Manh. Er. 856 Rey 66
v subaptera Rey. [BSFAI.
- 4 *fontinalis*KswRey69Fvl102FAAlg.
major Muls. Rép. 388 M^cPilat.
omissa Rey 71 Corse.
- 5 *luctuosa* Fvl. Rép. 387 F^c.
curvipes Muls. Rey 78.
- 6 *bicolor*-F. Er. 855 Rey 72 EurCauc.
longelytrata Goeze Fvl. 104.
punctulata Latr.
obscura Payk.
intermedia Grav.
dimidiata Panz.
staphylinoïdes Marsh.
multipunctata Block
oblonga Mots.
- v maura* Er. 856 S.
- v longula* Manh. Er. 857 F.
- 7 *Pandellei* Fvl. Rép 387 Rey 79 F^c.
*lepontia*BaudiBerl69.401AlpI^a.
- 8 *cordicollis*-Mots. Msc. 60.549 Balc.
- 9 *monticola* Ksw. Er. 783 Rey 75 BFA.
collina Halid.
Sharpi Rye MM. 3. 224.
- 10 *corsica*-Per. Ab. 7.8. Fvl. 103 Corse.
- 11 *punctata*-Er. 837 Rey 82 BFAI.
riparia Heer 193.
muscorum Duv. Glan. 37.
v villosa Waltl.
- 12 *sicula* Er. 857. BSFA.
Heeri Fvl. 106 Rey 84.

306. ACIDOTA Manh. Rey.

- 1 *crenata*-F. Er. 861 Rey 104 Eur^m méd.
castanea Grav. Sib.
rufa Manh.
pulchra Mots. Mosc. 57. 493.
seriata Le C. Amér^a.
- 2 *balcalensis* Mots. Mosc. 60.549 Sib.
- 3 *cruentata*-Manh. Er. 862 Rey 107
rufa Gyl. n. 228. [BSFA.
- 4 *ferruginea* Lacd. Er. 862 Lap. Sib.
quadrata Zett. Fvl. Sup. 89.

307. OLOPHERUM Er. Rey.

- 1 *piceum*-Gyl. Er. 864 Rey 135 BSFA.
blattoïdes Ahrens.
- 2 *fuscum*-Grv. Er. 865 Rey 138 EurSib.
laticolle Sahl. 211 Finl.
- 3 *caucasicum* Fvl. Cat. 7 Cauc.
- 4 *rotundicolle*-Sahl. Er. 866 SRFinl.
- 5 *consimile*-Gyl. Er. 867 Fvl. 99 BS.
 [ARSib.
- 6 *alpinum*-Heer Rey 141 Fvl. 99 FA.
alpestre Er. 867. [AlpPyr.
- 7 *boreale*-Pkl. Er. 866 SRSib.
- 8 *assimile*-Pkl. Er. 865 Rey 139 SFAR.
- 9 *puncticolle*EppI Wien 80. 212 Hong.
- 10 *nigropiceum* Mots. Ab. 16. 82 Kamts.
- 11 *limbatum* Mækl. 76. 299 Sib.
v Mækluni Heyd.
alpestre Gebl.

308. LATHRIMÆUM Er. Rey.

- 1 *melanocephalum*-Illg Er 869 Rey 125
atrocephalum Heer 181. [FAI.
- 2 *luteum*-Er. 869 Rey 122 BFAE.
unicolor Marsh. Fvl. 93.
- 3 *atrocephalum*-Gyl. Er. 870 Rey 128 F.
melanocephalum Marsh. 127.
- 4 *fusculum* Er. 870 Rey 131 Eur. Alg.
 ? *Baudii* Kr. Rép. 389.
- 5 *macrocephalum* Epls. Stet. 73. 86
 Alp. Pyr.
- 6 *prolongatum* Rottb. Berl. 73. 203 A.
- 7 *fratellum* Rottb. Berl. 74. 330 G.
libanicum Fvl. Cat. 6 Liban.

309. AMPHICHRUM Kr. Rey.

Heterops Esch. Er.

- 1 canaliculatum—Er. 871 Rey 96 FAI.
 ♂ dentipes Heer.
 ♀ tenuipes Heer.
 2 hirtellum Heer Rey 99 FA.
 3 ruficeps Mots. Mosc. 60. 547 Sib.

310. DELIPHEUM Er. Rey.

- 1 tectum—Pkl. Er. 872 Rey 117 BSFAR
 læve Grav. 211.
 2 algidum Er. 874 Rey 115 FA.
 3 crenatum Grv. Er. 873 Rey 112 BFAI
 4 divergens Mækl. 77. 301 Sih.
 5 arcticum Er. 873 LapTyrSib.
 affine Mækl. 76. 303.
 confusum Mækl. 76. 303.
 saginatum Mækl. 76. 304.
 6 frigidum Sahl. 80. 108 Sib.

311. OROCHARES Kr. Rey.

- 1 angustatus—Er. 874. Rey 91 FA.

312. ARPEDIUM Er. Rey.

- 1 macrocephalum Eppel Rey 150 Fvl.
 [FTyr.
 2 quadrum—Grv. Er. 858 Rey 147
 castaneum Rund. Sib. [Eur^{méd.}
 piceum Zett.
 consimile Heer.
 Heydeai Heer 190.
 v alpinum Fvl. Rép. 389 Alp.
 3 troglodytes—Ksw Rey 152 Fvl 187 BAlp
 brachypterum Hardy.
 v engadinicum Heyd. Helv.
 4 brachypterum—Grv. Er. 859 Rey 151
 impressum Zett. [SAHelv.
 5 puncticolle Sahl. Sib. 106 Sib.
 6 Gyllenhalii Zett. Fvl. 88 S.
 brunnescens Sahl Fen 70. 423 Sib.
 7 limbatum Gebl. Mosc. 48. 80 Sib.
 8 sibiricum Manh. Er. 860 Sib.

313. PYCNOGLYPTA Thoms. Rey.

- 1 sibirica Mækl. 76. 300 Turk.
 2 lurida—Gyl. Er. 889 Rey 271 SFAⁿ.
 alpina Zett. Fn. Lap. 1. 52.

314. MICRALYMMA Westw. Rey.

- 1 Dicksoni Mækl. 76. 300 Sib.
 2 brevipenne—Gyl. Er. 820 Rey 6 } BSF
 marinum Stroëm Fvl. 82.
 Johnstoni Westw.
 v rubripes Rey Le Havre.
 3 laticolle Mots. Mosc. 60. 549 Sib.

315. PORRHODITES Kr. Fvl.

- 1 fenestralis—Zett Er 888 Fvl 183 Lap Alp
 ♀ pubescens Zett Er 889. [Sib.
 brevicollis Mækl. Mosc. 52. 320.

316. CYLLETRON Thoms.

- 1 nivale—Thoms. Fvl. 85 LapSib.
 2 hyperboreum Mækl. 8. 84 Sib.

317. PHILOBINUM Kr. Rey.

- 1 humile—Er. 860 Rey 155 Eur
 sordidum Steph. Fvl. 84.
 subpubescens Steph. v. 350.
 nitidulum Kr. 966.
 cadomense Fvl. Gren. 42.
 v nigri ventre Rosh. And. 86 E.
 ruficollis Schauf. Isis 64. 47.
 2 pallidicorne Fairm. Fvl. 84 Corse.
 3 floricola—Wol. Rép. 390 Can.

318. CORYPHIUM Steph. Rey.

- 1 angusticolle—Stph. Fvl. 80 Rey 395 }
 [Eur.
 melanocephalum Mts Msc 60. 542
 bifoveolatum Tbms Sknd. III. 186
 Robynsi Wesm.
 brevicolle Halid.
 pallipes Cussac Fr. 52. 613.
 2 Letzneri Schwartz A.
 3 Gredleri Kr. Rép. 390 Tyr.

319. BOREAPHILUS Sahl. Rey.

- 1 Nordenschioldi Mækl 76. 23 Sib.
 2 henningsianus Sahl Er. 899 Lap. R.
 3 velox—Heer Rey 403 Fvl. 81 SFAI.
 angulatus Fairm. 631.
 guadarriamus Sharp. Ab. 16. 26.
 4 astur Sharp. Ab. 17. 26 E.

Niphetodes Miller.

5 Redtenbacheri Mill. Ab. 7. 144 Carp.

320. EUDECTUS Redt. Rey.1 Giraudi Redt. Rey 400 Fvl 79 BSFA.
rufulus Weise.

v Whitei Sharp. MM 71. 73 B.

321. HADROGNATHUS Schaum.**Eugnathus** Muls. Rey.

1 longipalpis-Muls. Rey 389 Fvl. 55 F.

322. OMALIUM Grv. Rey.

1 validum Kr. R-y 222 Fvl. 77 F.

2 læviusculum-Gyl. Er. 887 Rey 193
fucicola Kr. 978. [BSAⁿ.3 riparium-Thoms. Rey 196 Fvl. 76
impar Mls. Rey 199. [BSFA.

4 sculptile Wol. Rép. 392 Tén. Palm.

5 tricolor Wol. Rép. 393 Mad.

6 rugulipenne Rye Fvl. Sup. 9 B.

7 rivulare-Pkl Er. 875 Rey 202 EurAlg.

oxyacanthæ Manh.

incisum Grav.

cursor Mulr. Er. 890.

8 porosum Scriba Rép. 391 Fvl. 78 I.
foraminosum Scriba Berl. 66. 378.9 languidum Mækl. 76. 305 Sib.
binotatum Mækl. 76. 305.10 septentrionis Thoms Fvl. 76 BSA
impressum Kr. 982 [Sib.

11 curtipenne Mækl. 77. 306 Finl. Sib.

12 fossulatum-Er. 877 Rey 219 EurSib.

excavatum Steph. Fvl. 75.

cæsum Gyl. Fn. n. 215.

conformatum Hardy.

13 Sauleyi Fvl. Cat. 5 Syr.

14 Escayraci Saule. Rép. 394 Palest.

15 littorale Kr. 980 A.

16 ferrugineum Kr. Fvl. 74 AlpA.

17 Xambeni Fvl Suppl 50 Rey 227 Alp.

18 Allardi Fairm Fvl 75 Rey 205 BSFAI.

ocellatum Wol Mad 54. 613. Mad.

genistarum Coq. Fr. 60. 164 Alg.

Salzmanni Saule. Rép. 393 Syr.

19 cæsum-Grv Er 878 Rey 214 EurAlg.
impres um Heer 176.

oxyacanthæ Gyl. Fn. n. 217.

corticinum Mots. Mosc. 57. 492'.

20 cinnamomeum Kr Dts Ins 100 Dalm.

21 rogatum Muls. Rey 217 F^a.

22 nigriceps Ksw. Rey 225 Fvl. 74 BFA.

23 bipunctatum Mots. Ab. 4. 181 R.

24 funebre Fvl. 73. Rey 213 Pyr.

25 oxyacanthæ-Grv. Er. 879 Rey 209
cæsum Lacd. [BFAI.

26 montivagum Epls. Led. 128 Cauc.

27 apicicorne Solsk Turk 74. 207 Turk.

28 taschkentense Sisk. Turk. 74. 208 »

29 turanicum Solsk. Turk. 74. 209 »

30 foraminosum Mækl. Mosc. 52. 324

laticolle Kr. 983. A. Sib.

clavicorne Mots. Hoch.

lagopinum Sahl Rép 398 Lap Sib.

? littorale Thoms.

31 strigicolle Wank. Rép. 395 Lithuan.

32 exiguum Gyl. Er. 876 Rey 212 BSF.

Phlœonomus Heer Rey.

33 minimum-Er. 878 Rey 187 FA.

34 pusillum-Grv. Er. 879 Rey 184. 3

punctipenne Thoms. [Eur. Alg.

læticolle Mækl. Mosc. 52. 325.

abietinum Thoms.

Xylodromus Heer.

35 monilicorne-Gyl Er 876 Rey 181 FA.

Phlœostiba Thoms. Rey.

36 planum-Pykl Er 886 Rey 173 EurSib.

flavipes F.

37 lapponicum Zett. Fvl. 69 Rey 176

pineti Thoms. Eur. Sib.

planipenne Mækl. Mosc. 53. 198.

conforme Kr. 987.

subtile Kr. 987.

Phyllodrepa Thoms. Rey.

38 scabriusculum Kr. Fvl. 66 FA.

39 striatipenne Aubé Rey 249 Cauc.

40 elegans Kr. 989 A.

41 lineare Zett. Er. 884 Rey 245 BSFA.

- 42 deplanatum—Gyl. Er. 885 Rey 163
depressum Grav. 113. [EurSib.
oblongum Lacd. 174.
- 43 cephalotes Epls. Dts. 81. 170 I.
- 44 concinnum Marsh Er 886 Rey 167 Eur
fuliginosum Heer
- 45 caucasicum Kohn, Mel. 111. 28 Cauc.
- 46 crassicornis Sahl. Fen. 217 Finl.
- 47 puella Sahl. Sib. 111. 744 Sib.
- 48 testaceum—Er. 885 Rey 161 S FAI.
pygmaeum Grav. 206.
- 49 gracilicornis Fairm. Rey 257 BAF.
hiemale Fuss. Fvl. Rép. 396.
- 50 vile—Er. 882 Rey 234 } BSFA Alg.
Heeri Heer Rey 248.
brevicornis Er. 884 Rye 251.
gracilicornis Rye.
v obsolete Muls.
- 51 salicis Gyl. Er. 880 Rey 231 BSFA.
crassicornis Matth.
- 52 brunneum—Pkl Er 884 Rey 239 SFA.
melanocephalum Fvl. 63.
- 53 lucidum—Er. 881 Rey 242 SFA.
iopterum Steph. Fvl. 64.
- 54 strigipenne Mækl Mosc. 52. 320 Sib.
- 55 angustatum Mækl Finsk 76. 304 Sib.
- 56 florale—Payk Er. 879 Rey 234 Eur Alg.
rufipes Fourc. Fvl. 62.
viburni Grav. 117.
Fahroei Zett. Er. 888.
atrum Heer.
ruficornis Steph. v. 352.
maculicornis Heer 178.
v nigrum Grv. Er. 880. Rey 238.
salicinum Manh.
- 57 affine Gerhard Berl. 78. 208 A.
- 58 divergens Mækl. 76. 302 Sib.
- 59 translucidum Kr. 998 A.
- Acrolocha** Thoms. Rey.
- 60 amabile Heer Rye 268 Fvl. 59 Helv.
Hampei Redt. ANat.
- 61 striatum—Grv. Er. 882 Rey 262 BFA.
minutum Ol.
- 62 salculum Steph. Fvl. supl. 6. Rey 265
striatum Lacd. [BF Corse.
- 63 balcalicum Mts Hch. Msc. 62. 107 Sib.
- 64 cinnamomeum—Kr. 1000 Dalm.
- Hypopycna** Rey.
- 65 rufulum—Er. 883 Rey 276 FAI.
marinum Rag. Ab. 17. 88 Sic.
- Hapalaræa** Thoms. Rey.
- 66 distincticornis Baudi Rép 397 Rey 279
F. I.
- 67 pygmaeum—Pkl Er 883 Rey 282 BSFA
ulmi Mots. Mosc. 57. 493.
- 68 brevipenne Mots Mosc 60. 545 BSib.
- Acrulia** Thoms. Rey.
- 69 inflatum—Gyl. Er. 883 Rey 287 Eur.
corticale Heer. Sib.
longicollis Gredl.
egregium Redt. 550 A.
323. **Anthobium** Steph. Rey.
- 1 signatum—Mrk. Rey 324 Fvl 38 FAI.
- 2 aucupariæ Ksw. Rép. 402 Rey 346 A.
- 3 abdominalis—Grv. Er. 893 Rey 321
semicoleopratum Panz. [BFAI.
- 4 limbatum—Er. 894 Rey 325 SFA.
- 5 clavipes Baud. Rép. 402. Apen.
- 6 Octavii Fvl. Rép. 399 Rey 318 Alp.
- 7 atrum Heer Fvl. 36 Rey 300 FAI.
nigrum Er. 892.
- 8 obsolete Er. 892 Port.
- 9 florale—Grv. Er. 894 Rey 297 FASib.
triviale Heer.
- 10 ♂ robustum Heer Rey 294 Fvl 49 FA.
♀ alpestre Heer.
excavatum Er. 993.
- 11 procerum Baud. Rey 315 Fvl 39 Alp.
- 12 triviale—Er. 892 Rey 313 BSFAI.
primulæ Steph. Fvl. 39.
cribrosum Heer Fn. 568.
- 13 sareptanum Eppel. Stet. 78. 423 R.
- 14 oblitum—Frm. Rey 303 Fvl. 40 Pyr. I.
- 15 sinuatum—Fvl. Rép. 404 Rey 309 Alp.
- 16 minutum—F. Er 896 Rey 305 Eur Sib.
appendiculatum Heer Fn. 181.
paludosum Heer Fn. 179.
brevicollis Heer. Fn. 568.
ranunculi Grav.
v puncticollis Gredl. Rép. 401 Tyr.

- 17 obtusicolle-Fvl.Supl.48Rey308FE.
 18 Scribæ-Schf. Rép. 297 E.
 obscurum-Bris. Rép. 400.
 19 fulvipenne SolskTurk74.210Turk.
 20 lapponicum-Manh.Er.899 Lap.
 flavipenne Er.896.
 21 granulipenne Sahl.Rép.406 Lap.
 22 tempestivum-Er. 895 Sard.
 23 impressicolle-KwRey310Fvl45Pyr.
 24 nitidicolle Baud. Fvl. 46 Alp.
 25 anale-Er. 898 Rey 358 Alp.Pyr.
 nivale Heer FAEI.
 rhododendri Mots.
 longulum Mots.
 difficile Rosh. And. 87.
 26 longulum-KswRey360Fvl46 AlpA.
 27 foveicolle Fvl 47 Rey 361 Alp.
 cribricolle Baud. Rép. 405.
 28 angustam-Ksw.Rey354Fvl.47 Pyr.
 29 nigriventre MotsMosc60.524 Sib.
 30 angusticolle Fvl. Rép. 404 Alp.
 31 rhododendri-BdiRey339Fvl53Alp.
 obliquum Muls. Rey 340.
 32 subjectum Rey 352 F.
 33 alpinum-Heer Rey 349 Fvl48 FAI.
 luteipenne Er. 898.
 montanum Er. 897 Rey 353.
 alpestre Mots.
 34 montivagumHeerEplsLed128Cauc.
 sordidulum-KrRey363Fvl48FA
 35 palligerum-KswRey376Fvl49FAI.
 36 macropterum Kr Rey 373Fvl51Alp.
 37 longipenne-Er. 898 Rey 367 FAIE.
 ♀ Imhoffi Heer Fn. 184.
 38 sparsum Fvl.Supl.49 Rey 370 Alp.
 39 umbellatarumKswRey366Fvl49Pyr
 40 stramineum-Kr.Rey334Fvl51FAI.
 lævipenne Baudi.
 41 Kraatzi-Bris. Rey 379 Fvl.43 Pyr.
 longipenne Duv.
 42 pallens-Heer Rey 381 Fvl. 51 FAI.
 puberulum Ksw. Kr. 1016.
 43 ætolicum-Kr. Berl. 58. 129 G.
 44 scutellare-Er.895Rey329Eur.Alg.
 torquatum Marsh. Fvl. 41.
 ♀ montivagum Heer.
 adustum Ksw. Fvl. 42.
 pumilio Bsh. And. 87.
 45 hispanicum-Bris. Rép. 405 E.
 46 nigriceps Fvl. Rép. 403 Corse.
 47 luteicornè-Er. 897 Sic.
 maculicolleFairmFr60.164Alg.
 cincticolleChevlRevZool 60.448
 48 pruinusum Fvl.Rép.403 Corse.
 49 microcephalumMtsHchAb 4.182C.
 50 ophthalmicum-Pkl.Er.894 Rey 343
 pallidum Grv. [Eur.
 v discinum Gredl.
 51 rufotestaceum-Mts HchAb 4.184C.
 52 atriceps Mots. Hoch.Ab.4.183 R.
 53 torquatum-Kr. Rey 332 FAI.
 Marshami Fvl. Ab. 5. 498.
 collare Crotch.
 54 sorbi-Gyl. Er. 895 Rey335 SBFAI.
 silesiacum Letzn. Rép. 408.
 55 rectangulum-BaudFvlRép407FAI.

PROTEINIDÆ.

324. PROTEINUS Latr. Rey.

- 1 brevicollis-Er 903Rey 31 } EurAlg
 ovalis Steph. Fvl. 30.
 2 longicollis GredlHarHefl74.52Tyr.
 3 lævigatus Hoch.Mosc.71'.174 R.
 4 brachypterus-F. Er. 903 Rey 33
 ovatus Grav. 215 [Eur.Af.As.
 5 macropterus-Gyl. Kr. 903 Rey 37
 [BFAFSib.
 6 limbatus Mækl.Rey 35 Fvl.30 FAI.
 crenulatus Pand. Rép. 409.
 Mæklini Fvl. Ab. 5. 494.
 7 atomarius-Er.904Rey40BSFAAlg.
 Oliverii Sauley.
 parvulus Lec.
 clavicornis Fvl. 31.

325. MEGARTHUS Steph. Rey.

- 1 depressus-Pkl.Er985Rey45EurSib.
 macropterus Grav.
 2 stercorarius Rey 48 Pyr.
 3 nitidulus-Kr. Rey 58 Fvl.27 FASib.

4 affinis-Milr.Rey58Fvl.27 Eur.-méd
Bellevoyei Sauly Sib.
sinuaticollis Kr. 1029.

5 denticollis Beck Er. 966 Rey 56

marginicollis Er. BSFASyr.

6 sinuaticollis-Led. Er. 905 Rey 53
angulicollis Mækl. Eur.Sib.

7 hemipterus-Illeg. Er. 906 Rey 59 Eur.
melanocephalus Ol.

nitiduloides Laed.

rufescens Steph.

8 serrula Wol. Rép. 410 Gom.

9 longicornis Wol. Mad. 515 Mad.

326. PHLŒOBIUM Er. Rey.

1 clypeatum-Mulr. Er. 907 Rey 66
corticale Laed. EurChyp.

327. METOPSIA Wol.

1 ampliata Wol. Mad. 616 Mad.

2 cimicoides-Wol. Rép. 411 Tén.

PHLŒOCHARIDÆ.

328. PSEUDOPSIS Newm. Rey.

1 sulcata-Newm. Er. 914 Rey 18
[BFA]lg.

329. PHLŒOCHARIS Manh. Rey.

1 longipennis Fvl. Cat. 2 Palest.

2 subtilissima-Manh Er845Rey8Eur.

3 minutissima Heer Fvl. 21 Helv.

Sootodytes Sauly.

Thermocharis Fvl.

4 corsica-Fvl. Supl. 1. Rey 13 Corse.

5 laticollis Fvl. Sup 21 Rey 12 F.I.

6 parallela Fvl. Cat. Alg.

7 brachyptera Sharp. Ab. 17. 26 E.

umbratilis Epls. Stet. 80. 288 E.

8 Diecki Fvl. Sup. 2 E.

9 paradoxa-Sicy Rép. 43 Rey 14 Pyr.

cæca Fvl. Rép. 411.

subclavata Muls. Op. xvi. 207.

330. OLISTHERUS Er. Rey.

1 megacephalus-Zett. Rey 4 } Fvl. 20
laticeps Le C. Amér^sSFAR.

2 substriatus-Gyl Er844Rey5 } SFAR
nitidus Le C. Amér^s.

PIESTIDÆ.

331. TRIGONURUS Muls. Rey.

1 Mellyi-Muls Rey 24 Fvl 17 Chart. Alp.

2 asiaticus Reiche Rép. 412 Nat.

332. SIAGONIUM Kirby.

Prognatha Latr. Rey.

1 quadricorne-Kirby Er. 837 Rey 388 }
rußpenne Blondel. [BFA.]

2 humerale-Germ Er 837 Rey 391 FAIG

3 vittatum Fvl. Cat. 1 Sib.

333. GLYPTOMA Er. Rey.

Thoracophorus Mots.

1 corticinum-Mots Er 909 Rey 394 FAI

MICROPEPLIDÆ.

334. MICROPEPLUS Latr.

1 porcatus-F. Er. 911 Fvl. 9 Eur. Alg.
sulcatus Herbst.

♀ Mathani Fvl.

cælatus Fvl.

2 cælatus-Er. 912 Fvl. 9 SA.

3 latus Hampe Ab. 1. 109' Croat.

4 fulvus-Er. 912 Fvl. 10 Eur. Alg.
ferrugineus Mots.

angulosus Mots.

♂ Margaritæ Duv.

♀ Mariettii Duv.

5 longipennis Kr. Fvl. 10 FA.
staphylinoides Kr. 1053.

6 staphylinoides-Mrsh. Er. 913 Fvl. 10
Maillei Guér. [Eur. Alg.]

obtusus Newm. Er. 913.

♀ Duvali Fvl.

7 Eppelsheimi Rtr Vien. 80. 514 Cauc.

8 tessera-Curt. Er. 913 Fvl. 11
costipennis Mækl. [Eur. Sib.]

staphylinoides Heer.

baicalicus Mots.

9 lævipeunis Epel Wien 80. 219 Hong.
interstitialis Sahl. Sib. 112 Sib.

CLAVICORNES

PAUSSIDÆ.

335. PAUSSUS L.

- 1 Favieri-FrmSaulc.12Rtr.2F^eESicAf.
 2 Piochardi Saulc. 15 Rtr. 2 Palest.
 3 turcicus-Friv. Slc. 13 Rtr. 3 TG.
 Mariae Muls. As.Cauc.Casp.
 4 Klugi Westw.Slc.17 Rtr.3 Tang.
 Olcesei Fairm. Fr. 60. 149.
 5 armatusWstwLinSoc.33.645Egyp.
 curvicornisChvl.Rev.zool.38.21
 6 cornutusChvl.Mag.zl.32.pl.49 Eg.
 dentifronsWestwLinSoc33.662
 [Sen.]

CLAVIGERIDÆ.

336. ARTICERUS Dalm.

Fustiger Brendel.

- 1 syriacus Slc. Rép. 34 Rtr. 4 Syr.
 2 ponticus Shp. Ab. 16. 62'. Mésop.

337. CLAVIGER Preysl.

- 1 Lederi Reitr. 4 Cauc.
 2 ibericus Mots.Mosc.51.502 R^e.
 3 testaceus-Preysl. Slc. 27 Rtr. 4 }
 foveolatus Mulr. Aubé. 153. [Eur^a. méd.
 4 Perezi Reitr. 4. Escorial.
 5 nitidus Hamp. Ab. 4. 24 Rtr. 5 Croat.
 v carnolicus Rtr. 5 Carn.
 6 Brucki Slc. 27 Rtr. 5 Pyr^e.
 7 Piochardi Slc. 28 Rtr. 5 Astur.
 8 lusitanicus Slc. 29 Rtr. 5 Port.
 9 Davali-Slc. 30 Rtr. 6 F^e.
 10 Pouzani-Slc. 32 Rtr. 6 Pyr^e.
 11 Sauleyi-Bris. Rép. 33 Rtr. 6 E.
 12 colchicus-Mots. Slc 31 Rtr. 6 Cauc.
 bimaculatus Mts Msc. 44'. 823 »
 13 caspicus Rtr. 6 Casp.
 14 nebrodensis Rag. Rép. 34 Rtr. 7 Sic.
 15 Revelierei-Slc. 34 Rtr. 7 Corse.
 16 apenninus-Baud. Rép. 14 Rtr. 7 I.
 17 elysius Beitr. 202 G^a.
 18 longicornis-MlrSlc36Rtr7Eur.méd.

PSELAPHIDÆ.

338. CHENNIUM Latr.

- 1 bituberculatum-Latr. Slc. 43 Rtr. 15
 2 Steigerwaldi Rtr. 16 Croat. [FAEI.
 3 Promethus Slc Led 131 Rtr 16 Cauc.
 4 antennatum Reitr. 16 Casp.
 5 Kiesenwetteri Slc. 42 Rtr. 16 G.
 6 judæum Saulc. 45 Rtr. 16 Palest.
 7 insulare (Slc.) Rtr. 16 note Corse.

339. CENTROTOMA Heyd.

- 1 lucifuga-Heyd. Slc. 48 Rtr 17 F^eAI^a.
 2 penicillata Schf. Slc. 49 Rtr. 17 F^eE.
 rubra Saulc. Rép. 2.
 3 Ludyi Rtr. Deuts. III. 20 Tyr^a.
 4 Brucki Slc. 50 Rtr. 17 G.

340. DESIMIA Reitr.

Tetracis Sharp. *Tmesiphorus* Slc.

- 1 Ghilianii Aubé Slc. 53 Rtr. 17 E^aAI^a.
 integricollis Fairm. Fr. 58. 793.
 complex Sharp. MM. 74. 80.
 2 Darius Slc. 54. Rtr. 17 Syr. Pers.

341. CTENISTES Reichb.

Dionyx Serv.

- 1 palpalis-Reichb. Slc. 57 Rtr. 18
 ♂ Dejeani Serv. [FEAR^aAs.
 2 Staudingeri-SchfSlc59Rtr18E^aMar.
 3 brevicornis Slc. 61 Rtr. 18 Oran.
 4 Kiesenwetteri-Rag. Slc. 61 Rtr. 18
 brevipennis Sauley. Alg. Slc.
 5 andalusicus Sicy 62 Rtr. 18 E^a.
 6 parvipalpis Rafr Rev. zool. 73. 363 Alg
 Sognorus Rtr.
 7 calcaratus Bdi Rép 3 Slc 63 Rtr 19 Nat.
 8 Oberthuri Per Arc Ab. 17. 51 Rtr 19 E^a.

342. ENOPTOSTOMUS Schaum.

- 1 Aubei-Rosh. Slc. 67 Rtr. 19 E^aAlg.
 barbipalpis Fairm. Fr. 758. 792.
 ♀ Godarti Slc. Fr. 64. 258.
 2 globulicornis-Mts Rtr 19 GR^a Syr Eg.
 ponticus Baud. Rép. 4 Slc. 68
 3 Doderi Rtr. Vien. 84. 64 Sard.

- 4 Judæorum Rtr. Vien. 84. 64 Liban.
 5 Desborchersi Rafr. Rtr. 20 Alg.
 Leprieuri Sauley.
 6 Wollastoni Schm. Rép. 2. Tén Gom.
 7 elegans—Mots. Mosc. 51. 482 Egypt.
 8 pilicollis Mots. Mosc. 51. 481 Egypt.

343. MENTRAPHUS Sharp.

- 1 pselaphodes Sharp. Vien. Bl. 83. 226
 [Mésop.]

344. CENTROPETHALMUS Schmidt.

Camaldus Fairm.

- 1 villosulus Fmr. Ab. 1. 66. Sic 71 Rtr. 20
 [Alg.]

345. MARELLUS Mots.

- 1 ægyptiacus—Mots Sic 76 Rtr. 20 Egypt.
 2 biskrensis Rtr. Vien. 84. 82 Alg.

346. TYRUS Aubé.

- 1 macronatus—Panz Sic 78. Rtr. 20 Eur.
 sanguineus Thms. Skd. III. 240.
 insignis Reichb. 60.
 2 Peyroni Sauley. 79. Rtr. 20 Taurus.

347. TYROPSIS Sauley.

- 1 Chevrolati Sic. 82. Rtr. 21 ?F.

348. FARONUS Aubé.

- 1 Lafertei—Aubé Sic. 85 Rtr. 21 FEIG.
 Aubei Lac. Fr. 54. 24. Afr. Dalm.
 ♂ telonensis Fairm. Fr. 60. 45'.
 2 pyrenæus Sic. 88 Rép. 5 Rtr. 21 Pyr.
 3 Brucki Sic. 87 Rtr. 21 Tosc.
 4 spartanus Reitr. 202 G.
 5 nicæensis Sic. 89 Rtr. 21 Nice Gorse.
 6 gravidus Rtr. Vien. 84. 81 E.
 7 hispanus Sic. 89 Rtr. 22 F.

349. AMAUROPS Fairm.

- 1 Aubei Fairm. Sic. 110 Rtr. 22 Sic.
 2 Diecki Sic. 113 Rtr. 22 Apen.
 3 sardoa—Sic. 112 Rtr. 22 Sard.
 4 corsica—Sic. 114 Rtr. 22 Corse.
 5 Koziorowiczii Sic. Rtr. 23 Corse.
 6 Revelierei Sic. Rtr. 23 Corse.
 7 gallica—Delar. Sic. 116 Rtr. 23 F.

- 8 Abeillei Sic. Rtr. 23 F.
 9 exarata Baudi Rtr. 23 I.
 10 carinata Baudi Rtr. 23 I.
 11 Pirazzolii—Sic. 117 Rtr. 24 Alp. Lép.
 12 syriaca Rtr. 24 Liban.
 13 corcyrea Rtr. 202 Corfou.

350. AMICROPS Sauley.

- 1 Sauleyi—Reitr. 24 Cauc.
 2 Lederi Sauley. Led. 132 Rtr. 24 Cauc.
 3 lenkorana Reitr. 25 Casp.
 4 mingrelia Rtr. Vien. 84. 65 Cauc.

351. BATRISUS Aubé.

- 1 formicarius—Aubé Sic. 93 Rtr. 25
 [Alp. Pyr. A].
 sibiricus Sharp. MM. 74. 82 Sib.

Batrisodes Rtr.

- 2 Delaportei—Aub. Sic. 95 Rtr. 25
 [Eur. méd.]
 punctideres Mars. Rép. 8 Helv.
 puncticollis Tourn. Fr. 67. 561.
 schwabi Rtr. Rép. 9.
 ? ♂ antennatus Mts. Msc. 45. 45C.
 erivanus Mots. Mosc. 450. 45
 ♀ longulus Mts. Msc. 51. 488R.
 tauricus Mots. Mosc. 51. 488 R.
 3 pogonatus Sauley. 98 Rtr. 25 Tayg.
 4 adnexus—Hamp. Ab. 4. 27 Rtr. 25 FAI.
 ? Chevrieri Mts. Msc. 51. 486 Helv.
 5 venustus—Reichb. Sic. 99 Rtr. 26 Eur.
 ruber Beck. 10.
 piceus Muls. Rey Op. 12. 69.
 nigriventris Denny 41.
 Brullei Aubé 47.
 ♂ Buqueti Aubé 50.
 ? obtusicornis Mts. Msc. 45. 45Cauc
 6 insularis Bdi Rép. 11 Sic. 103 Rtr. 26
 [Cypr.]
 7 exsculptus Hamp. Sic. 104 Rtr. 26 Austr.
 8 elysius Rtr. 203 G.
 9 Ruprechtii Koln. Rtr. 26 Cauc. Casp.
 10 oculatus—Aubé Sic. 106 Rtr. 26 FAETG

352. BATRAXIS Reitr.

Batrisomorpha Rafr.

- 1 Hampei Reitr. 27 G.

353. BRYAXIS Leach.

Brachygluta Thoms.

- 1 cypria BdiRép. 13 Slc. 30 Rtr. 28 Cyp.
 2 carmelitana Rtr. Vien. 84. 67 Syr.
 3 celtiberica Slc. 41 Rtr. 28 E.
 4 dichroa Slc. 39 Rtr. 28 Oran.
 5 Lefebvrei-Aubé Slc. 44 Rtr. 28 Eur. Af.
 6 corsica Slc. 47 Rtr. 29 Corse Sard.
 7 tibialis-Aubé Slc. 29 Rtr. 29 Corse
 Marthæ Reitr. [Sard. Dalm.
 8 dentiventris-Slc. 139 Rtr. 29 Eur. Alg.
 9 hipponensis-Slc. 139 Rtr. 29 » Alg.
 10 apennina Slc. 38 Rtr. 30 Tosc.
 11 Revelierei-Slc. 39 Rtr. 30 Corse.
 12 cota Slc. 41 Rtr. 30 Ecosse.
 13 Pandellei-Slc. 39 Rtr. 30 Pyr.
 14 numidica-Slc. 34 Rtr. 30 Cors. Sic. Alg.
 15 Guillemardi-Slc. 13 Rtr. 31 F. Alg.
 paludosa Peyr. Fr. 58. 416 Caram.
 16 syriaca-BdiRép. 14 Slc. 33 Rtr. 31 G. Syr.
 17 Waterhousei-Rye Rtr. 31 B. Méd.
 simplex Wterh. Ab. 1. 75. Slc. 48.
 18 brunneiventris-Mts Rtr. 31 Cauc. Pers.
 persica Sauley 40.
 19 xanthoptera-Reichb. Slc. 143 Rtr. 32
 ♀ depressa Aubé 28. Eur. Méd.
 ♂ rubripennis Aubé 29.
 20 Lederi Slc. 37 Rtr. 32 Oran.
 21 hæmoptera-Aubé Slc. 150 Rtr. 32
 spinicoxa Mts. [FAEITang.
 xanthoptera Aubé 29.
 22 maxima Reitr. 204 Taygète.
 23 fassulata-Reichb. Slc. 45 Rtr. 33 Eur.
 v aterrima Rtr.
 v rufescens Rtr.
 24 hemiptera Slc. 46 Rtr. 33 Tanger.
 25 tetuanica Rtr. Vien. 84. 68 Maroc.
 26 tristis Hamp. Ab. 4. 27. Slc. 49 Rtr. 33
 [Carn. I.
 nigrescens Mars. Rép. 16, Pyr.
 nigricans Gredl. Tir. 130. Tyr.
 Sartorii Redt. Carn. I.
 27 caligata Slc. 49 Rtr. 34 Bône.
 28 gibbera-BdiRép. 16 Slc. 51 Rtr. 34 G. Syr.
 29 Helferi-Schdt. Slc. 52 Rtr. 34 Eur. Af.
 pulchella Schm. Grm. Zeits. iv. 192.
 30 transversalis-Schm. Slc. 53 Rtr. 34
 [Dalm. G.
 31 kabyliana Rafr. Slc. 69 Rtr. 35 Kabyli.
 32 Leprieuri S.c. 70 Rtr. 35 Bône.
 33 Reichei-Slc. 71 Rtr. 35 Alg.
 furcata-Fairm. Fr. 58. 793.
 34 Motschulskiyi Slc. 73 Rtr. 35 R. Kirg.
 35 furcata-Mots. Slc. 74 Rtr. 36 Cauc.
 36 Piccioli Slc. 76 Rtr. 36 IG.
 37 Retowskii Simon Vien. Zeits. 83. 8 R.
 38 Pirazzolli Slc. 76 Rtr. 37 I.
 39 Diecki Slc. 79 Rtr. 37 J.
 40 Schuppeli-Aubé Slc. 54 Rtr. 37 Eur. Af.
 41 longispina Rtr. 204 IG. Dalm. [A.
 42 Galathæa Slc. 78 Rtr. 38 Sic.
 43 Ragusæ Slc. 55 Rtr. 38 Sic.
 44 cavernosa Slc. 56 Rtr. 38 G.
 45 mauritanica Slc. 59 Rtr. 39 Alg.
 46 carthagenica Slc. 60 Rtr. 39 E.
 47 hæmatica-Rchb. Slc. 63 Rtr. 40 Eur.
 ♂ emarginata Frst. viii. 39 A.
 v perforata Mots. Mosc. 51. 493 F.
 palustis Rtr.
 v sinuata (Aubé) F.
 v hidenticulata (Aubé) Dalm.
 ♂ nodosa Mts. Msc. Mém. iv. 315 R.
 48 tuberculata BdiRép. 17 Slc. 57 Rtr. 40
 49 globulicollis-Rey Rtr. 41 Eur.
 50 Aubei Tourn. Rép. 20 Slc. 62 Rtr. 41
 rufula Rotb. Rép. 18 [Sic. Alg.
 51 balcanica Slc. 78 Rtr. 41 Balk.
 52 Uhagoni Slc. 61 Rtr. 41 E.
 53 sardoa Slc. 58 Rtr. 42 Cors. Sard.
 tuberiventris Rfr. Rev. 83. 365 Alg.
 54 Langei Rtr. Vien. 84. 68 Syr.
 55 nodosa-Mots. Slc. 67 Rtr. 42 Cauc.
 56 colchica Slc. 68 Rtr. 42 Cauc.

Reichenbachia Leach.

Djerobia Thoms.

- 57 militaris Slc. 81 Rtr. 43 G.
 58 juncorum-Leach. Slc. 82 Rtr. 43
 insignis Stph. Ill. v. 90 [Eur. Alg.
 59 nigriiventris-Schm. Slc. 83 Rtr. 43 »
 60 nilotica-Mots. Slc. 88 Rtr. 43 Egypt.
 ægyptica Mots. Mosc. 51. 492.

- 61 melina-Solsk. Slc. 87 Rtr. 44 Cauc.
 rubra Mots. Mosc. 51'. 492.
 tychoïdes Rtr. Berl. 77. 291.
- 62 fulviventris Trn Slc 89 Rtr 44 Helv.
- 63 talyschensis Rtr. Vien. 84. 68 Cauc.
- 64 Chevrieri-Aubé Slc. 84 Rtr. 44 Eur.
- 65 morio Rtr. 204 Zante. [As. Af.]
- 66 iranica Slc. 85 Rtr. 44 Perse.
- 67 dentipes Bdi Rép. 18 Slc 86 Rtr 44 Cyp.
- 68 montana Slc. 86 Rtr. 44 Cauc. Casp.
 rubiginosa Rtr.
- 69 heterocema-Aubé Slc. 94 Rtr. 45 Alg.
- 70 clavata-Peyr Rép. 19 Slc 90 Rtr 45 Syr.
- 71 impressa-Panz. Slc. 92 Rtr. 45 Eur.
- 72 spinipes Rtr. Vien. 84. 69 Cauc.
- 73 antennata-Aubé Slc. 93 Rtr. 46 Méd.
 serrata Gredl. Rép. 20.
 caucasica Slc.
 serricornis Schmidt 38. 5.
- 74 opuntia-Schmidt Slc. 91 Rtr. 46 Méd.
- 75 Olivieri Rafr. Rtr. 46 Alg.
- 76 Quedenfeldti Rtr. 46 Tang.
- Rybaxis Rtr.**
- 77 sanguinea-LSlc. 93 Rtr. 47 Eur As Af.
 longicornis Leach. Den. 34.
 limnophila Peyr. Fr. 58. 414.
 v nigropygialis Fairm. Fr. 57. 736.
 albana Mots. Mosc. 45. 43.
 formicariensis Gredl. Rép. 13.
 v laminata Mots. Mag. zool. 36 F.
- 78 gigas-Baudi Rép. 12 Slc. 98 Rtr. 47
 [Cyp. Casp.]
- 79 diabolica Rtr. Vien. 84. 66 Syr.
- 354. BYTHINUS Leach.**
- Decatocerus Slc.**
- 1 Alhambra Slc. Heyd. 89 Rtr. 48 E.
- 2 bicornis Rtr. 48 Baléar.
- Machærites Milr.**
- Lindera* Slc. *Facetus* Schf.
- 3 spelæus Milr. Ab. 6. 406 Rtr. 48 Carn.
- 4 subterraneus-Mis Ab 6. 406 Rtr. 49 »
 ♂ Argus Kr. Ab. 6. 407.
 plicatulus Schf. Rev. 63. 293.
- 5 Doriae Schf. N. Ot. 1. 290 Rtr. 50 I.
- 6 scapularis Rtr. Vien. 84. 69 Herzég.
- 7 maritimus Rtr. Vien. 84. 70 A Ip. mar.
- 8 gladiator Rtr. Vien. 84. 70 I.
- 9 Eppelsheimi Rtr. Vien. 84. 70 I^a.
- 10 Ludyi Rtr. 50 Bozen.
- 11 Lucantei Slc. Rtr. 51 Pyre.
- 12 cristatus Slc. Rép. 22 Rtr 51 Ariège.
- 13 Mariae Duv. Rép. 21 Rtr. 51 Pyre.
- 14 Claræ Schf. Rép. 24 Rtr. 52 E Burgos.
- 15 armatus Schf. Rép. 25 Rtr. 52 E Bisc.
- 16 Revelierei Rtr. 52 Corse.
- 17 Myrmodo-Rtr. 53 Corse.
 brachioides-Slc.
- 18 Falesia Fvl. Rtr. Vien. 74. 70 F^a.
- 19 Bonvouloiri Slc Rép. 23 Rtr 53 Pyr Big.
- 20 glabratus Rye MM. 70. 33 Rtr. 53 B.
- 21 algericus Rafr Rev 73. 366 Rtr. 54 Alg.
- Bythinus Rtr.**
- 22 cavifrons Rtr. 54 Dalm^a.
- 23 caviceps Rtr. 55 Lenkor.
- 24 pauper Ksw. Berl. 58. 48 Rtr. 55 G.
- 25 Ammon Slc. Led. 133 Rtr. 55 Cauc.
- 26 gracilis-Mts Msc 51. 499 Rtr. 56 Casp.
 uniformis Slc.
- 27 Jaso-Slc. Led. 135 Rtr. 56 Cauc.
- 28 simplex-Baudi Rép. 27 Rtr. 56 I^a.
- 29 Baudueri Rtr. Vien. 84. 71 F^a.
- 30 convexus-Ksw Berl. 58. 47 Rtr. 56 G.
 levantinus Slc. Mus. Civ. 82. 278
 [Zante.]
- Arcopagus Leach.**
- 31 Heydeni Rtr. 57 Carn. Croat.
 Saulcyi Stussiner.
- 32 solidus Rtr. 57 Carn. Dalm.
 Emonæ Saulcy.
- 33 procerus Grdl. Har. xi. 59 Rtr. 59 Tyr.
- 34 crassicornis-Mots. Rtr. 58 Eur méd.
 Chaudoiri Hch. Mosc. 45'. 173.
 ♀ longipalpis Mts. Msc. Mem.
- 35 giraffa Rtr. 58 Cauc. [iv. 318.]
- 36 martkopius Rtr. 59 Cauc.
- 37 Nakeralæ Rtr. Vien. 84. 72 Cauc.
- 38 schamylianus Slc. Led. 134 Rtr. 59 »
- 39 peloponnesius Rtr. 205 G^a.

- ♀ *myops* Ksw. Berl. 58. 46.
 v *morio* Rtr. 97 Dalm.
 v *nodicornis* Rtr. 208 Corfou.
 18 *anophthalmus* Rtr. 97 Corse.
 19 *serbicus* Rtr. Vien. 84. 76 Serb.
 20 *florentinus* Rtr. Vien. 84. 77 1.
 21 *brunneus* Mo's. Mosc. 51. 495 Rtr. 98
 caucasicus Slc. Led. 136. Cauc.
 22 *lenkoranus* Rtr. 98 Casp.
 23 *integer* Rtr. 98 Sic.
 24 *monilicornis* Rtr. 99 Dalm.
 25 *corsicus* Rtr. 99 Corse.
 26 *dentifrons* Rtr. 99 Tang.
 27 *pullus* Ksw. Berl. 58. 47 Rtr. 100 TG.
 28 *miles* Slc. Heyd. 88 Rtr. 100 EAfr.
 29 *armatus* Slc. Heyd. 88 Rtr. 100 E* Tang.
 30 *grandiceps* Rtr. 101 Tang.
 31 *Fournieri* Slc. Fr. 64. 269 Rtr. 101 F.
 32 *castaneus*-Aubé Rtr. 101 ESic.
 v *tenuicornis* Baudi Rép. 7 Cyp.
 33 *minimus* Mots. Mosc. 45. 44 Géorg.
 34 *ruber* Mots. Mosc. 45. 44 Oural.
 35 *serricornis* Mots. Mosc. 45. 44 Armén.

357. PYGXYON Rtr.

- 1 *latridiiforme* Rtr. 102 Dalm*.
 2 *scydmaniforme* Rtr. 102 Cauc.

358. PANAPHANTUS Kiesw.

- 1 *atomus*-Ksw. Berl. 58. 49 Rtr. 103
 [F*G Casp.]

359. ZIBUS Sauley.

- 1 *adustus* Rtr. 103 Sic.
 2 *planiceps* Rtr. 104 G.
 nigripennis Slc.
 3 *leiocephalus*-Aubé 60 Rtr. 104 F*.
 4 *læviceps*-Slc. Rtr. 104 Liban.
 5 *Riedeli* Frm. Fr. 59. 34 Rtr. 104 Sic.

360. MIRUS Sauley.

- 1 *permirus* Slc. Rtr. 105 Corse.

361. TRIBATUS Mots.*Abatrissops* Rtr.

- 1 *thoracicus* Mots. Rtr. 105 Casp.
 2 *creticus* Rtr. 213 Crête.

362. PHILUS Slc.

- 1 *Aubei*-Slc. Rtr. 106 Corse.
 2 *Schmidti* Mærkl. Rtr. 106 A.
 lativentris Chd Mosc. 45. 170 R*.

363. AMAURONYX Reitr.

- 1 *Mærkeli*-Aubé Slc. 122 Rtr. 107
 sulcicollis Curt. Eur* méd.
 2 *Ephratæ* Slc. 127 Rtr. 107 Palest.
 3 *Barnevillei* Slc. Rép. 11 Rtr. 107 F*.
 4 *brevipennis* Slc. 126 Rtr. 107 E*
 5 *Kraatzii* Slc. 125 Rtr. 107 E*.

364. TRICHONYX Chaud.

- 1 *sulcicollis*-Reichb. Slc. 120 Rtr. 108
 dresdensis Illig Prus. 1290 [FA R]
 2 *georgicus* Mots. Mosc. 45. 46 Rtr. 108
 3 *talychensis* Rtr. 108 Tyr. Cauc. [Cauc.
 4 *lapidicola* Rafr. Rev. 73. 367 Rtr. 108
 [Alg.]

365. NAMUNIA Rtr.

- 1 *myrmecophila* Rtr. Vien. 84. 81 Natol.

366. TROGASTER Sharp.*Heteronyx* Sauley.

- 1 *heterocerus*-Slc. 129 Rtr. 108 Corse.
 2 *aberrans*-Sharp. 131 Rtr. 108 »

367. BIBLOPECTUS Rtr.

- 1 *Capellæ* Rtr. 109 Carn. Croat.
 Stussineri Slc.

368. EUPLECTUS Leach.

- 1 *acanthifer* Rtr. 209 Corfou.
 2 *Erichsoni* Aubé 143 Rtr. 110 A. Croat.
 3 *nubigena* Rtr. 140 Hong. Cauc. [G.
 4 *nitidus*-Fairm. Rtr. 110 F* Corse.
 5 *tuberculosis* Tourn Rép. 29 Rtr. 110
 6 *rhenanus* Rtr. Vien. 84. 80 A. [Helv.
 7 *tenuicornis* Reitr. Vien. 84. 80 Hong.
 8 *monticola* Wol. Rép. 30. Tén.
 9 *Tischeri*-Heer. Aubé 54 Rtr. 111
 Fischeri Aubé 54 Alp. [R Hong.
 10 *carpathicus* Rtr. 111 Carp.
 11 *aubeanus* Slc. Rtr. 112 A.
 12 *brunneus* Grim Rtr. 113 SA Helv. Croat.
 Erichsoni Thoms. Skand. 111 227.
 Kunzei Aubé 142.

- 13 Friwaldskyi Slc. Rtr. 113 Hong.
 14 Duponti Aubé 57 Rtr. 884 FA Croat.
 15 bescidicus Rtr. 114 Silés.
 16 Pelopis Rtr. 211. G.
 17 piceus-Mots. Rtr. 115 A. R.
 nigricans Chd. Mosc. 45. 169
 Dennyi Wath 61. 2. [Hong Croat.
 sulcatus Slc.
 18 nanus-Reichb. 69. Rtr. 115 Eur.
 Reichenbachi Denny 10.
 Richteri Rtr. Berl. 70. 215.
 Kirbyi Denny 14.
 v Revelieri Slc. Corse.
 19 Abeillei Sharp. MM. 12. 197 B.
 20 occipitalis Rtr. 116 Gasp. Cauc.
 21 verticalis Rtr. 211 Corfou.
 22 sanguineus-Denny 10 Rtr. 117 Eur.
 nanus Waterh.
 v georgicus Slc. Led. 137 Cauc.
 23 signatus-Reichb 73 Rtr. 117 Eur. Cauc.
 Kirbyi Aubé 54.
 minutus Steph. Illust v 97.
 24 afer Slc. Rtr. 117 E. Af.
 25 Bonvouloiri-Slc. Rtr. 118 Corse.
 26 Linderi-Slc. Rtr. 212 Nice.
 27 punctatus-Mis Op 12. 76 Rtr. 119 Eur.
 28 intermedius Wol Rtr. 119 Eur. méd.
 29 Karsteni-Reichb. 71. Rtr. 120 Eur.
 v gracilis Chd Mosc 45'. 167.
 v illum Rtr. Brunn. 77. 13.
 ? cephalotes Mots. Mosc 45. 46 R
 ? ligneus Mts. Msc. 45. 46 Cauc.
 30 narentinus Rtr. 121. Dalm.
 31 Spinola Aub 147 Rtr. 122 FHong Helv
 Lethierryi Slc.
 Biblopectus Rtr.
 32 ambiguus-Reichb 67 Rtr. 122 Eur. méd.
 pusillus Denny 15 Aubé 59.
 ruficornis Steph. Ill. v. 428.
 33 tenebrosus Rtr. 122. Dalm.
 34 minutissimus-Aubé 59 Rtr. 123 B.
 meridionalis Slc. [Eur.
 Garneysi Fowler.
 369. BIBLOPORUS Thoms.
 1 bicolor-Denny 17 Rtr. 124 Eur.
- glabriculus Gyl. iv 236
 gracilis Grm. S'elier 49.
 fennicus Mækl. Mosc. 45'. 550.
 2 varicolor Rtr. 124 Gasp.
 370. PSEUDOPLECTUS Rtr.
 1 perplexus-Duv Fr 5436' Rtr 125 Eur.
 371. TRINIUM Aubé.
 1 cavicolle Rtr. 126 Dalm.
 2 Hopfgarteni Rtr. 126 Dalm. Montén.
 3 Diecki-Saulcy Rtr. 127 Corse.
 4 caucasicum Koln Mel. III 31 Rtr. 127
 5 expandum Rtr. 312 Corfou. [Cauc.
 6 latiusculum Rtr. 128 Croat.
 7 brevicorne-Reichb. 47 Rtr. 129 Eur.
 ♀ hrevipenne Chd Msc 45. 172.
 v puncticeps Rtr. Vien 80. 219.
 ♂ latipenne Tourn Rép 31 Helv.
 Chevrieri Tourn. Rép. 31.
 8 imitatum Rtr. 129 Port.
 9 Domogletti Rtr. 130 Mébad.
 10 Emonæ Rtr. 130. A. Carn.
 Schmidti Slc.
 11 ætnense Rtr. Sic.
 12 longipenne Rtr. 131 Croat.
 13 carpathicum Slc. Rtr. 131 Transil.
 14 Brenskei Rtr. 213 G.
- SCYDMÆNIDÆ.
 372. CHEVROLATIA Duv.
 1 insignis Duv Fr 50. 46 Rtr. 134 P. Istr.
 Holzeri Hampe Stet. 50. 352 I.
 2 maroccana Rtr. 134 Af.
 3 egregia Rtr. 134 Dalm.
 373. EUTHICONUS Rtr.
 Conoderus Slc.
 1 conieicollis Frm 352 Rtr. 135 FA Croat
 2 paralleliecollis Slc. Rtr. 135 Trsyl.
 3 Tschapecki Slc. Rtr. 135 Austr.
 374. EUTHEIA Steph.
 1 plicata-Gyl III. 678 Rtr. 136 Eur. méd.
 truncatella Er. Brand. 359.
 2 Schaumi Ksw. Rtr. 136 SAG Hong.
 abbreviatella Thoms Skand 4. 80

- truncatella Sturm. Deuts. i. 264.
 plicata Redt. 304.
 3 Merkli Simon 80. 96 Rtr. 136 Transyl.
 4 clavicornis Rtr. 150 G.
 5 formicetorum—Slc. Rtr. 136 FDalm.
 6 parallela Frm Fr 79. 161 Rtr 137 Biskr.
 7 scydmænoides—Stph. Rtr 136 Eur^m.
 abbreviatella Er. Brand. 260.
 linearis Muls. Op. 12. 63.
 flavipes Mots. Mosc. 51. 505.
 8 clavata Rtr. 137 Hong.

375. CEPHENNIUM Muller.*Microdema* Cast.*Megaladerus* Steph.

- 1 divergens Rtr. Vien. 84. 82 E.
 2 Kiesenwetteri Aubé Fr 53. 9 Rtr 138
 3 nicæense Slc Rtr 138 Alp Mar. [Pyr.
 4 maritimum Rtr. Vien. 84. 82 Alp M.
 5 intermedium—Fairm. Rtr. 138 Pyr.
 6 majus Rtr. 139 Carn. Croat.
 7 difficile Rtr. 139 Hong.
 8 simile—Rtr. 140 M^t Viso Apen.
 9 carnicum—Rtr. 140 Carn. Croat.
 10 montenegrium Rtr 141 Dalm^t Herz.
 11 bicolor Slc. Rtr. 141 Tang.
 12 perispinctum Köln Rtr 141 Eur^m méd.
 13 laticolle Aubé Fr. 42. 233 Casp Helv.
 thoracicum Rtr. Vien. 81. 550
 14 thoracicum—Mulr Rtr. 142 Eur^m méd.
 15 fovangulum Rtr. 142 Bulg. Balk.
 16 montanum Rtr. Vien. 84. 83 M^t Rosa.
 17 hungaricum Rtr. 143 Banat.
 18 carpathicum Slc. Rtr. 143 Carpat.
 19 delicatulum Rtr. 143 Hong.
 20 aglenum Rtr. Vien. 84. 83 I^a.
 21 delicatum Rtr. Vien. 84. 83 Port.
 22 turgidum Rtr. 144 E^a Dalm. Cauc.

Geodytes Slc.

- 23 asturicum Rtr. 145 E.
 24 algesiranum Rtr. 145 E.
 25 granulum—Rtr. Vien. 84. 83 G.
 26 cæcum Slc. Rép. 43. Rtr. 145 F.
 27 Lesinæ Rtr. 146 Dalm.
 28 judæum Rtr. 146 Liban.

- 29 minutissimum—Aubé Rtr. 146 F.
 30 liliputanum Rtr. 146 Dalm.
 31 striolatum Rtr. Vien. 84. 84 E.
 32 fulvum—Schm Ber 159. 49 Rtr 147 Carn.
 33 Sanleyi Rtr. 147 Croat.
 34 pygmæum Slc. Heyd. 93 Rtr. 147 E.
 35 caucasicum Slc Led 139 Rtr 148 Cauc.

Cephenarium Slc.

- 36 apicale—Rtr. 148 Tosc
 latum Slc.
 37 Carraræ Rtr. Vien. 84. 84 Apen.
 38 latum Mots Mosc 51. 598 Rtr 148 Carn.
 ? fulvum Schm. Stet. 55. 20.
 39 Anbei—Rtr. 149 Corse.
 40 minimum—Rtr. 149 Corse Sard.
 41 atomarium Slc. Rtr. 149 Port.

Nanophthalmus Mots.

- 42 armeniacum Rtr. Vien. 84. 84 Cauc.
 43 rotundicolle Rtr. 149 Casp.
 44 megaloderodes Mts Rtr. 150 R^a Cauc.
 ditomum Slc. Led. 139.

376. NEURAPHES Thoms.

- 1 angulatus—Mulr 18 Rtr 150 Eur^m méd.
 Wighami Denny 71.
 impressus Sahl. Fen. 98.
 2 rubicundus Schm. 13 Rtr. 151 SA.
 Sharpi Slc.
 3 carinatus Muls. Op. 12. 66 Rtr 151 F.
 glyptocephalus Slc.
 4 georgicus Slc. Led. 141 Rtr 151 Casp.
 5 lederianus Rtr. 151 Cauc.
 6 solitarius Rtr. 152 Port.
 7 frondosus Rtr. 152 E.
 8 balæna Slc. Led. 140 Rtr. 152 Cauc.
 ? 4-collis Mots. Mosc. 45. 47.
 9 eximius Rtr. 152 Cauc. Casp.
 10 antennalis Slc Led 140 Rtr 153 Cauc.
 11 elongatulus—Muls. 19 Rtr. 153
 Merkli Slc. [Eur^m méd.
 Grimmeri Grim. Steier. 41. 37.
 12 semicastaneus Rtr. 153 Croat.
 13 planiceps Rtr. Vien. 84. 84 I.

- 14 filicornis Rtr. 153 Herzég.
 15 regalis Rtr. 154 Cauc.
 16 delphinus SicVien.79.469 Rtr 154 »
 17 Nakeralæ Rtr. Vien. 84. 85 Cauc.
 18 colchicus SicVien 470Rtr154 Cauc.
 19 Capellæ Rtr. 153 Antr.Carn.Croat.
 20 Emonæ Rtr. Vien.84.85 Croat.
 21 plicicollis Rtr 166 Balcans.
 22 ornatus Rtr. 166 Servie.
 23 nodifer Rtr. 156 Bulg.
 24 parallelus Chd.Rtr.156 AMorav.R.
 25 longicollis Mots. Rtr. 157 BFAR.
 præteritus Rye. MM. 9. 5.
 Sparshalli Schm.
 26 leptocerus Rtr. 157 I Mehad.
 27 occipitalis SicLed140 Rtr158 Cauc.
 28 tenuicornis Rtr. 158 Sard.
 29 myrmecophilus-Anbé Rtr159AlpM.
 Mulsanti Rtr. 163 Hyères.
 longicollis Mots. Op. 61. 65.
 30 Margaritæ Rtr. 159 Alg.
 31 sulcatus FrmFr61.579Rtr558 F.
 cordubanus Sic.Rtr.168 Eur.
 subsulcatus Rtr. 168 E.
 32 proximus-Rtr. 159 Corse.
 33 similis-Rtr. 160 Corse.
 similis Sic.
 34 tritonus Rtr 160 Corse Dalm.
 microgenes Sic. Montén.
 35 Titan Rtr. 161 E.
 36 pusillimus Rtr. 161 G.
 37 geticusSic Rtr162HongCaucCroat.
 clandestinus Schm. Sic.
 38 asturiensis Reitr. 162 E.
 39 œdicerus Sic. Heyd.92 Rtr162 Port.
 40 strictus Frm Fr61.580Rtr162 Pyr.
 41 dubius-Rtr. 163 Corse.
 42 Flamini Rtr. Vien.84.85 Apen.
 43 Brucki-Rtr. 163 Tosc.
 44 subcordatus-Frm59.235 Rtr164 F.
 45 ventricosusRotbRép 39Rtr164 Sic.
 46 Yermolovi SicLed141 Rtr164 Cauc.
 47 subparallelus Sic. Rtr. 165 Hong.
 48 latitans Sic. Dts.78.46. Rtr. 165 »
 49 subtetratomus Rtr. Vien.84.86 G.
- 50 ♂sulcipennis-Rtr165 DalmMont.
 ♀ flaveolus Rtr.
 51 tricavulus Rtr.166 Banat. Montén.
 52 bulgaricus Rtr. 166 Bulg.
 53 Hopfgarteni Rtr. 167 Carn. Croat.
 54 Diocletianus Rtr 167 Dalm.
 55 Sparshalli-Denny66Rtr167EurCent.
 helvolusSchmGermZeits.v.467.
 56 parilis Rtr. Deuts. Ins. 171 E.
 57 minutus Chd. Rtr. 168 AHong.R.
 pumilio Schm. Stet. 46. 356.
 58 nigrescens Rtr. 168 Mehad.
 59 Revelierei-Sic. Rtr. 169 Corse.
 60 vulneratus Rtr. Vien.84.87 Corse.
 61 profanus Rtr. Deut. Ins. 171 GDalm.
- 377. SCYDMÆNUS Latr.**
- Cyrtoscydmus* Mots.
- 1 Godarti-Latr. Rtr. 169 Eur^m méd.
 2 ægyalius Rtr. Vien.84.87 G.
 3 scutellaris-Mulr23Rtr170Eur^mméd.
 4 Helferi-Schm.7.Rtr.170 Eur^mMad.
 Raymondi Sic. Rép. 36.
 5 BarnevilleiSicRtrVien84.87Fméd.
 6 collaris-Mulr.26 Rtr.171 Eur^mméd.
 punctipennis Steph. Ill. v. 428.
 Dalmanni Gyl. iv. 320.
 propinquus Ch. Mosc. 45'. 183.
 tuberculatus Chd.Mosc.45'.183.
 Chevrieri Heer 368.
 7 pusillus-Mulr.25 Rtr.171 Eur.Nat.
 crassimanus-Rtr. Vien. 80. 220
 flavicornis Mots. Mosc. 45. 49.
 minutus Gyl. i. 286.
 Steveni Koln. Mel. III. 32.
 8 Poweri Fowl M.M.84.247Rtr214 B.
 9 protervusCoqFr60.146Rtr171E^maf.
 furtivus Coq. Fr. 60. 147.
 v truncatus Coq. Fr. 60. 145.
 10 andalusicus Rtr. Vien.84.87 E.
 11 cribrumSicVien79.470Rtr172 Cauc
 12 Appli Rtr. 172 Beyrou.
 13 Tythonus Rtr. Vien. 84. 88 E.
 14 Damryi-Rtr. 172 Corse.
 15 Kunzei-Gen.Schn 15 Rtr.172Sard.

- 16 *Baudii*-Rtr. 172 Sard.
 17 *semipiceus* Rtr. Vien. 84. 87 Cauc.
 18 *Macedo* Rtr. Vien. 84. 88 Er.
 19 *lustrator* Rtr. 173 Beyrout.
 20 *frater* Rtr. 173 Beyrout.
 21 *leptoderus* Rtr. 173 Syr.
 22 *microphthalmus* Rtr. 173. Corse.

Stenichnus Thoms.

- 23 *angustatus*-Luc. Coq. Fr. 60. 149 Rtr.
 24 *ditomus* Rtr. 174 Oran. [74 Alg.
 25 *ellipticus* Rtr. Vien. 84. 88 Cauc.
 26 *coreyreus* Rtr. 174 Corfou.
 27 *cordicollis* Ksv Fr 51. 397 Rtr 175 Pyr.
 28 *rotundipennis*-Schm. Rtr. 175 G.
 29 *dichrous* Baudi Rép. 38 Rtr 170 Cyp.
 30 *anguilmanus* Rtr. Vien. 84. 89 G.
 rotundicollis Kiesw.
 31 *Emgei* Rtr. Kiesw. 84. 89 G.
 32 *exilis*-Er. Brand. 254 Rtr. 176 Eur.
 bicolor Denny 68.
 croaticus Hampe Stet. 50. 331.
 vicinus Chd. Mosc. 45'. 184.
 semipunctatus Fairm Fr 59. 236'.
 33 *angustior* Slc. Heyd. 90 Rtr. 176 E.
 convexicollis Rtr. Vien. 79. 538.
 lusitanicus Slc. Heyd 90 Rtr 176.
 34 *amplithorax* Rtr. Vien. 84. 89 Syr.
 35 *picipennis* Rtr. 176 Casp.
 36 *lernæus* Slc. Rtr. Vien. 84. 89 G.
 37 *globulipennis* Rtr. 177 Corse.
 38 *Ehlersi* Rtr. 160 Port.
 39 *Truquii* Baudi Rép. 37 Rtr. 177 Cyp.

378. *EUCONNUS* Thoms.*Napochus* Thoms.

- 1 *chrysocomus*-Slc. Rép. 39 Rtr. 178
 [FCauc.
 2 *claviger*-Mulr. 14 Rtr. 178 Eur^a méd.
 denticornis Thoms. Skand. iv. 88
 3 *barbatulus* Rtr. 178 Casp.
 4 *indocilis* Rtr. Vien. 84. 90 Syr.
 5 *cornutus* Slc. Rtr. 178 Eur^a F.
 6 *Mæklini*-Manh. Rtr. 179 Eur^a méd.
 claviger Thoms. Skand. iv. 87.
 7 *Pharaonis*-Mots. Rtr. 179 Egyp.

Euconnus Thoms.

- 8 *Motschulskvi*-Stm. Rtr. 179 Austr.
 v *Kiesenwetteri* Ksw. Fr. 51. 399.
 9 *punicus* Rtr. 179 Dalm^a.
 10 *pulcher* Rtr. 180 G^a.
 11 *denticornis*-Mulr. Rtr. 181 Eur. méd.
 ♂ *Dennyi* Steph. Ill. v. 83.
 ♀ *ruficornis* Denny. 59.
 v *suramensis* Rtr. Cauc.
 12 *similis* Weise Rtr 181 Alp. mar Carn.
 13 *robustus* Slc. Rtr. 182 Cauc.
 14 *Schlosseri* Rtr. 182 Croat. Dalm.
 15 *Heydeni* Slc Heyd 90 Rtr 182 E^a Port^a.
 16 *Paulinoi* Rtr. Vien. 84. 90 Port.
 17 *hospes* Slc. Heyd. 92 Rtr. 183 E^a.
 18 *promptus* Coq Fr 60. 148 Rtr 183 E^a Af.
 19 *spissicornis* Coq. 149 Rtr. 184 Tang.
 20 *prolixus* Rtr. Vien. 84. 90 Syr.
 21 *Ganglbaueri* Rtr. 183 Syr.
 22 *nebulosus* Rtr. Vien. 84. 91 Maroc.
 23 *Alcides* Slc. Heyd. 92 Rtr. 183 E^a.
 24 *Lœwi*-Ksw Fr 51. 398 Rtr 184 Pyr^a.
 25 *Ferrarii* Ksw. Rtr. 184 Pyr^a M^a Viso.
 26 *rutilipennis*-Mulr. 17 Rtr. 184 FA.
 27 *sanguinipennis* Rtr. 184 Dalm^a.
 28 *hirticollis*-Illig. Stm. 17 Rtr 184 Eur.
 minutus F. S. El. 1. 292.
 subtilis Grim. Steier. 41. 37.
 v *finetarius* Ch l. Mosc 45'. 189 R^a.
 29 *confusus*-Bris. Rtr. 185 Eur^a méd.
 30 *Langei* Rtr. Vien. 84. 91 Syr.
 31 *Wetterhali*-Gyl. Schm. 24 Rtr. 185
 hirtus Sahl. Fen. 1. 97. [Eur. nat.
 quadratus Mulr. 13.
 32 *intrusus*-Schm. Rtr. 55 Eur. As. Af.
 Schaumi Luc. Alg. 132.
 abditus Coq. Fr. 60. 148.
 ♀ *tritonus* Ksw. Fr. 51. 400.
 33 *Peyroni* Rtr. Vien. 84. 91 Syr.
 34 *nanus*-Schm. Rtr. 186 Eur. méd.
 exilis Schm. 27. [Dalm. Casp.
 minimus Chd. Mosc. 45'. 191.
 suturellus Mots. Et. II. 18 R^a.
 gibbulus Mots. Mosc. 45'. 191.

Tetramelus Mots.

- 35 oblongus—Sturm. Rtr. 186. ATyr.
 Pandellei FairmFr.59.33. [Pyr.
 36 Gredleri Rtr. 187 Tyr.
 37 transylvanicus Slc. Rtr. 187 Carp.
 38 Schiœdtei Ksw. Rtr. 187. Pyr. Alp.
 distinctus Tourn. Fr. 59. 97'.
 39 Bedeli Rtr. Vien. 84.91 Alp.mar.
 40 pubicollis—Mulr 21 Rtr187 Eur.méd.
 41 styriacus—Grim. Rtr. 187 CarpA'p.
 42 nikitanus Rtr. 188 Montén.
 43 microcephalusRtr188Dalm^eHerzég.
 44 Thomayi Rtr. 188 Croat.
 45 brenskeanus Rtr. 188 G^e.
 46 Simoni Rtr. 189 E.
 47 hæmatodes SlcHeyd 90Rtr189 Port.
 48 dorothanus Rtr. 189 Dalm^e Herzég.
 49 Marthæ Rtr. 189 Corf. Cephal.
 50 argostolius Rtr. 190 Cephal.
 51 Linderi—Slc. Rép. 38 Rtr. 190 F^e.
 52 subterraneus Rtr. 191 I. Lesina.
 53 Reitteri—Slc.Led.141 Rtr.191 Cauc.
 54 Kraussi—Rtr. 192 Cauc.
 55 pravus Rtr. 191 G^e.
 56 laticeps Slc.Heyd.91 Rtr.192 Port.
 57 distinguendus Slc Heyd 91Rtr192 »
 58 navaricus Slc.Heyd.92 Rtr192 Port.
 59 hæmaticus Fairm. Rtr. 192 Pyr.
 muscorum Fairm. Fr. 61. 879.
 60 Delarouzei Bris. Rép. 41. F^e.
 61 Kraatzi Slc. Rtr. 193 E^e.

379. EUMICRUS Cast.*Microstemma* Mots.

- 1 tarsatus—Mulr.11.Rtr.193 Eur^eméd
 tauricus Mots. Mosc. 45. 48.
 Helwigi Latr. Crust. 1. 282.
 minutus Panz. Fn. 23. 5.
 piceus Marsh. Brit. 486.
 2 vulpinus Schm. Rtr. 193 Arab.

Eustemma.

- 3 antidotus—GermSchm25Rtr193 SicE
 4 Olivieri Rtr. 193 Alg^e.
 5 punctipennis Frm. Rtr. 194 Tunis.
 6 Georgi—Rtr. 194 Alg^e.

- 7 camelus Rtr. Vien. 84.93 Palest.
 8 conspicuus—Schm Rtr.194 E^eA^loo.
 9 Goliath Rtr. Vien. 84. 93 Alg.
 10 parmatos Rtr. Vien.84. 93 Alg.
 11 Turki Rtr. 194 Syr.
 12 spartanus—Slc. Rtr. 194 Taygète.
 13 arachnipes Rtr. Vien. 84. 93 Syr.

Heterognathus King.*Cholerus* Thoms.

- 14 rufus—Mulr.10 Rtr. 193 Eur.Perse.
 clavatus Sahl. Fen. 1. 98.
 Fleischeri Fleisch.Mosc 29.72.
 ægilis Mots. Mosc. 51. 505.
 15 Perrisi—Rtr. 195 F. G. Hong.
 16 Helwigi—F.Storm5Rtr195A^eGHong
 17 castanicolor HarRép40 GomHierr.
 castaneus Wol. Atl.65. App.66.
 18 cornutus—Mots. Rtr. 196 F.Eur^e.
 cerastes Baudi Rép. 40. Sard.

380. EUDESIS Rtr.

- 1 aglena Rtr. 196 Corse.

381. LEPTOMASTAX Piraz.*Pilades* Fairm.

- 1 hypogæus—Piraz 55. 1 Rtr.197 I^a.
 ♀ melhadiensis Friv. Fuset III.
 2 nemoralis Rtr. 197 I^a [180 Hong^e.
 3 Grenieri—Slc. Rtr. 197 Corse Sard.
 4 sublævis Rtr. 197 Nice.
 5 Delarouzei Bris. Rtr.197 Pyr^e.
 6 Raymondi Slc. Rép.36 Rtr.197 F^e.
 7 grandis Simon. Rtr. 197 I. méd.
 8 bisetosus Rtr. Vien.84.93 Corfou.
 9 syriacus Simon. Deuts.81.150 Rtr.
 10 bipunctatus Rtr. 197 G. [197 Syr.
 11 Coquerelli Fairm. Rtr.198 G.Nat.
 12 Stussineri Rtr. 199 Dalm^eméd.
 13 Emeryi—Simon. Rtr. 199 I^a.
 14 Kaufmanni Rtr.199 Dalm^eHerzég.
 15 Simoni Stussin.Rtr.199DalmGSyr.
 16 lapidarius Rtr. 199 Syr.
 17 4—striatus Rtr. Vien. 84. 64 Syr.

382. ABLEPTON Friv.

- 1 TrefortiFrvBer77.18Rtr200 Hong^e

383. **MASTIGUS** Latr.

- 1 pilifer KrDeats 79.371 Rtr 200 I^méd.
 2 Heydeni-Roth Berl 70.233 Rtr 200 I^m.
 Silæ Stussin.
 3 prolongatus-Gory Rtr. 204 E^mPort.
 4 palpalis-Latr. 1.281 Rtr. 201 Eur.
 ♀ acuminatus-Mots. Et. 59.131.
 5 ruficornis-Mts. Rtr. 201 I^m Alp. mar.
 liguricus-Fairm. Fr. 59'. 216.
 6 dalmatinus-Heyd. Rtr. 20. I. Dalm.

SILPHIDÆ

Leptoderi

384. **LEPTODERUS** Schmidt.

Stagobius Schiœdte.

- 1 Hohenwarthi-Scht. Sturm. 6 Carn.
 troglodytes Schiœd. 49. 15.
 v Schmidt Mot. 7.
 2 angustatus-Scht. Sturm. 7 Carn.
 v Robici Joseph. Carn.

Propus Ab. Per.

- 3 sericeus-Scht. Sturm. 8 Carn.
 v intermedius-Hampe. Croat.

385. **ANTROCHARIS** Ab. Per.

- 1 Querilhaci-Lespès Frm. 10 Ariège.
 2 dispar Ab. Per. 10 Ariège.
 3 Mestrei Ab. Per. 10 Aude.

Draprysius Ab. Per.

- 4 caudata-Ab. Per. 11 Ardèche.
 5 caudatissima-Ab. Per. 12 Ardèche.

386. **ORYOTUS** Milr.

- 1 Schmidt-Milr. 13 Carn.

387. **CYTODROMUS** Ab. Per.

- 1 dapsoides Ab. Per. 14 Drôme.

388. **PHOLEUON** Hampe.

- 1 Pluto Reitr. 15 Croat.
 2 leptoderum-Friv. 16 Hong
 3 angusticollis-Hampe. 17 Hong.
 4 gracile Friv. Ab. 4. 21' Hong.
 5 Merkli Friv Term Fuzet. 3. 232 Balk.
 v affine Friv.
 v simile Friv.

389. **DRIMECTUS** Milr.

- 1 Kovacsi-Milr. 18 Hong.
 2 Kraatzi-Friv. 18 Hong.

390. **SPELEOCHLAMYS** Dieck.

- 1 Ehlersi Dieck. 20 E^m.

Leptini.

391. **PLATYPSYLLA** Gitzema.

- 1 castoris-Ritz. Lec. 24 F^m Hol. Canada.

392 **LEPTINUS** Mulr.

- 1 testaceus-Mulr. Thms. 25 FA.
 2 caucasicus Mots. 26 Cauc.

Catopsi.

393. **BATHYSZIA** Schiœdte.

Adelops Tellk.

Aphaobius Ab. Per.

- 1 Milleri-Scht. 27 Carn.
 2 acuminata-Milr. 28 Carn.
 3 byssina Schdt. Milr. 28 Carn.
 4 globosa Milr. 29 Garint.
 5 Freyeri-Milr. 29 Carn.
 6 croatica Milr. Ab. 6. 106 Croat.
 7 Khevenhulleri-Milr. 29 Carn.
 8 narentina-Milr. Ab. 4. 21 Dalm.
 pruinosa Schf. N. Ot. 1. 35
 9 dorotkana Reitr. 30 Herzég.
 10 celata-Hampe Ab. 1. 109 Croat.
 Erberi Schf. N. Ot. 1. 34 Dalm.
 11 tarsalis-Kiesw. 31 M^mRos.
 Kerimi-Fairm. 31.
 12 montana-Schiœd. Milr 32 Carn.
 13 Hoffmanni-Mots. 32 Carn.
 14 sylvestris-Mots. 32 Carn.
 15 Karamani Reitr. Dts. 84. 116 Dalm.
 16 Lesinæ Reitr. 32 Dalm.
 17 hungarica-Reitr. 33 Hong^m.
 18 insignis Friv Term Fus. 181 Hong^m.
 19 Paveli Friv. Term. Fus. 183 Hong^m.
 20 Kerkyrana Reitr. 34 G.
 21 Doderoi Fairm. 34 I.
 22 Dorizæ-Fairm. 35 I.
 23 Spagnoloi Fairm. 35 I.

- 24 *sarteanensis* Barg. Ab. 17. 87 I.
 25 *muscorum* Dieck. Rép. 51 I
-
- 26 *Ehlersi* Ab. Per.-Rép. 44 Ariège.
 27 *Bonvouloiri-Duv.* 36 Pyr.
 28 *Diecki-Saulc.* Ab. Rép. 45 Ariège.
 29 *pyrenæa-Lesp.* Fmr. 37 Ariège.
 30 *Discontignyi* Saulc. Rép. 45 H. Pyr.
 31 *Barnevillei* Saulc. Rép. 45 Ariège.
 32 *longicornis-Saulc.* Rép. 47. Ariège.
 33 *Saulcyi* Ab. Per. Rép. 47. Ariège.
 34 *Abeillei-Saulc.* Rép. 48. Ariège.
 35 *clavata-Saulc.* Rép. 48. Ariège.
 36 *stygia-Dieck.* Rép. 52. Ariège.
 37 *zophosina* Saulc. Rép. 49. Ariège.
 38 *speluncarum-Delar.* 37 Pyr.
 39 *Peyroni* Ab. Per. 38 Liban.
 40 *persica* Ab. Per. 38 Perse.
 41 *Proserpinæ* Ab. Per. 38 Aude.
 42 *Schiœdtei-Kiesw.* 39 Pyr.
 grandis Fairm. Fr. 56. 525.
 depressa Fairm.
- 43 *meridionalis* Duv. 39 F.
 44 *Grenieri* Saulc. Rép. 50 Pyr.
 45 *subasperata* Saulcy Rép. 50 Ariège.
 46 *Larcenei* Ab. Per. 39 Gers.
 47 *ovata-Ksw.* 40 Pyr.
 48 *lapidicola-Saulc.* Rép. 51 Ariège.
 49 *inferna-Dieck.* Rép. 46 Ariège.
 50 *Delarouzei-Fairm.* 41 Pyr.
 51 *9-fontium-La Brûl.* 41 Ariège.
 52 *Perieri-La Brûl.* 42 Ariège.
 53 *curvipes-La Brûl.* 42 Ariège
 v subcurvipes-Ab. Per. 43 Aude.
 v subrectipes Ab. Per. 43 Aude.
- 54 *Pandellei* Ab. Per. 43 Ariège.
 55 *Piochardi* Ab. Per. 44 Ariège.
 56 *hermensis* Ab. Per. 44 Ariège.
 57 *crassicornis* La Brûl. 44 Ariège.
 58 *oviformis* La Brûl. 45 Ariège.
 59 *lucidula* Delarouz. 45 Hérault.
 60 *galloprovincialis-Fairm.* 46 Var.
 61 *asperula* Fairm. 46 Pyr.
 62 *Hecatæ* Ab. Per. 46 Aude.
 63 *corsica-Ab.* Per. 47 Corse.
- 64 *Aubei-Ksw.* 47 Var.
 65 *ovoidea* Fairm. 47 F.
 66 *epuræoides* Fairm. 48 F.
 67 *subalpina* Fairm. 48 Alp.
 68 *Simoni* Ab. Per. 48 Cantal.
 69 *Tarissani* Bedel 49 Drôme.
 70 *Villardi* Bedel 49 Bugey.
 71 *Chardoni* Ab. Per. 50 Aude.
 72 *Lindéri-Ab.* Per. 50 Ardèche.
 Mayeti Ab. Per. 50 Ardèche.
 73 *aletina* Ab. Per. 51 Aude.
 74 *Grouvellei* Ab. Per. 51 Alp.
 75 *brevicollis-Ab.* Per. 51 Alp.
-
- 76 *Gestrof-Fairm.* 52 Sard.
 77 *Damryi* Ab. Per. 52 Sard.
 78 *mialetensis* Ab. Per. 52 Gard.
 79 *Destefanii* Rag. 52 Sic.
 80 *Kiesenwetteri* Dieck.-Rép. 49 Pyr.
 81 *Dohrni* Schf. 53 Pyr.
 Bonvouloiri-Schf. Berl. 61. 426.
- 82 *triangulum* Sharp. Ab. 17. 27 E.
 83 *vasconica* La Brûl. 53 E.
 84 *Crotchi* Sharp. Ab. 17. 28 E.
 85 *Cisnerosi-Per.* Arc. Ab. 17. 17 E.
 86 *arcana-Schf.* 54 E.
 87 *Perezi* Sharp. Ab. 17. 28 E.
 88 *adnexa* Schf. 55 E.
 89 *rugosa* Sharp. Ab. 17. 29 E.
 90 *Uhagoni-Sharp.* Ab. 17. 29 E.
 91 *flaviobrigensis* Uhag. 55 E.
 92 *Mazarredoi* Uhag. 56 E.
 93 *flicicornis* Uhag. 57 E.
 94 *Seeboldi* Uhag. 58 E.
 95 *cantabrica* Uhag. 59 E.
 96 *tropica* Ab. Per. 60 E.
-
- 97 *Wollastoni-Jans.* 61 BF.
-
- 98 *pusilla-Mots.* 61 Caucase.
394. **CATOPS** Payk 62
 Choleva Latr. 66.
- 1 *spadicus* Sturm. 66 FAR.
 2 *punctatus* Bris. Rép. 55 E.

- 3 angustatus**-F. Mur. 66 Eur. Sib.
agilis F. S. El. II. 20.
elongatus Payk. I. 345.
castaneus Sturm. pl. 273.
v intermedius Kr. 67 FAR.
v cisteloides Froehl. 68 Eur. Mad.
v humeralis Brul. 68 G.
- 4 nivalis** Kr. 68 A.
- 5 angusticollis** Kr. 69 E*.
- 6 Sturmii**-Bris. Ab. I. 11 FBelg.
- 7 norwegicus** Sparre SBelg.
- 8 cuneiformis** Fairm. 70 Sic.
- 9 agilis**-Illig. 70 Eur.
fuscus Gyl. I. 281.
testaceus Latr. Gen. XI. 28.
- 10 orchesioides** Fairm. 71 Alg°.
- 11 canellinus** Fairm. 72 Alg.
- 12 lateritius** Mén. Mur. 72 Casp.
- 13 acicularis**-Kr. 73 E. Sic. Alg.
- 14 strigosus**-Kr. Mur. 73 A.
- 15 gracilis** Kr. 74 E*.
- 16 græcus** Kr. 75 G.
- 17 costatulus** Kr. 75 Alg°.
- 18 velox**-Spence Mur. 75 Eur Mad.
- 19 notaticollis** Baudi Ab. 13.52 Chyp.
- 20 dorsiger**-Mars. Ab. I. 12' Palest.
picticollis Sauc. Fr. 64. 426.
amplicollis Band. Berl. 64. 226.
- 21 badius**-Sturm. Mur. 76 A.
- 22 præcox**-Er. Mur. 77 Eur.
Wilkini Spence 157.
- 23 fungicola** Koln. Mur. 78 Cauc.
- 24 Lederi** Weise 78 Cauc.
- 25 brunneus**-Sturm. 79 Hong.
- 26 sulcipennis** Fairm. 79 Alg°.
- 27 cribratus** Sauc. Ab. Rép. 53 Palest.
- 28 subcostatus** Reiche Rép. 53 Alg°.
- 29 conjungens** Saucy Rép. 56 Palest.
- Ptomaphagus** Helw.
- 30 Bugnioni** Tourn. Ab. 14. 13 FSuis.
- 31 picipes**-F. Mur. 80 Eur.
striatus Duft III. 74.
blapsoides Germ. Spec. 84.
- 32 meridionalis**-Aubé Mur. 81 FESic.
- 33 grandis** Reitr. 82 G*.
- 34 andalusicus** Heyd. 82 E*.
- 33 depressus**-Mur. 83 F.
- 36 fuscus**-Panz. Mur. 84 Eur.
sericeus Payk I. 342.
rufescens F. S. El. II. 563.
festinans Gyl. IV. 314.
- 37 pallidus** Mén. 85 Cauc.
Menetriesi Fald. 85.
rufus Kr. 85. F.
- 38 umbrinus**-Er. Mur. 87 FAR*.
- 39 flavicornis** Thoms. Rép. 56 S.
- 40 femoralis** Thoms. 87 Lap.
- 41 nigricans**-Spence Mur. 88 Eur.
v longipennis ChdMsc 45. 196' Cauc
v fuliginosus-Er. Brand. 239 A.
v caliginosus Steph. III. III. 12 B.
v soror Newm. Mag. I. 508 B.
- 42 coracinus**-Keln. Mur. 89 Eur.
- 43 nitidicollis**-Kr. 90 F.
- 44 morio** Fr. Mur. 90 Eur. Sib.
dissimulator Spence. 150.
sericeus Gyl. Suec. IV. 313.
- 45 quadraticollis**-Aubé Mur. 91 F.
- 46 nigrita**-Er. Mur. 91 Eur.
tristis-Gyl. Suec. IV. 311.
morio Payk Suec. I. 344.
- 47 grandicollis**-Er 92 FAHelv.
- 48 Kraatzi** Reitr. 93 G*.
- 49 chrysomeloides**-Panz. Mur. 93 BFA
- 50 longulus**-Keln. 94 A. [Helv.
pilicornis ThomsSkand. IV. 61 S.
- 51 tristis**-Panz. Er. 95 Eur.
Leachi Spence 148.
nigrita Sturm. II. 24.
v abdominalis Rosh. I. 22 Tyr.
v montivagus Heer. 381 Helv.
- 52 rotundicollis**-Kln. 96 Eur^{méd.}
Kirbyi Spence 148.
- 53 neglectus**-Kr. Mur. 96 FA.
- 54 alpinus**-Gyl. Mur. 97 Eur.
subfuscus Kln. Stet. 8. 177.
- 55 ventricosus** Weise 98 CaucTransyl.
- 56 fumatus**-Er. 98 Eur
agilis F. Gyl. I. 277.
Watsoni-Spence 156.

- 57 pinicola-Wol. Atl. App. 12 Tén.
 58 ambiguus Heer 99 Helv.
 59 scitulus Er. Mur. 99 BFA.
 fumatus Spence 155.
 60 brevicollis Kr. 100 Sic.
 61 nivicola Kiesw. 101 G.
 62 lucidus Kr. 101 Dalm.
 63 præustus Kr. 102 Mésop.
 64 validus Kr. Mur. 103 Hong.
 65 Pelopis Reitr. 103 G.
 66 varicornis-Rosh. Mur. 104 BAR.
 67 sericeus-F. Mur. 105 Eur.
 truncatus Illig. Mag. 1. 42.
 villosus Latr. Gen. 11. 29.
 picipes Kugel. Schu. 558.
 silphoides Marsh. 493.
 v sericatus Ghd. Mosc. 45. 3.
 68 tenuicornis Rosh. 106 E.
 69 anisotomoides-SpenceMur107Eur.
 70 colonoides-Kr. Mur. 107 Eur^{méd.}
 71 Vandalitiæ Heyd. 108 E.
 72 creticus Heyd. 109 Grète.
 73 marginicollis Luc. Mur. 109 Alg.
 74 fuscipes Mén. Mur. 110 Casp.
 75 pusillus Mots. Mur. 110 Cauc.
 76 dauricus Mots. 110 Mong.
 77 clathratus Per. Rép. 54 E.
 78 frater Newm. Mag. 1. 507. B.
- 395. CATOPSIMORPHUS Aubé.**
- 1 orientalis-Aubé 111 T.
 2 dalmatinus-Kr. 112 Dalm.
 3 judæus Saulc. Rép. 59 Palest.
 4 samaritanus Saulc. Rép. 60 Palest.
 5 Michoni-Saulc. Rép. 61 Palest.
 6 incisipennis Saulc. Rép. 62 Palest.
 7 bicolor Kr. 112 E.
 8 arenarius-Hampe Sib. 52. 140 FA.
 pilosus Muls. Fairm. 113.
 9 georgicus Weise 113 Cauc.
 10 Marqueti Fairm. 114 F.
 11 Bedeli Fairm. 114 Alg.
 12 Josephinæ Saulc. 115 F.
 13 Rougeti-Saulc. Ab. 1. 71' F.
 14 rufipennis-Luc. Mur. 116 Alg.
- 15 formicetorum-Peyr. 116 F.
 ♀ Fairmairei Delar. Fr. 60. 32'.
 16 myrmecobius Rotb. Rép. 62 Sic
 17 curticornis Fairm. 117 T.
- 396. COLON Herbst.**
Myiachus Latr.
- 1 bidentatus Sahl. Kr. 118 SEur. méd.
 2 viennensis-Herbst. Kr. 118 EurSyr.
 ♀ languidus Er. Brand. 231.
 3 puncticollis Kr. 119 FA.
 dentipes Er. Brand. 147.
 4 serripes-Sahl. Kr. 120 Eur^{méd.}
 ♂ simplex Thoms. Skand. 71.
 ♀ fuscus Er. Brand. 250.
 v Kraatzi Tourn. Fr. 63. 140 E.
 5 myops Czwal 121 Cauc.
 6 microps Czwal 122 B.
 7 angularis-Er. Kr. 123 FAR.
 v rectangulusGhdMsc45. 201' Volh
 8 claviger Herbst. Kr. 123 FAHelv.
 9 affinis-Sturm. Kr. 124 F^AHelv.
 confusus-Fairm. Fr. 57. 730.
 10 pubescens-Luc. 125 Alg.
 11 griseus Czwal 125 F^ADalm.
 12 armipes Kr. 126 A.
 13 appendiculatus-Sahl. Kr. 127 BS
 14 calcaratus Er. Kr. 128 A. [FAR^a.
 ♀ pygmæus Er. Brand. 251.
 v nanus-Er. Brand. 251.
 15 dentipes-Sahib. Kr. 128 Eur^a.
 spinipes Halid. Newm. 190.
 ♀ brevicornis Sahl. Finl. 93.
 v Zebei-Kr. 129 FA.
 v Barnevillei-Kr. Fr. 63. 147.
 v Lentzi Czwal A.
 v firmus Czwal Cauc.
 16 rufipes Czwal 130 E.
 v minor Czwal.
 v opacus Czwal.
 v nitidus Czwal.
 17 fuscicornis KrStet. 52. 445 FAHelv
 pubescens Kr. 131.
 18 emarginatus Rosh. 132 E.
 19 murinus-Kr. 133 FA Sic.
 20 denticulatus Kr. 134 FA.

- 21 brunneus-Spence Kr. 135 FAHelv.
 22 episternalis Czwal 135 A.
 23 rufescens Kr. 136 FAHelv.
 24 latus-Kr. 137 A.
 25 Delarouzei-Tourn. 137 A.
 26 sinuatus Chaud. 138 R.
 27 subdepressus Chaud. 138 R.

Silphi.

397. PTEROLOMA Gyl.

- 1 Forstroëmi-Gyl. M. 139 SRⁿSib.
 brunneum Fisch. Ent. III. 243.
 Gravenhorsti Schil. Schles. 93.
 2 pallidum Esch. 140 Kants.

398. NECROPHILUS Latr.

- 1 subterraneus-Dahl. M. 141 FAHelv.
 2 picipes Mots. 141 Daur.

399. SILPHA L. 142.

Dendroxena Mots. 146.

- 1 4-punctata-L. M. 147 Eur. Sib.
 4-maculata Samouelle 167.
 4-punctulata Mulr. Prod. 63.
 v 6-carinata Mots. Et. IX. 40.

Phosphuga Leach. 148.

- 2 lævigata-F. M. 148 Eur.
 polita Sulz. 28.
 v gibba-Brul. Mor. 162 G.
 3 cribrata-Mén. M. 149 GCauc.
 4 atrata-L. M. 150 Eur.
 v brunnea-Herbst. v. 202 Sib.
 fusca Herbst. v. 200.
 v punctata Herbst. v. 199.
 v cassidea Kr. Dts. Zeits. 76. 362.
 v subrotundata Steph. Ill. III. 29 B.
 v pedemontana F. El. I. 339 Iⁿ.

Olceoptoma Leach. 151.

- 5 opaca-L. M. 151 Eur. Sib.
 hirta Gmel. 1622.
 tomentosa Herbst. v. 203.
 villosa Naezen. Holm. 1792. 168.
 6 altai Gebl. 152 Altai.
 7 nuda Mots. 152 Casp.

- 8 Souverbii-Fairm. M. 153 Pyr.
 v alpicola-Kust. XVII. 27 Alp.
 9 sericea Zubk. 154 Casp.
 10 hexastigma-Solsky Ros 73. 274 Amur.
 11 reticulata-F. M. 155 Eur. Sib.
 undata Mulr. Prod. 64.
 cancellata Gmel. 1622.
 granulata Marsh. Brit. 119.
 rugosa Panz. Fn. v. 9.
 v verrucosa Mén. Fald. I. 222 Casp.
 12 turkestanica Ball. Solsk. 156 Turks.

Silpha L. 156.

- 13 carinata-Illig. M. 157 Eur. Sib.
 opaca Payk Fn. I. 336.
 marginalis Kugel Schwd Mag 305.
 tyrolensis Laicht. Tyr. II. 98.
 recta Marsh. 117.
 trilineata L. Gmel. 1627.
 griesbachiana Steph. Ill. III. 26.
 v armeniaca Koln. Mel. v. 50 Arm.
 v italica-Kust. XX. 15 I.
 v atropurpurea-Sturm Kst M 158 R.
 14 perforata-GebL. M. 159 RⁿSib.
 v mongolica Fald. 35. 29 Amur.
 15 sculptipennis Fald. M. 160 Mong.
 16 tristis-Illig. M. 160 Eur. Sib.
 v dalmatina-Kust. XXII. 17 Dalm.
 17 bicarinata GebL. 161 Sib.
 18 costata-Mén. M. 162 Cauc.
 19 orientalis Brul. M. 162 } TG.
 multipunctata Friv. Mag. 45. 182
 v turcica Kust. XXIII. 16 T [Nat.
 20 fluctuosa Schauf. 163 E.
 21 puncticollis-Luc. M. 164 EⁿAlg.
 hispanica Kust. XVII. 26.
 22 granulata-Ol. M. 164 Méd.
 variolosa Herbst. VIII. 194.
 23 nigrita-Creutz. M. 165 Alp.
 v alpina-Germ. Spec. 141 } AI.
 ? tyrolensis Laich. Tyr. 98 Tyr.
 v ambigua-Graells. Map. 58. 57 E.
 24 obscura-L. M. 167. } Eur. Sib.
 atrata Hbst. v. 183.
 littoralis Bergst. Nom. I. 24.
 25 striola Mén. M. 168 Cauc.

OLIVIER (Guillaume-Antoine), né aux Arcs, près Fréjus (Var), le 17 janvier 1756, décédé à Lyon, le 1^{er} novembre 1814, docteur en médecine, membre de l'Institut, de la Société d'agriculture de France, de la Société linnéenne de Londres, etc., professeur de zoologie à l'école vétérinaire d'Alfort, voyagea en Orient pendant six années (1792-1798), parcourut successivement les rives du Bosphore, les îles de l'Archipel, l'Égypte, l'Asie mineure, la Syrie, la Perse et rapporta de nombreuses collections dans toutes les branches de l'histoire naturelle.

1. Observations sur une maladie particulière aux haricots que l'on cultive en Provence (*Acarus phaseoli*).

1787. Soc. d'agric. de Paris. Trim. d'été, p. 50-58. + 1790. Introduction à la Feuille du cultivateur, p. 297.

2. Extrait d'un mémoire lu à l'Académie des Sciences sur les parties de la bouche des insectes.

1788. Journal de physique xxxii. p. 462-474. pl. 2. — Tiré à part. 1788. Paris. in-4° p. 12. pl. 2. — Traduit en Italien. 1788.

3. Entomologie ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée.

1789-1808. Paris. in-4°. 6 vol. avec 363 pl. col. + 1789. i p. xx. Genres 1-8. p. 497 et xxii. 63 pl. col. + 1790. ii. p. iv. Genres 9-34. p. 485 et xii. 63 pl. col. + 1795. iii. Genres 35-65. p. 557 et xxviii. 65 pl. col. + 1795. iv. Genres 66-80. p. 519 et xxiv. 72 pl. col. + 1807. v. Genres 81-92 bis p. 1-612. 59 pl. col. + 1808. vi. Genres 93-100. p. 612-1104. 41 pl. col.

Dans les quatre premiers volumes chaque genre a une pagination particulière et les planches ont, pour chaque genre, dans tout le cours de l'ouvrage, une série particulière de numéros.

Traduit en partie en allemand par Karl Illiger, 2 vol. pet. in-4°. Braunschweig, 1800-1802 (Nouv. édit. 1822), et par Jacob Sturm, 1 vol. pet. in-4°. Nurnberg, 1802-1803.

4. Encyclopédie méthodique, histoire naturelle, dictionnaire des insectes (jusqu'à l'article Paon de jour.)

1789-1811. Paris. Panckoucke-Agasse. in-4°. 5 vol. + 1790. iv. p. 332. + 1790. v. p. 794 + 1791. vi. p. 704. + 1792. vii p. 828. + 1811. viii. p. 722.

Les trois premiers volumes comprennent le dictionnaire des animaux vertébrés et le discours préliminaire à l'Entomologie par Mauduyt. Les neuvième et dixième volumes qui terminent le dictionnaire des insectes, sont de Latreille, Lepelletier de St-Fargeau, Serville et Guérin.

5. Insectes qui rongent la farine.

Journal de Fourcroy. i. p. 204-206.

Les Entom. et leurs Écrits.

6. Mémoires sur l'utilité de l'étude des insectes, relativement à l'agriculture et aux arts.
1792. Journ. d'hist. nat. 1. p. 33-56 et 241-253 (1).
7. Descrip. d'une nouvelle espèce de Cétoine (*Cetonia clathrata*). www.libtool.com.cn
1792. Journ. d'hist. nat. 1. p. 92-94. pl. 1.
8. Sur quelques nouvelles espèces de Coléoptères (*Elater mucronatus*, *E. farinosus*, *E. æneicollis*, *E. interruptus*, *Trogossita cylindrica*, *Ips gigas*, *Lycus striatus*).
1792. Journ. d'hist. nat. 1. p. 262-268. pl. 1.
9. Sur une nouvelle espèce de Scarabée (*Scarabæus Entellus*).
1792. Journ. d'hist. nat. 1. p. 292-294. pl. 1.
10. Observations générales sur les chenilles fileuses et description d'une nouvelle espèce de Bombyx (*Saturnia* du Sénégal).
1792. Journ. d'hist. nat. 1. p. 344-358. pl. 1.
11. Mémoire sur la cause des récoltes alternes de l'olivier; du tort que les olives éprouvent l'année de la mauvaise récolte.
1792. Journ. d'hist. nat. 1. p. 386-402. Sépar. p. 16.
12. Observations sur le genre Fulgore.
1792. Journ. d'hist. nat. II. p. 31-34.
13. Observations sur la culture de l'arbre à pain et des épiceries à la Guyane française.
1792. Journ. d'hist. nat. II. p. 72-80.
14. Catalogue des insectes envoyé de Cayenne par M. Le Blond, à la Société d'histoire naturelle de Paris.
1792. Actes de la Soc. d'hist. nat. de Paris. 1. p. 120-125. Trad. en allem. par Reich. Magaz. des Thierr. 1793.
15. Instruction sur la culture et la récolte du Kermès (avec Tessier et Bosc).
1808. Soc. d'Agr. du dép. de la Seine. XI. p. 105-111.

(1) Journal d'histoire naturelle ou Choix de mémoires sur divers objets d'histoire naturelle, par MM. Lamarck, Brugnières, Olivier, Haüy et Lepelletier. — Il y eut deux éditions de ce recueil, l'une format in-4°; l'autre in-8°. La pagination citée est celle de l'édition in-4°.

16. Voyage dans l'empire Othoman, l'Égypte et la Perse.
1801-1807. Paris-Agasse. 3 vol. in-4°. atl. in-f° av. 50 cart. ou pl.
+ 1801. I. p. xiv et 434. + 1804. II. p. II et 468. + 1807. III. p.
VIII et 568.
Autre édition. Paris-Agasse. 1801-1807. 6 vol. in-8°. atl. in-f°
av. 50 cart. ou pl. : 1801. I. p. xx et 394 + 1801. II. p. 380. +
1804. III. p. IV et 362. + 1804. IV. p. 456. + 1807. V. p. XVI et
486. + 1807. VI. p. 524.
Traduit en allemand (1808), en anglais (1813), en hollandais, en
espagnol, en italien (1829).
17. Sur un nouveau genre de Diptères établi sous le nom
de *Nemestria* par M. Latreille.
1810. Nouv. bull. de la Soc. philomatique. n. p. 93-94.
18. Note sur la var. de cotonnier qui se cultive à Santorin.
1813. Soc. d'Agr. du dép. de la Seine. XVI. p. 352-355.
19. Premier mémoire sur quelques insectes qui attaquent
les céréales (Dipt. 8 esp. Hymén. 2 esp.).
1813. Soc. d'Agr. du dép. de la Seine. XVI. p. 477-496. pl. 2.
Tiré à part. 1813. in-8°. Paris. p. 20. pl. 2.
20. Description et histoire naturelle de l'Aspalax.
1800. Bull. des sciences par la Soc. Phil. III p. 105.
21. Observations sur les Gerboises.
1800. Bull. des sciences par la Soc. Phil. III. p. 121.
22. Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle.
1803-1804. Paris. Détéville. 24 vol. in-8° av. pl. n.
Olivier fit dans ce dictionnaire tous les articles concernant les
insectes de l'ordre des coléoptères.
23. Notice biographique sur Olivier, par Silvestre.
Soc. d'Agr. du dép. de la Seine. Séance publique du 9 avril 1815.
24. Notice biographique sur Olivier, par G. Cuvier.
Institut de France. Séance publique du 8 janvier 1816.
25. G.-A. Olivier, membre de l'Institut de France, sa vie,
ses travaux, ses voyages, documents inédits, par
Ernest Olivier, avec portrait et autographe.
1880. Moulins. gr. in-8°. p. 98.

Olivier rapporta de ses voyages, pour le Museum de Paris, des collections sur toutes les branches de l'histoire naturelle. En ce qui concerne l'entomologie, trois mille insectes, types de ses descriptions ou inédits, enrichirent les cartons de cet établissement. Sa collection particulière fut vendue quelques années après sa mort à MM. Chevrolat et de Jouselin qui se la partagèrent exactement

individu par individu. M. Ernest Olivier a été assez heureux pour pouvoir acquérir la part de M. de Joussetin et rentra ainsi en possession de ce précieux héritage de son grand-père. Il conserve également les dessins originaux de l'Entomologie dus aux premiers peintres de l'époque, et les manuscrits de son aïeul, dont plusieurs inédits, tels que le Cours de zoologie à l'école d'Alfort et des fragments de la description de la généralité de Paris.

LE CONTE (John-Eatton), né le 22 février 1784, à Schrewsbury, dans le New-Jersey, décédé à Philadelphie, le 29 novembre 1860, major dans l'armée, a laissé des mémoires importants sur la Botanique, et l'Érpetologie, quelques-uns seulement sur les insectes.

1. Description de quelques nouvelles espèces d'insectes Coléoptères de l'Amérique du Nord (20 espèces).
1824. N. Y. An. Lyc. Nat. Hist. 1 p. 169-173. fig.
2. Histoire générale des Lépidoptères et des Chenilles de l'Amérique septentrionale. (Avec Boisduval).
1829-1842. Paris. Roret. in-8°. liv. 1-26 et pl. col.
3. Vingt-cinq nouv. espèces d'*Histérides* américains.
1844. Boston. Proc. Soc. Nat. Hist. 1. p. 185-187.
4. Monographie des *Histérides* de l'Amérique du Nord.
1845. Boston. Proc. Soc. Nat. Hist. v. p. 32-87. — Sépar. p. 56. pl. 6.
5. Descr. de nouv. espèces de la famille des *Histérides*.
1859. Phil. Proc. Ac. Nat. Soc. v. p. 310-318.
6. Nécrologie du major J. Le Conte par Sharswood, traduit de l'anglais par C. A. Dohrn.
1861. Stet. Ent. Zeit. xxii. p. 166-169.

LE CONTE (Jean-Laurent), né à New-York, le 13 mai 1825, décédé à Philadelphie (Pensylvanie), le 15 novembre 1883, docteur en médecine du Collège des Médecins et Chirurgiens de New-York, inspecteur médical et lieutenant-colonel de l'armée des États-Unis, inspecteur-adjoint de la Monnaie, etc. Membre honoraire de la Société entomologique de France (1879), et des plus importantes d'Europe; promoteur infatigable de l'étude des insectes, surtout des Coléoptères, dans sa patrie.

1. Description de nouv. espèces de Coléoptères de l'Amérique du Nord.
1844. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. ii. p. 48-53.

2. Descriptions de nouvelles espèces de Coléoptères habitant les Etats-Unis.
1844. Bost. Soc. Nat. Hist. 1. p. 201.
3. Descrip. de nouv. espèces d'insectes des Etats-Unis.
1845. Bost. Journ. Nat. Hist. v. p. 203-209 pl. 18. — Sépar. p. 7. pl. 1.
4. Catalogue descriptif de Coléoptères géodéphages, habitant les Etats-Unis, à l'est des Montagnes-Rocheuses.
1846. N. Y. Lyc. Nat. Hist. iv. p. 172-233; 334-474. pl. 13-14. — Sépar. p. 144.
5. Fragments entomolog. (Tableaux et nouv. espèces).
1847. Phil. Journ. Ac. Nat. Sc. Nouv. sér. 1. p. 71-93.
6. Monogr. des espèces de *Pasimachus*, habitant les Etats-Unis, et desc. de nouv. genres de Carabiques.
1848. N. Y. An. Lyc. Nat. Hist. iv. p. 141-154. pl. 7-8.
7. Sur certains Coléoptères indigènes des continents oriental et occidental.
1848. N. Y. An. Lyc. Nat. Hist. iv. p. 159-163.
8. Synopse des Coléoptères du groupe des *Cleridæ*, habitant les Etats-Unis.
1849. N. Y. An. Lyc. Nat. Hist. v. p. 9-35. — Sépar. p. 27.
9. Remarques générales sur les Coléoptères du Lac Supérieur.
1850. Lac Sup. Agassiz. p. 201-245.
10. Sur les *Pselaphides* des Etats-Unis. .
1850. Bost. Journ. Hist. Nat. vi. p. 64-110.
11. Essai sur la classification des Longicornes de l'Amérique, au nord de Mexico.
1850. Phil. Journ. Ac. Sc. Nat. 1^o *Cerambyci*. 1. p. 311-340; II. p. 5-58; 2^o *Prioni*. 1852. II. p. 99-112; *Lamiæ*. II. p. 139-178.
12. Sur quelques curieuses habitudes d'une espèce d'*Asilus*.
1850. Proc. Amér. Assoc. Avanc. Sc. II. p. 195.
13. Synopse des espèces *Donacia* des Etats-Unis.
1852. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. v. p. 310-316. — Sépar. p. 7.
14. Notes zoologiques (sur la faune de Panama).
1852. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. v. p. 316-320.
15. Synopse des *Lampyrides* de l'Amér. boréale tempérée.
1852. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. v. p. 331-347. — Sépar. p. 17.

16. Descr. de nouv. espèces de Coléoptères de Californie.
1852. N. Y. An. Lyc. Nat. Hist. v. p. 125-216. — Sépar. 1-60.
et 185-216.
17. Synopsis des espèces de *Pterostichus* de l'Amérique
boréale tempérée.
1852. Phil. Journ. Ac. Sc. Nat. n. p. 225-256.
18. Essai d'une classification naturelle de la famille des
Histrini.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 36-41. Trad. Germ.
Stet. Zeit. 1854. xv. p. 74-81.
19. Synopsis du *Parnidæ* des Etats-Unis.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 41-45. Trad. Germ.
Stet. Zeit. 1854. xv. p. 145-148.
20. Synopsis des *Eucnemides* de l'Amérique boréale
tempérée.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 45-49. Trad. Germ. Stet.
Zeit. 1854. xv. p. 163-168.
21. Remarques sur quelques Coléoptères recueillis par
Woodhouse dans le territoire du Missouri et dans
le Nouveau-Mexique.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 65-68.
22. Synopsis des *Anthicites* des Etats-Unis.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 91-104. Trad. Germ. 1854.
Stet. Zeit. xv. p. 214-217.
23. Remarques sur la *Coccinellidæ* des Etats-Unis.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 129-145. Trad. Germ. 1854.
Stet. Zeit. xv. p. 357-361. ; p. 393-396.
24. Description d'une nouvelle espèce de *Trombidium*.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 145.
25. Synopsis des *Scydmcenidæ* des Etats-Unis.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 149-157. Trad. Germ.
1855. Stet. Zeit. xvi. p. 17-24.
26. Catalogue des *Melyrides (Malachides)* des Etats-
Unis, avec descriptions d'espèces nouvelles.
1852. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 163-171.
27. Sur la distr. géographique des animaux en Californie.
1852. Proc. Amér. Assoc. Advanc. Sc. vi. p. 248-254.
28. Description de 20 nouvelles espèces de Coléoptères
habitant les Etats-Unis.
1853. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 226-235.

29. Synopse des *Silphales* de l'Amér., au nord de Mexico.
1853. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 274-287.
30. Synopse des espèces d'Histérides du genre *Abraeus*, habitant les Etats-Unis, avec descr. de 2 nouv. genres voisins.
www.libtool.com.cn
1853. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vi. p. 287-292.
31. Catalogue des Coléoptères décrits des Etats-Unis par Melsheimer avec Haldeman.
1853. Smiths. Misc. Col. p. 16-17.
32. Synopse des *Méloïdes* des Etats-Unis.
1853. Smiths. Misc. Col. vi. p. 328-350.
33. Synopse des *Atopidæ*, *Rhipiceridæ* et *Cyphonidæ* des Etats-Unis.
1853. Smiths. Misc. Col. vi. p. 350-357.
34. Synopse des *Endomychidæ* des Etats-Unis.
1853. Smiths. Misc. Col. vi. p. 357-360.
35. Descr. de nouv. Coléopt. du Texas, recueillis principalement par la Commission des limites du Mexique.
1853. Smiths. Misc. Col. vi. p. 439-448.
36. Notes sur la classification des *Carabidæ* des Etats-Unis.
1853. Phil. Trans. Am. Philos. Soc. p. 363-403.
37. Révision des *Elateridæ* des Etats-Unis.
1853. Phil. Trans. Am. Philos. Soc. p. 405-508.
38. Descrip. de nouv. Coléoptères de l'Orégon, recueillis par D^r Cooper de l'expédition R. R. North Pacific.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 16-20.
39. Synopse des *Edemeridæ* des Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 20-22.
40. Note sur le genre *Amblychile*.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 32-34. pl. 1.
41. Synopse des espèces de *Platynus* et genres voisins, habitant les Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 35-59.
42. Synopse des *Cucujides* des Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 73-79.
43. Notice sur quelques insectes Coléoptères, des collections de la Commission des limites du Mexique.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 79-85.

44. Synopse des *Dermestidæ* des Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 106-113.
45. Synopse des *Byrrhidæ* des Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 113-117.
46. Synopse des *Erotylidæ* des Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 158-163.
47. Descriptions des espèces de *Trox* et *Omorgus* habitant les Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 211-216.
48. Quelques corrections dans la nomenclature des Coléoptères trouvés dans les Etats-Unis.
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 216-220.
49. Descriptions de nouveaux Coléoptères recueillis par Webb (1850-1854).
1854. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 220-225.
50. Synopse des *Pyrochroides* des Etats-Unis.
1855. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. vii. p. 270-277.
51. Remarques sur quelques inexactitudes contenues dans le « Catalogue des larves de Coléoptères », par Chapuis et Candèze.
1855. Phil. Proc. Ac. Sc. vii. p. 288-289.
52. Table analytique des espèces d'*Hydroporus* trouvées dans les Etats-Unis, avec descript. des espèces nouv.
1855. Phil. Proc. Ac. Sc. vii. p. 290-299.
53. Synopse des *Lathridiides* des Etats-Unis et des territoires contigus au Nord.
1855. Phil. Proc. Ac. Sc. vii. p. 299-305.
54. Notes sur les *Amaræ* des Etats-Unis.
1855. Phil. Proc. Ac. Sc. vii. p. 346-356.
55. Synopse des *Hydrophilidæ* des Etats-Unis.
1855. Phil. Proc. Ac. Sc. vii. p. 356-375.
56. Synopse des *Melolonthidæ* des Etats-Unis.
1856. Phil. Journ. Ac. Nat. Sc. 2^e sér. iii. p. 225-288.
57. Synopse des *Mycetophagides* des Etats-Unis.
1856. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. viii. p. 12-15.
58. Synopse des *Phalacridæ* des Etats-Unis.
1856. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. viii. p. 15-17.

59. Note sur le genre *Lythodius* Sch.
1856. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. VIII. p. 18-19.
60. Notice sur 3 ^{grés} de *Scarabæidæ* trouvés aux Etats-Un.
1856. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. VIII. p. 19-25.
61. Table analytique des espèces de *Chlænius*, trouvées aux Etats-Unis.
1856. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. VIII. p. 25-29.
62. Catalogue des espèces de *Bembidium* trouvés aux Etats-Unis et dans les régions contiguës du Nord.
1857. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. IX. p. 2-6.
63. Index des *Buprestidæ* des Etats-Unis, décrits par Laporte et Gory, avec notes.
1857. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. IX. p. 6-10.
64. Synopsis des espèces de *Clivina* et genres alliés habitant les Etats-Unis.
1857. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. IX. p. 75-83.
65. Révision des *Cicindelæ* des Etats-Unis.
1857. Phil. Trans. Amér. Philos. Soc. XI. p. 27-63. pl. 1.
66. Catalogue des Coléoptères des régions adjacentes à la ligne frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.
1858. Phil. Journ. Ac. Nat. Sc. 2^e sér. IV. p. 9-42. pl. 4.
67. Descript. de nouv. espèces de Coléoptères, recueillis principalement par la Commission de délimitation des frontières entre les Etats-Unis et le Mexique.
1858. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. X. p. 59-89.
68. Notes sur les espèces d'*Eleodes* trouvées dans les Etats-Unis.
1858. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. X. p. 180-188.
69. Instruction pour collectionner les Coléoptères.
1859. Smiths. Misc. Collect. Rapp. annuel. Cons. Regents. p. 160-164.
70. Catalogue des Coléoptères de Fort-Tejon, Californie.
1859. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. XI. p. 69-90.
71. Addition de la faune des Coléoptères du Nord de la Californie et de l'Orégon.
1859. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. XI. p. 281-292.
72. Descr. de nouv. espèces de la famille des *Histeridæ*.
1859. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. XI. p. 310-317.
73. Revision des *Buprestidæ* des Etats-Unis.
1859. Phil. Trans. Am. Philos. Soc. XI. p. 187-253. pl. 11.

74. Coléoptères du Kansas et de l'est du Nouv.-Mexique.
1859. Smiths. Misc. Collec. (Contrib. Knowl). xi. p. 6 et 1-58.
pl. 1-2. Carte. — Sépar. 1860. p. 6 et 1-58. pl. 2. Carte 1.
75. Descrip. sur quelques genres et espèces de Coléoptères
du voisinage des frontières sud des Etats-Unis d'Am.
1859. Thoms. Arcan. Nat. iii. p. 121-128. pl. 12-13.
76. Rapport sur les insectes recueillis par la Commission
d'études et d'explorat. du Mississipi à l'Oc. Pacifique.
1860. Washington. Proc. Ac. Nat. Sc. xii. 3^e part. p. 1-72. pl. 1-2.
77. Notes sur les Coléoptères trouvés à Fort-Simpson, sur
la rivière Mackenzie, avec remarques sur les espèces
du Nord.
1860. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xii. p. 315-324.
78. Synopse du *Scaphidiidæ* des Etats-Unis.
1860. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xii. p. 321-324.
79. Notes sur la faune des Coléopt. de la Basse-Californie.
1861. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xiii. p. 335-338.
80. Nouvelles espèces de Coléoptères habitant le district
du Pacifique des Etats-Unis.
1861. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xiii. p. 338-359.
81. Classification des Coléoptères de l'Amérique du Nord
pour l'Institution Smithsonian.
1862. Smiths. Misc. Col. 1^{re} part. iii. p. 25 et 1-283. — 2^e part.
1873. xi. p. 279-348.
82. Note sur la classification des *Cerambycidæ*, avec
descriptions des nouvelles espèces.
1862. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xiv. p. 38-43.
83. Synopse des *Mordellidæ* des Etats-Unis.
1862. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xiv. p. 43-51.
84. Notes sur les esp. de *Calosoma* habitant les Etats-Un.
1862. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xiv. p. 52-53.
85. Synopse des espèces de *Colymbetes* habitant l'Amé-
rique, au nord de Mexico.
1862. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xiv. p. 521-523.
86. Notes sur les espèces de *Brachynus* habitant les
Etats-Unis.
1862. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xiv. p. 523-525.
87. Note sur les *Strepsiptera*.
1864. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xvi. p. 49-50.

88. Notes sur les esp. de *Myodites* habitant les Etats-Un.
1865. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xvii. p. 96-98.
89. Notes sur les espèces de *Harpalus*, habitant l'Amérique au nord de Mexico.
1865. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xvii. p. 98-104.
90. Sur les espèces de *Galeruca* et genres voisins, habitant l'Amérique du Nord.
1865. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xvii. p. 204-222.
91. Prodrôme d'une monographie des espèces de la tribu des *Anobiini*, famille des *Ptinidæ*, habitant le nord de l'Amérique.
1865. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xvii. p. 222-244.
92. Remarques sur la sous-famille des *Clavigeridæ*.
1866. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xviii. p. 108-109.
93. Liste des Coléoptères recueillis dans les montagnes du comté de Lycoming (Pennsylvania).
1866. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xviii. p. 346-348.
94. Liste des Coléoptères recueillis par Elliott Coues, près de Fort-Whipple, Arizona, en 1864-1865.
1866. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xviii. p. 348-349.
95. Révision des *Dasytini* des Etats-Unis.
1866. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xviii. p. 349-361.
96. Additions à la faune des Coléop. des Etats-Unis, n° 1
1866. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xviii. p. 361-394.
97. Sur la valeur systématique des Coléoptères Rhynchophores : extrait d'un mémoire lu devant l'Académie nationale des Sciences à Washington.
1867. Amér. Journ. Sc. et Art. 2^e sér. XLIV. p. 41-43.
98. Liste des Coléoptères de l'Amér. du Nord : 1^{re} part.
1867. Smiths. Misc. Col. vi. p. 1-78.
99. Nouvelles espèces de Coléoptères de l'Amérique du Nord, pour Smiths. Inst.
1867. Smiths. Misc. Col. vi. part. 1. p. 1-177. — 1874. part. 2. xi. p. 169-240.
100. Table analytique des espèces de *Baridius* habitant les Etats-Unis.
1868. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xx. p. 361-365.
101. *Gyrinidæ* de l'Amérique, au nord de Mexico.
1868. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xx. p. 365-373.

102. Notes sur les esp. de *Agonoderus*, *Bradycellus* et *Stenelophus*, habitant l'Amérique, au nord de Mexico.
1868. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xx. p. 373-382.
103. Nouveaux Coléoptères recueillis dans les études entreprises pour le prolongement du *Union Pacific Railway*, du Kansas à Fort-Craig, New-Mexique.
1868. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. II. p. 49-59.
104. Coléoptères de l'expédition de surveillance des côtes des Etats-Unis, à Alaska, sous les ordres de Georges Davidson.
1868. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. II. 59-64.
105. Synopse des *Scolytidæ* de l'Amérique, au Nord de Mexico, par Zimmermann : Notes et appendice.
1868. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. II. p. 141-176.
106. Insectes d'eau salée.
1868. Amér. Naturalist. II. p. 329-330.
107. Monographie des *Trichopterygidæ* de Matthews.
1868. Amér. Natural. III. p. 213-214.
108. Sur la conservation des collections entomologiques.
1869. Amér. Nat. II. p. 9; III. p. 307-309.
109. Entomologie Américaine, par Thomas Say. pl. col. avec notes sur les Coléoptères, par G. Ord.
1869. N. Y. II. tom. 24 + 412 et 5 + 814. pl. 54.
110. Notes synonymiques sur les Coléoptères des Etats-Unis, avec description des nouvelles espèces tirées du manuscrit de C. Zimmermann.
1869. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. II. p. 343-359.
111. Liste des Coléoptères recueillis dans l'île de Vancouver par H. et J. Matthews, avec descriptions d'espèces nouvelles.
1869. Lond. An.-Mag. Nat. Hist. 4^e sér. IV. p. 269-285. — Sépar. p. 17.
112. Coléoptères.
1869. Rec. Amér. Ent. p. 25-32.
113. Notes synonym. sur les Coléopt. de l'Am. du Nord.
1880. Lond. An. Mag. Nat. Hist. 4^e sér. VI. p. 374-404. — Sépar. p. 10.
114. Description d'une nouvelle espèce d'*Aphodius*.
1872. Harold. Coléopt. Heft. x. p. 193.

115. Parasite du castor (*Platypsylla*).
1872. Nature. vi. p. 162.
116. Sur les *Platypsyllidæ*, nouv. famille de Coléoptères.
1872. Lond. Proc. Zool. Soc. p. 799-804. pl. 1. — Sépar. p. 6.
117. Notice nécrologique sur Ernest Melsheimer.
1873. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. xxv. p. 257-258.
118. *Lathridius* trouvés dans une maladie fongueuse d'une souris.
1873. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. xxv. p. 261.
119. *Pterostichi* des Etats-Unis.
1873. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. xxv. p. 302-320.
120. Remarques synonymiques sur les Coléoptères de l'Amérique du Nord.
1873. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. xxv. p. 321-336.
121. Appel en faveur de l'avancement de l'entomologie économique dans les Etats-Unis.
1873. Amér. Natur. vii. p. 710-722.
122. Catalogue des Coléoptères du mont Washington, par Austin, avec descriptions de nouvelles espèces.
1874. Bost. Proc. Soc. Nat. Hist. xvi. p. 265-266.
123. Note sur les espèces de *Pasimachus*.
1874. Buffalo. Soc. Nat. Sc. i. p. 266-273.
124. Descriptions de nouveaux Coléoptères, principalement du littoral du Pacifique de l'Amérique du Nord.
1874. Phil. Trans. Amér. Entom. Soc. v. p. 43-72.
125. Note sur le genre *Pleocoma*.
1874. Phil. Trans. Amér. Entom. Soc. v. p. 81-84.
126. Sur les *Cupesidæ* de l'Amérique du Nord.
1874. Phil. Trans. Amér. Entom. Soc. v. p. 87-88.
127. Sur quelques changements dans la nomenclature des Coléoptères de l'Amér. du Nord, récemment proposés.
1874. Canad. Entom. vi. p. 185-197.
128. Sur la nomenclature entomologique. I. Loi de priorité; II. Types génériques.
1874. Canad. Entom. vi. p. 201-206; p. 207-210.
129. Classification des Coléoptères *Rhynchophores*.
1874. Amér. Natural. viii. p. 385-396; p. 452-470.
- Les Entom. et leurs Écrits.* — 1884.

130. Exemple de remplacement des insectes nuisibles par l'agence de l'homme.
1875. Proc. Amér. Assoc. Advanc. Sc. xxiii. p. 44.
131. Notes sur les *Cicindelidæ* des Etats-Unis.
1875. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. v. p. 157-162.
132. Sur les *Rhysodidæ* des Etats-Unis.
1875. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. v. p. 162-168.
133. Descriptions de nouveaux Coléoptères des Etats-Unis, avec notes sur leur distribution géographique.
1875. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. v. p. 169-176.
134. Caractère additionnel pour la définition des Coléoptères *Rhynchophores*.
1875. Amér. Natural. ix. p. 112-113.
135. Adresse du Président sortant de l'Association américaine pour l'avancement de la science.
1875. Amér. Natural. ix. p. 481-496. — Sépar. p. 18.
136. Méthode pour vaincre les insectes nuisibles à l'agriculture.
1875. Canad. Entomol. vii. p. 167-172.
137. Adresse du Président du Club entomologique de l'Associat. Améric. pour l'avancement de la science.
1876. Canad. Entomol. viii. p. 176-178.
138. Sur les affinités de l'*Hypocephalus*.
1876. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. v. p. 209-218.
139. Coléoptères nuisibles (*Anthrenus scrophulariæ*).
1876. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. xxviii. p. 195.
140. Rapport sur les insectes importés par l'exposition internationale. (Avec Horn et Leidy).
1876. Phil. Proc. Ac. Sc. Nat. xxviii. p. 267-271. — Sépar. p. 6.
141. Nouv. espèces de Coléoptères recueillis par les expéditions pour les études géographiques à l'ouest du 100^e mér., sous la conduite du lieutenant G. Wheeler.
1876. An. rap. du chef des Ingén. au Ministre Secrét. de la Guerre. 3^e part. p. 516-520.
142. Les *Rhynchophores* de l'Amérique, au Nord de Mexico. (Avec D^r Horn).
1876. Phil. Proc. Amér. Philos. Soc. xv. p. 16 et 1-455.
143. Sur les *Locustiens* des Montagnes-Rocheuses.
1877. Phil. Proc. Ac. Nat. Sc. xxviii. p. 129-131.

144. Sur certains genres de *Staphylinidæ*, *Oxytelini*, *Piestidæ* et *Micropeplidæ*, appartenant à la faune des Etats-Unis.
1877. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. vi. p. 212-252.
145. Tableau synopt. des *Rhyncophores* de l'Amérique.
1879. Phil. Proc. Amér. Philos. Soc. xvi. p. 417-424. Sépar. p. 1-8.
146. Coléoptères des régions alpines des Montagnes-Roch.
1878. Bul. Géol. Géog. surv. territor. 1^{re} part. iv. p. 447-480; — 2^e part. 1879. v. p. 499-520.
147. Coléoptères de la Floride, par Schwartz; descriptions additionnelles de nouvelles espèces; remarques sur leur distribution géographique.
1878. Phil. Proc. Amér. Philos. Soc. xvii. p. 353-472. Sépar. p. 373-434.
148. Coléoptères du Michigan, par Hubbard et Schwartz; descriptions de nouvelles espèces.
1878. Phil. Proc. Amér. Philos. Soc. xvii. Sépar. p. 593-669. p. 5-93-623.
149. Stridulation des Coléoptères.
1878. Psyche ii. p. 126.
150. Un excellent piège pour attraper les petits Silphides, etc.
1878. Brookl. Bul. Ent. Soc. i. p. 11.
151. Chasse aux sources Capron. W. Va.
1878. Brookl. Bul. Ent. Soc. i. p. 39.
152. Description d'un nouveau *Calosoma* et tableau synoptique des espèces du genre.
1878. Brookl. Bul. Ent. Soc. i. p. 61; p. 64-66.
153. Synopse des espèces de *Platynus* de l'Amérique du Nord, avec descriptions de nouvelles espèces.
1879. Brookl. Bul. Ent. Soc. ii. p. 43-58.
154. Courtes études sur les Coléopt. de l'Amér. du Nord.
1880. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. viii. p. 163-218.
155. Tableaux synoptiques des *Panagæus*, *Helluomorpha*, *Galerita*, *Zuphium* (1 nouv. esp.) et *Diaphorus*.
1879. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. ii. p. 59-62.
156. Nouveaux Coléoptères.
1879. North Amér. Nat. i. p. 4-5. pl. 1.
157. Tableaux synoptiques des *Casnonia*, *Ega*, *Lachnophorus*, *Plochionus*.
1880. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. ii. p. 85-86.

158. Synopse des *Lampyridæ* des Etats-Unis.
1881. Phil. Trans. Amér. Ent. Soc. ix. p. 15-72.
159. Nouveaux Coléoptères.
1881. Buffalo Soc. Nat. Sc. iv. p. 27-28. pl. 1.
160. Tableau synoptique des *Myas*.
1882. Buffalo Soc. Nat. Sc. v. p. 63.
161. Classification des Coléoptères de l'Amérique du Nord.
(Avec D^r Horn.)
1883. Smiths. Misc. Coll. p. 1-28; p. 1-567.
162. Les ouvrages entomologiques de John L. Le Conte, par Samuel Henshaw.
1878. Psyche advertis p. 9.
163. Articles nécrologiques par divers entomologistes.
1883. F.-G. Schaup. Brookl. Ent. Soc. Bul. v. p. 1-9. port.
(Dunning, président de la Société entomologique de Londres.) Lond. Ent. Soc. Proceed. p. 13.
(Sallé Auguste.) Fr. Ent. Soc. p. 571-576.
(Pr. de Borre.) Belg. Soc. ent. Bul.
(Fauvel.) Soc. Ent. Française.
(D^r D. Sharp.) Ent. Monthl. Mag. p. 192.
(L'ABEILLE.) Nouv. et Faits divers, 2^e série, n^o 47. (Kraatz) : Deuts. Ent. Zeits. p. 240.

La collection de coléoptères de l'Amérique du Nord du D^r Le Conte, si précieuse par les types qu'elle renferme, a été léguée au Musée de Cambridge (Mass.), et sa bibliothèque a été vendue publiquement à Philadelphie, en mai 1884.

SCHENKERE (Charles-Jean), ✕, né à Stockholm le 10 juin 1772, conseiller du commerce, chevalier de l'ordre de l'Etoile-Polaire, et commandeur de l'ordre de Wasa, membre de plus de vingt Sociétés savantes dans toutes les parties du monde, décédé le 28 mars 1848, à Sparresæter (Suède).

1. *Synonymia insectorum* ou Essai d'une synonymie des insectes d'après le *Systema eleutherat.* de Fabricius.
1806. I. (Coléoptères) p. 1. (*Lethrus-Scolytes*) p. 22 et 289. pl. 1-3.
+ 1808. p. II. (*Spercheus-Cryptocephalus*) p. 9 et 424. pl. 4.; p. III. (*Hispa-Molorchus*) p. 11 et 506. + 1817. Appendix : Descriptions d'espèces nouvelles p. 1-266 et pl. 5-6.
2. Observations entomologiques et descriptions de quelques insectes nouveaux pour la faune de Suède.
1809. Svehsk. Vetensk. Acad. Handl. xxx. p. 48-58.

3. *Pulex segnis*, nouvelle espèce de Suède.
1811. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. xxxii. p. 98-102. fig.
4. Tableau synoptique de la famille des Curculionides :
avant-propos sur leur monographie.
1823. Isis p. 1132-1146. + 1825. p. 581-596. + 1836. p. 292.
5. Curculionidum dispositio methodica ou Prodrome à
la 4^e partie de la Synonymie des insectes.
1826. Leipzig p. 10 et 338.
6. Synonymia insectorum ou Essai d'une synonymie des
insectes connus : I. Coléoptères ; p. iv. Curculionides.
1833. Paris. I. p. 15 et 681. + 1834. II. p. 669. + 1836. III. p.
858. + 1837. IV. p. 1121. + Supplément. 1389. V. p. 970. + 1880.
VI. 1^o p. 474. + 1842. 2^o p. 495. + 1843. VII. 1^o p. 479 ; 2^o p.
461. + 1844. VIII. 1^o p. 442 ; 2^o p. 504 (Avec Mantissa 1^o et tabl.).
7. Mantissa 2^a familiæ Curculionidum, ou Descriptions
de nouveaux genres de Curculionides.
1846. Svensk. Vetensk. Ac. Handl. p. 51-136.
8. Notice nécrologique par Carlson.
1847. Lond. Ent. Soc. Proceed. v. p. 53-55.
9. Notice nécrologique.
1848. Upsal p. 31. + 1849. Stet. Zeit. p. 193-199.

La collection de Schönherr est conservée au Musée de
la Société royale de Stockholm.

MÉNÉTRIÉS (Edouard), directeur du Musée zoologique de
l'Académie des Sciences de St-Petersbourg, membre de la Société des
Naturalistes de Moscou, membre fondateur de la Société entomolo-
gique de Russie, décédé à St-Petersbourg le 10 avril 1861.

1. Observations sur quelques Lépidoptères du Brésil.
1829. Mosc. Mém. vii. (Nouv. Mém. 1) p. 181-196. pl. 3.
2. Catalogue de quelques Lépidoptères des Antilles, avec
la description de plusieurs espèces nouvelles (50 esp.)
1832. Mosc. Bul. v. p. 291-316. Leq. p. 193-211.
3. Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis
dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières
de la Perse.
1832. Pétersb. 4^o p. 271 (Coléopt. Lépidopt. p. 90-268).

4. Notice sur quelques Lépidoptères des Antilles, avec la description de plusieurs espèces nouvelles.
1834. Mosc. Mém. ix. (Nouv. Mém. III) p. 113-114. pl. 2.
5. Insectes nouveaux de la Turquie (3 *Carabus*, 2 *Zabrus*, 1 *Abax*, 1 *Colophotia*, 1 *Cantharis*, 1 *Rhizotrogus*, 1 *Amphicoma*, 3 *Glaphyrus*, 2 *Cetonia*, 2 *Pimelia*, 2 *Blaps*, 1 *Cephalostenus*, 1 *Dorcadion*, 2 *Clytra*, 1 *Cryptocephalus*, 1 *Cassida*, 1 *Zygæna*).
1836. Pétersb. Acad. Bul. 1. p. 149-151.
6. Sur quelques insectes de la Russie (1 *Chlœnius*, 1 *Sphodrus*, 1 *Anomala*, 2 *Anatolica*, 1 *Melanesthes*, 1 *Chrysomela*, 3 *Cryptocephalus*).
1836. Pétersb. Acad. Bul. 1. p. 180-181.
7. Catalogue d'insectes recueillis entre Constantinople et les Balkans. (235 Coléoptères, 2 Lépidoptères.)
1838. Pétersb. Acad. Mém. 6^e sér. v. p. 1-52. pl. col. 2.
8. Essai d'une Monographie du genre *Anacolus*, de la famille des Capricornes.
1838. Pétersb. Acad. Mém. 3^e sér. v. p. 277-296. pl. col. 1. Sépar. p. 19.
9. Sur un nouveau genre de Lépidoptères nocturnes de la Russie (*Axiopœna maura*).
1842. Pétersb. Acad. Bul. ix. p. 40-43.
10. Monographie du genre *Calisthenes*.
1844. Pétersb. Acad. Bul. 1. p. 341-350.
11. Sur un envoi d'insectes de la côte N-O d'Amérique.
1844. Pétersb. Acad. Bul. II. p. 49-64.
12. Sur quelques Papillons de Sibérie, recueillis par Stubbendorff.
1847. Pétersb. Acad. Bul. v. p. 262-265.
13. Descriptions des insectes recueillis par Lehman.
1848. Pétersb. Acad. Mém. vi. p. 112. pl. col. 6. Sépar. p. 112.
+ 1849. Bul. VII. p. 114.
14. Catalogue des insectes recueillis par Lehman (Coléoptères pentamères, pl. 2).
1849. Pétersb. Acad. Mém. 6^e sér. VIII. p. 17-66 (Coléopt. hétér.) pl. 4. p. 219-329.
15. Rapport sur l'état actuel du Musée entomologique de l'Académie des sciences.
1849. Pétersb. Acad. Bul. VII. p. 298-304.
16. Lettre au D^r Renard sur le genre *Harpactus*.
1851. Mosc. Bul. XXIV. 1. p. 366-368.

17. Insectes du voyage de Middendorf en Sibérie (Coléoptères, Orthoptères, Lépidoptères).
1851. Zool. II. 1.
18. Coléoptères recueillis dans la Mongolie chinoise et aux environs de Pékin.
1854. Motsch. Et. III. p. 26-41.
19. Enumération des animaux du Musée de l'Académie des sciences de St-Petersbourg (Lépidoptères).
1855. I. p. 16 et 101. pl. col. 6. + 1857. II. p. 96. pl. 8.
20. Descriptions de 2 nouvelles espèces de Lépidoptères des environs de St-Petersbourg.
1856. Mots. Et. V. p. 42-50.
21. Quelques mots sur le croisement des espèces chez les insectes.
1858. Vien. Ent. Monats. II. p. 193-200.
22. Réponse aux critiques du Dr Gerstæker sur l' « Énumération des animaux, etc. »
1858. Stet. Ent. Zeit. XIX. p. 137-148; p. 444.
23. Sur la manière consciencieuse de critique des ouvrages entomologiques.
1859. Vien. Ent. Monats. III. p. 1-8.
24. Lépidoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amur.
1859. Pétersb. Acad. Mém. biolog. I. p. 90-113.
25. Sur les Lépidoptères de Lenkoran et de Talyche.
1859. Pétersb. Acad. Mém. biolog. III. 1. p. 131-136. Bul. Phys. XVII. 313-316.
26. Sur quelques Lépidoptères du Gouvern. de Jakoutsk.
1859. Pétersb. Acad. Mém. biolog. III. p. 213-220. + Phys. Bul. XVII. p. 494-500.
27. Lépidoptères : 1 livr., 212 esp. Voyage et recherches de Schrenk dans le territoire de l'Amur.
1859. Pétersb. pl. col. 5.
28. Catalogue des insectes des environs de Nachitschevan et du Nord de la Perse.
1859. Mosc. Nouv. Mém. XII. p. 247.
29. Notice nécrologique avec portrait.
1863. Rossic. Ent. Hor. II. p. 1-7.

FALDERMANN (François), né le 28 février 1799, à Heidelberg, docteur en philosophie, directeur du Jardin botanique de St-Petersbourg, membre des Sociétés entomologiques de France et de Londres, etc., décédé à Saint-Petersbourg le 30 novembre 1838.

www.libtool.com.cn

1. Lettre sur la faune des insectes de Perse.
1832. Mosc. Bul. iv. p. 201-207. Leq. p. 104.
2. Espèces nouv. de coléoptères de Mongolie et de Sibérie.
1833. Mosc. Bul. vi. p. 47-72; Leq. p. 212. fig.
3. Lettre sur 2 nouveaux Mélasomes (*Melanesthes*).
1835. Mosc. Bul. viii. p. 165-170.
4. Additions à la faune entomologique de Russie; insectes recueillis dans ses voyages 1827-1831.
1835. Mosc. Nouv. Mém. iv. p. 1-310. pl. 10.
5. Coléoptères recueillis par Bunge dans le nord de la Chine, la Mongolie et les monts Altaï, et communiqués par Turczaninoff et Stschukin de la province de Irkutzk, décrits et figurés.
1835. Pétersb. Acad. Mém. ii. p. 337-464. pl. col. 5.
6. Faune entomologique transcaucasienne ou additions entomologiques à la faune de Russie, et Coléoptères de Perse et d'Arménie.
1835. I. Mosc. Nouv. Mém. iv. p. 1-310. pl. col. 10. + II. 1837. v p. 433. pl. col. 15. + III. 1838. vi. p. 338.
7. Additions à la faune des coléoptères de l'empire russe.
1836. Mosc. Bul. ix. p. 351-398. pl. col. 3.
8. Note sur un insecte nouveau et nuisible de la famille des Curculionides.
1837. Pétersb. Acad. Bul. i. p. 179-183.
9. Notice nécrologique.
1839. Mosc. Bul. xii. p. 34.
10. Notice par le comte Mannerheim.
1840.

Les types de la collection de Faldermann faisaient partie de la collection du comte Mniszech, dispersée depuis.

BOHEMAN (Charles-Henri), ✠, né à Jönköping (Småland, Suède), le 10 juillet 1796, chevalier de l'ordre de l'Etoile-Polaire, professeur à l'Académie des sciences et intendant de la partie entomologique du Museum de Stockholm, membre honoraire des Sociétés entomologiques de France, de Londres, de Stettin et autres Académies, décédé à Stockholm le 2 novembre 1868.

1. Une nouvelle espèce du genre *Pimpla (ovivora)*.
1821. Svensk. Vetensk. Acad. Handlingar (Académie des sciences de Suède; Mémoires) p. 335-337. fig.
2. Observ. sur les métamorphoses de quelques insectes.
1828. Svensk. Vetensk. Acad. Handlingar p. 164-166.
3. Nouvelles espèces de Coléoptères.
1829. Mosc. Natur. Mém. VII. (1) p. 104-133.
4. Essai descriptif des insectes de la faune de Suède du genre *Ceraphron*.
1831. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. p. 322-339.
5. Pteromaliens de Scandinavie.
1833. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. p. 329-380. + 1836. p. 222-259.
6. *Calodromus*, genre de Curculionides, décrit et figuré.
1837. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. p. 218-232. pl. 1. Sépar. p. 14. + Rev. zool. 1840. p. 311.
7. Observations sur le genre *Derbe* avec description de 5 nouvelles espèces.
1837. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. LVIII. p. 223-230 pl. 1. Sépar. p. 8. + 1840. Rev. Zool. p. 311.
8. De la *Tinea lineella*.
1837. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. LVIII. p. 231-234. fig.
9. Rapport annuel sur les progrès de l'histoire naturelle des insectes, Myriapodes et Arachnides pendant les années 1843-1844.
1843. Stockholm, p. 150 (pour 1844-1845). + 1845. p. 224.
10. Voyage entomologique en Laponie.
1844. Svensk. Vetensk. Acad. Öfvers. Föerhdl. (Bulletin) p. 95-106.
11. Sur les sauterelles dans l'Ostrogothie.
1844. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 105-106.
12. Deux genres et espèces de *Staphylius* nouveaux pour la faune de Suède.
1844. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. I. p. 155.

13. Sur les insectes qui vivent quelquefois avec les fourmis.
1844. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 155-159.
14. Nouveaux Homoptères de Suède.
1845. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 154-164. + 1847.
p. 260-268. + 1848. Isis IV. p. 310.
15. Sur *Phygmæna fuscaria*.
1846. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 177-178.
16. Deux nouveaux *Gryllus* de Suède, avec quelques remarques sur les Orthoptères.
1846. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 80-83.
17. Nouvelle espèce du genre *Chionea (crassipes)*.
1846. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 178-179.
18. Sur *Phryganea phalenoïdes* et *pantherina*.
(Avec Læwenjhelm.)
1846. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 215-218.
19. Sur les sauterelles.
1847. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 250-252.
20. Nouvelles espèces de papillons de Suède.
1847. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 299-300.
21. Rapport annuel sur les progrès de l'histoire natur. des Insectes, Myriapodes et Arachnides pour 1845-1846.
1847. Stockholm, p. 9 et 276. + Pour 1847 et 1848 Svensk. Vet. Acad. + 1851, p. 10 et 333. + Pour 1849 et 1850-1852, p. 8 et 239. + Pour 1851 et 1852-1854, p. 10 et 342 + Pour 1853 et 1854-1857, p. 8 et 295. + Pour 1855-1856-1859. p. 8 et 362.
22. Nouveaux Homoptères de Suède.
1848. Svensk. Vet. Ac. Föerhandl. p. 23-67. Sépar. p. 67.
23. Abeille qui subit ses métamorphoses dans les Hélices (*Osmia*).
1848. Svensk. Vet. Ac. Föerhandl. p. 118-20.
24. Collection d'insectes de Dalecarlie.
1848. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 120-121.
25. Papillons diurnes de Dalecarlie.
1848. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 197-198.
26. Essai sur un arrangement systématique des papillons diurnes de Suède proposé.
1848. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. p. 95-194.
27. Développement d'un *Leucopis* (Diptère).
1848. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 193-197.

28. Insectes de Caffrerie recueillis par Wahlberg (1838-1845) : Coléoptères.
1848. Stockholm I. 1^o p. 8-207 et 1851. 2^o p. 298-626. pl. 2. + 1857. II. p. 4 et 395. pl. 1.
29. Eclaircissement sur la synonymie de deux espèces d'Hémiptères.
1848. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 45-46.
30. Contribution à la faune des insectes de Gothie (Coléoptères, Orthoptères, Hémiptères).
1849. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. LXX. p. 195-267.
31. Sur *Bembex rostrata* et *Epitheca bimaculata*.
1849. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 179-181.
32. Sur une espèce de mouche (*Trichocera*).
1848. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 155-156.
33. Faune entomologique de Gothie.
1850. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 70-76.
34. Monographie des Cassidides.
1850. I. p. 452. pl. 4. + 1854. II. p. 536. pl. 2. + 1855. III. p. 543. pl. 1. + 1862. IV. (Supplément) p. 504.
35. Observations concernant les métamorphoses de nouvelles espèces d'insectes (Hémiptères, Orthoptères, Coléoptères).
1850. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. VII. p. 211-215.
36. *Scydmaenii*, *Pselaphii* et *Clavigeri* trouvés en Suède.
1850. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 265-279.
37. Sur le développement de *Tachina setipennis*.
1852. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. VIII. p. 154-155.
38. Nouveaux Hémiptères de Suède.
1852. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 49-60; p. 65-80.
39. Remarques entomologiques pendant un voyage dans la Suède méridionale, 1851.
1852. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. p. 53-210.
40. Dévelop. d'une espèce d'abeille (*Trachusa serratulæ*).
1852. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. p. 187-188.
41. Sur le genre de vie et le développement de l'*Adimonia fontinalis*.
1852. Svensk. Vetensk. Acad. Öfv. Föerhandl. nos 9 et 10. p. 8.
42. Développement du *Pipunculus fuscipes*.
1854. Svensk. Vetensk. An. 11. p. 302-305. pl. 1.

43. Retard des insectes pendant l'épidémie du choléra.
(Avec Wahlberg).
1854. Svensk. Vetensk. An. 11. p. 12-13.
44. Sur l'accouplement de différentes espèces d'insectes
entre eux (Coléoptères).
1856. Svensk. Vetensk. An. 13. p. 229.
45. Catalogue des insectes Coléoptères de la collection du
British Museum : p. 9^e *Cassididæ*.
1856. Lond. p. 225.
46. Remarques entomolog. sur un voyage dans la Laponie.
1857. Svensk. Vet. Acad. Öfv. Förhandl. xiv. p. 15-24.
47. Voyage autour du monde de la frégate royale de
Suède « Eugénie », sous le commandement de C. A.
Virgin, 1851-1853. Observ. scientifiques, etc. (Insectes.)
1858. Stockholm, 4^e I. p. 112. pl. 1. — II. p. 113-217. pl. 1.
— III. p. 219-298. pl. 2. — Compte-rendu par Kraatz. Berl. Ent.
Zeits. III. p. 57'.
48. Différences sexuelles chez les Pteromaliers.
1858. Svensk. Vet. Acad. Öfv. Förhandl. An. 15. p. 58-59. pl. 1.
49. Contribution à la faune des Diptères de Laponie.
1858. Svensk. Vet. Ac. Öfv. Förhandl. An. 15. p. 55-57. pl. 1.
50. Coléoptères recueillis par Wahlberg dans le sud-
ouest de l'Afrique (198 espèces).
1860. Svensk. Vet. Ac. Öfv. Förhandl. xvii. p. 3-22; p. 107-120.
51. Observations entomologiques pendant un voyage dans
le nord de la Scanie et le sud de Hallande (1862).
1863. Svensk. Vet. Ac. Öfv. Förhandl. p. 57-85.
52. Faune entomologique du Spitzberg.
1865. Svensk. Vet. Ac. Öfv. Förhandl. p. 563-578. pl. 1.
53. Contribution à la faune entomologique de Gothie.
1867. Svensk. Vet. Ac. Öfv. Förhandl. p. 611-636.
54. Notice nécrologique par C. Stål.
1868. Stet. Ent. Zeit. xxx. p. 35-36.
1869. Fr. Soc. ent. 4^e sér. ix. p. 185-106.
55. Descriptions de genres et d'espèces de Curculionites
(3,000 environ) dans le *Genera et species curcu-
lionidum* de Schœnherr.
1833 — 1845.

La collection fort riche de Boheman appartient au
Museum d'Histoire naturelle de Stockholm.

ESSAI D'UNE RÉVISION
DES ESPÈCES EUROPÉENNES & CIRCAMÉDITERRANÉENNES
DE LA
FAMILLE DES LAMPYRIDES

Par ERNEST OLIVIER

Membre des Sociétés entomologiques de France, de Belgique, de Londres, etc.,
Correspondant de l'Académie d'Hippone, etc.

AVANT - PROPOS

Les Malacodermes sont un des groupes de Coléoptères généralement peu recherchés des collectionneurs et dont l'étude difficile a été bien négligée jusqu'à présent. Nous possédons, il est vrai, les savantes Monographies de Mulsant, mais elles ne comprennent que les espèces françaises, relativement peu nombreuses, et l'entomologiste qui veut classer ses insectes européens est obligé de rechercher des descriptions éparses dans une foule de recueils qu'il est souvent difficile de se procurer; descriptions, la plupart du temps insuffisantes, parce qu'elles ont été faites isolément, sans une étude comparative préalable des espèces voisines permettant d'en faire ressortir nettement les caractères distinctifs.

Mon collègue et ami, M. Bourgeois, vient de combler magistralement cette lacune en ce qui concerne la famille des Lycides. Agissant dans une sphère plus modeste, je termine aujourd'hui, non pas une Monographie des Lampyrides, mais une simple révision des espèces que je possède ou dont je dois la connaissance à l'obligeance de mes collègues. Ma collection nombreuse comprend presque tous les types d'Olivier, de Castelnau et de Jac-

quelin du Val, et j'y ai puisé des matériaux importants, considérablement accrus par les communications qui m'ont été faites. Mais la dissemblance des sexes, dans le genre Lampyre, est une des plus grandes difficultés de l'étude de cette famille; sauf pour les espèces françaises, connues depuis longtemps, il est souvent très scabreux de rapporter une femelle à un mâle si on n'a pas eu la chance de les capturer accouplés. Leur présence simultanée dans des localités rapprochées ou même auprès l'un de l'autre n'est pas une preuve suffisante de leur identité. Ne voyons-nous pas les Lampyres mâles être attirés par la clarté d'une allumette, d'une lumière quelconque? Ils doivent également accourir à la lueur émise par une femelle, quelque soit l'état civil de cette dernière. Il est cependant vraisemblable que, quand plusieurs espèces vivent dans une même localité, elles n'apparaissent pas simultanément. C'est ainsi qu'en France, aux environs de Moulins, le *Lamprorhiza Mulsanti* éclôt au printemps, alors qu'il n'existe encore aucun *Lampyrus noctiluca*, et ce dernier ne se montre qu'à partir du mois de juillet, quand les premiers ont complètement disparu. Mais des observations analogues, en assez grand nombre et suffisamment précises, nous font complètement défaut pour la plupart des espèces; aussi, dans l'état actuel de nos connaissances, une véritable Monographie de ce genre est-elle une œuvre impossible?

Chez les Malacodermes, les Lampyrides surtout, la grande disproportion qui existe entre le nombre des mâles et celui des femelles, jointe à la ressemblance des différents types et au peu de fixité des caractères spécifiques, laisserait presque entrevoir l'existence d'hybrides; mais c'est là une question capitale sur laquelle je ne fais qu'appeler l'attention sans être le moins du monde en état de la résoudre pour le moment. Je me contenterai d'ajouter que M. Peragallo nous a déjà montré des *Rhagonycha* accouplés avec des Lucioles et que l'on peut

voir dans l'ancienne collection Reiche, appartenant actuellement à M. Bourgeois, plusieurs exemples de ce monstrueux rapprochement.

Je n'ai donc pas fait de tableaux dichotomiques pour les femelles, ne les connaissant pas toutes suffisamment, et ne me suis occupé que des caractères fournis par les mâles. J'ai dû cependant décrire quelques femelles de l'identité desquelles j'ai tout lieu d'être certain.

J'ai laissé de côté et inscrit sous la rubrique *Species invisæ*, un certain nombre d'espèces, presque toutes celles créées par Motschulsky entr'autres, soit que je n'aie pu m'en procurer des types authentiques, soit que l'examen d'un trop petit nombre d'individus ne m'ait pas permis de me prononcer sur leur validité. Il est probable que le plus grand nombre devra être inscrit en synonymie, mais je ne suis pas encore en mesure de me prononcer définitivement à cet égard.

J'ose espérer que mon petit travail, tout incomplet qu'il soit, ne sera pas sans quelque utilité et qu'il aidera au classement des collections. Ce n'est, du reste, qu'un jalon posé pour l'avenir, et je serai reconnaissant à mes collègues de vouloir bien me communiquer des espèces intéressantes ou le résultat des observations qu'ils auront pu faire. Grâce à leur concours, je parviendrai à réunir les documents nécessaires pour parfaire mon œuvre, et je pourrai un jour offrir au public entomologique une véritable Monographie des Lampyrides. (1)

Moulins (Allier), 1^{er} février 1884.

(1) Je suis heureux de pouvoir offrir l'expression de ma reconnaissance et mes plus sincères remerciements à tous ceux de mes collègues qui ont bien voulu mettre leur collection à ma disposition, et notamment à MM. Bourgeois, von Heyden, Gestro, Ancy, Fairmaire, Paulino d'Oliveira, de Marsoul, Ragusa, Reitter, Desbrochers des Loges, des Gozis, Rouget, Costa.

Les Lampyrides, tels que je les comprends dans le présent travail, forment le deuxième groupe des *Mollipennes* de Mulsant, la tribu II des *Malacodermes* de Lacordaire et les *Lampyrini*, section des *Malacodermidæ* du catalogue de Harold.

Je les diviserai en trois tribus :

Tête complètement recouverte par le prothorax ; celui-ci creusé de 2 sillons bien distincts partant de la base et atteignant le rebord antéro-latéral ; ♂ pourvus d'ailes et d'élytres ; ♀ aptères et n'ayant que des moignons d'élytres.

LAMPYRIDES VRAIS.

Tête complètement recouverte par le prothorax ; celui-ci creusé d'impressions longitudinales mal définies près de ses bords latéraux ; ♂ et ♀ aptères et n'ayant que des rudiments d'élytres.

PHOSPHÆNIDES.

Tête entièrement découverte ; prothorax non creusé de 2 sillons partant de la base et atteignant le rebord antéro-latéral.

LUCIOLIDES.

PREMIÈRE TRIBU.

LAMPYRIDES VRAIS

A. — Dernier article des palpes brièvement conique ou ovulaire ; yeux très gros, contigus en dessous, faiblement séparés sur le front ; antennes au plus de la longueur du prothorax ; prothorax et élytres jamais entièrement noirs.

I. Mandibules petites, point saillantes, médiocrement

étroites, droites, subparallèles, terminées au sommet en dedans par une toute petite pointe aiguë, ciliées en outre à leur partie dorsale; pygidium jamais profondément échancré dans le milieu de son bord postérieur; ♀ généralement beaucoup plus grandes que les ♂.

Lame verticale du repli du prothorax un peu élargi d'avant en arrière depuis les hanches antérieures jusqu'au bord postérieur du segment prothoracique; corps convexe; fémurs robustes, les 2 paires antérieures ovalairement renflées dans leur milieu.

Pelania Muls.

Lame verticale du repli du prothorax ayant sa plus grande largeur à la hauteur des hanches antérieures, offrant une déclivité plus ou moins prononcée de ce point jusqu'au bord postérieur du segment prothoracique; corps généralement peu convexe; fémurs grêles et aplatis.

Lampyris Geoffr.

II. Mandibules grêles, saillantes, très étroites, fortement courbées, terminées en pointe simple, munies intérieurement à leur base d'une fine membrane ciliée; pygidium profondément échancré ou entaillé dans le milieu de son bord postérieur, taille des ♀ généralement égale à celle des ♂.

Lamprorhiza Motsch.

A'. — Dernier article des palpes maxillaires très gros, subtriangulaire; yeux petits séparés; antennes de la longueur de la moitié du corps; prothorax et élytres entièrement d'un noir mat. *Phosphænopterus* Schauf.

Genre PELANIA.

Muls. Op. Ent. 11^e cahier, 1860. p. 120.

Elytres graduellement rétrécies; prothorax sans carène ou n'en offrant que de faibles vestiges près de son bord antérieur; repli du bord externe des élytres apprimé.

mauritanica L.

Elytres brusquement et rapidement rétrécies à leur côté externe à partir des épaules jusqu'au milieu de leur longueur; prothorax chargé d'une carène longitudinale bien visible; repli du bord externe des élytres étalé.

angustipennis Ern. Ol.

PELANIA MAURITANICA L. *Lampyrus mauritanica* L. Syst. nat. éd. 13. p. 1884. — Oliv. (Type ♂ ♀ !!) (1) Ent. II. 28. pl. 1. fig. 5a. — J. du V. (Type !!) Glan. ent. 1, p. 7. — *Pelania mauritanica* Muls. (Type !) Mollip. p. 67. — *Pelania scutellata* Fairm (Type !) Soc. Ent. Fr. Bul. p. 40. 1884. (Voir dans Mulsant (l. c.) la suite de la synonymie www.libtool.com.cn)

Var. *obtusa* Fairm. (Type !) *Lampyrus obtusa* Fairm. Soc. ent. Fr. 1866. p. 44. — Ab. IX. p. 409.

C'est bien là l'insecte qu'Olivier a représenté fig. 5 a. Mais il confondait plusieurs espèces sous ce nom et, en effet, dans sa collection, se trouvent étiquetés *mauritanica* :

1° Le véritable *Lampyrus mauritanica* de Linné et de Fabricius ;

2° Un exemplaire ♂ immature de *Lampyrus noctiluca*, à corselet, élytres et abdomen entièrement testacés ; c'est celui que Jacquelin du Val a vu dans la collection Chevrolat et dont il fait mention dans ses Glanures entomologiques, I, p. 9 ;

3° Et enfin un exemplaire ♂ et une ♀ du *Lampyrus Reichei*, qui sont les modèles des fig. 5 b et 5 c.

Grâce à l'obligeance de M. Fairmaire, j'ai pu examiner son *Lampyrus obtusa* : ce n'est certainement qu'un petit *mauritanica* à prothorax un peu plus anguleux en devant. Tous les caractères différentiels que signale l'auteur dans sa description se retrouvent en partie sur certains individus de la série des *mauritanica* que je possède. J'ai reçu, en outre, de Tanger et de Saïda, plusieurs exemplaires exactement intermédiaires pour la taille et la forme du corselet entre cette variation extrême et le type.

Quant au *Pelania scutellata* Fairm., dont la diagnose comparative a été publiée dans le bulletin de la séance du 27 février 1884 de la Société entomologique de France, il a été établi sur un unique exemplaire de grande taille, en très mauvais état, dont la principale différence consiste dans la forme de l'écusson qui est en triangle aigu au lieu d'être plus ou moins arrondi au sommet, caractère des plus variables et sans valeur spécifique.

(1) !! signifie que je possède le type ; ! que je l'ai eu entre les mains, en communication seulement.

Le *Pelania mauritanica* (fig. 1) est commun en Algérie dans le Tell et les Hauts Plateaux ; je l'ai pris à Nemours, Tlemcen, Sebdou, Saïda, Sidi-bel-Abbès, Blidah, Boghar, Alger, Bougie, Constantine, Batna, Bône. Il est également abondant aux environs de Tanger et en Tunisie. En Europe, il est signalé du midi de l'Espagne et du Portugal. Très rare en France, il a été capturé, d'après Mulsant, aux environs de Narbonne et dans le département du Var. La femelle acquiert parfois des dimensions énormes.

PELANIA ANGUSTIPENNIS Ern. Oliv. (Type!!) Soc. Ent. Fr. 1883. LXIX.

Oblongo-elongata, convexa, testaceo-flavescens, sat nitida, fulvo pubescens; prothorace latitudine basali brevior, ogivali, carina media lævi longitudinaliter instructo, lateribus marginatis et erectis, angulis posticis productis; elytris brevibus, prothorace latioribus, ab humeris ad abdominis segmentum secundum valde angustatis, dein leviter usque ad apicem; margine laterali plano; abdominis segmentorum angulis acutissime et longissime retro productis; pygidio elongato, medio tectiformi; ultimo ventrali segmento recte truncato.

♂ Long. 15 mill. ; larg. aux épaules, 6 mill. — Oblong, allongé, convexe, d'un testacé flave; élytres d'un testacé légèrement rembruni avec une large marge latérale et une fine bordure suturale plus pâles. Antennes comprimées, graduellement amincies à partir du 3^e article, pubescentes. Prothorax un peu plus large que long, très superficiellement pointillé, fortement relevé en rebord en avant et sur les côtés qui sont très sensiblement atténués en ogive dès la base; bord basilaire sinué, angles postérieurs émoussés mais saillants en arrière; disque orné d'une tache d'un jaune plus foncé et chargé sur son milieu d'une carène longitudinale obtuse. Ecusson flave, pubescent, triangulaire, à sommet arrondi. Elytres courtes, beaucoup plus larges que le prothorax, pubescentes, rugueuses, chargées de trois côtes saillantes, fortement rétrécies à leur côté externe à partir de l'angle huméral jusqu'à la hauteur du deuxième segment abdominal, et de là, insensiblement jusqu'à l'angle apical; marge laté-

rale large, étalée, prolongée jusqu'à la hauteur du deuxième segment abdominal; abdomen plus large et plus long que les élytres, à segments supérieurs carénés et prolongés à leurs angles latéraux en une longue lanière aiguë; pygidium très convexe longitudinalement dans son milieu, très légèrement rétréci d'avant en arrière, arrondi à l'extrémité; segments inférieurs aussi larges que les supérieurs, le dernier tronqué carrément sans échancrure. ♀ Inconnue.

Bien distinct du *mauritanica* par le prothorax caréné et plus aigu en devant, la forme des élytres brusquement atténuées, à marge externe étalée au lieu d'être réfléchie, le dernier segment ventral sans échancrure, etc.

Je ne possède qu'un seul exemplaire ♂ de cette remarquable espèce (fig. 2); je l'ai capturé au vol, le soir, au mois de mai, sous les figuiers, entre Bone et Hippone (Algérie).

Genre **LAMPYRIS.**

Geoffr. Hist. abr. des Ins. t. p. 165.

- I. — Septième segment ventral prolongé dans le milieu de son bord postérieur en un lobe linéaire, arrondi ou triangulaire s.-gen. NYCTOPHILA.
- II. — Septième segment ventral à bord postérieur tronqué carrément, échancré ou sinué, mais non prolongé en lobe linéaire, arrondi ou triangulaire... s.-g. LAMPYRIS.

(Sous-genre **Nyctophila.**)

1. — Elytres largement dilatées..... *Libani* Cast.
Elytres parallèles ou très légèrement dilatées... 2
2. — Septième segment ventral offrant dans le milieu de son bord postérieur un lobe arrondi en demi-cercle, très court, peu saillant *molesta* J. du V.
Septième segment ventral brusquement rétréci en un lobe linéaire ou triangulaire 3
3. — Prothorax marqué sur son disque d'une tache noire *maculicollis* Fairm.
Prothorax flave ou testacé, sans tache ou marqué d'une tache rose ou d'un testacé rose 4

4. — Prothorax creusé en devant, entre les yeux, d'une profonde fossette; pygidium orné de chaque côté de sa base d'une petite tache oblongue translucide.

caucasica Motsch.

Prothorax sans fossette entre les yeux; pygidium sans taches translucides 5

5. — Segments ventraux légèrement entaillés dans le milieu de leur bord postérieur *incisa* nov. sp.

Segments ventraux nullement entaillés dans le milieu de leur bord postérieur 6

6. — Prothorax sensiblement élargi en avant; élytres brunes ayant seulement les côtes suturales et marginales testacées *Heydeni* nov. sp.

Prothorax à côtés latéraux parallèles ou atténués en devant; élytres testacées ou d'un brun testacé largement bordées de testacé pâle 7

7. — Prothorax à côtés latéraux droits, parallèles, s'arrondissant seulement près du sommet; pygidium arrondi en demi-cercle légèrement tronqué à l'extrémité *syriaca* Baudi.

Prothorax à côtés latéraux en ligne courbe presque dès la base et atténués en avant; pygidium trilobé à lobe médian arrondi, ou seulement sinué, ou en demi-cercle, ou en ogive *Reichei* J. du V.

Pygidium à bord postérieur trilobé, le lobe médian plus large et plus prolongé en arrière que les latéraux. var. *Reichei* J. du V.

Pygidium en demi-cercle, sans sinuosités ou très faiblement sinué var. *hispanica*.

Pygidium en ogive parfaite var. *Bonvouloiri* J. du V.

(Sous-genre **Lampyris**.)

1. — Elytres à bord sutural sinué, à extrémité fortement arquée en dedans *attenuata* Fairm.

Elytres à bord sutural sans sinuosités, non arquées en dedans à leur sommet. 2

2. — Une tache noire ou obscure sur le prothorax... 3

Prothorax entièrement testacé, sans tache noire ou avec une tache rose ou d'un testacé rose 11

3. — Elytres entièrement noires 4

Elytres testacées, ou brunes, bordées de testacé. 5

4. — Pygidium cunéiforme ou cordiforme, légèrement sinué latéralement..... *depressiuscula* Motsch.
 Pygidium dilaté arrondi sur les côtés, puis brusquement rétréci au sommet en une pointe obtuse plus ou moins saillante..... *noctiluca* L.
 Plus large et plus allongé, écusson tronqué. var. *Bellieri* Reiche.
5. — Pygidium à sommet tronqué ou sensiblement échancré en arc..... *orientalis* Fald.
 Pygidium plus ou moins fortement sinué, mais ni tronqué à l'extrémité ni sensiblement échancré en arc..... 6
6. — Prothorax lisse ou à peine ponctué... *soror* Schaum.
 Prothorax fortement ponctué sur sa moitié antérieure et sur ses marges latérales..... 7
7. — Pygidium chargé sur son milieu d'une forte gibbosité..... 8
 Pygidium plus ou moins convexe, mais non chargé d'une forte gibbosité..... 9
8. — Gibbosité du pygidium atteignant le bord postérieur; angles postérieurs du prothorax aigus et saillants en arrière..... *membranacea* Motsch.
 Gibbosité du pygidium non prolongée jusqu'au bord postérieur; angles postérieurs du prothorax peu saillants, droits ou obtus..... *Raymondi* Muls.
9. — Pygidium plus étroit à sa base que le segment dorsal précédent, dont les angles latéraux sont aigus, divergents et assez fortement saillants postérieurement..... 10
 Pygidium presque aussi large à sa base que le segment dorsal précédent, dont les angles latéraux sont apprimés, obtus et à peine prolongés en arrière.
Lareyniei J. du V.
10. — Dernier segment ventral sinué, entaillé ovalairement dans le milieu de son bord postérieur et présentant un petit mucron saillant à chacun des bords de cette échancrure; prothorax sans taches translucides..... *mucronata* nov. sp.
 Dernier segment ventral tronqué carrément ou très légèrement échancré; prothorax orné de deux taches translucides bien apparentes..... *Zenkeri* Germ.

11. — Prothorax sensiblement rétréci en arrière.
casgica Motsch.
 Prothorax à côtés parallèles ou élargis en avant, mais non sensiblement rétrécis en arrière 12
12. — Elytres dilatées de façon à présenter leur plus grande largeur vers le milieu de leur longueur.
berytensis Fairm.
 Elytres parallèles ou très peu dilatées, offrant leur plus grande largeur peu après l'angle huméral... 13
13. — Prothorax s'arrondissant seulement antérieurement, à bords latéraux en ligne droite sur la moitié au moins de leur longueur 14
 Prothorax à bords latéraux en ligne courbe presque dès la base 15
14. — Angles latéraux des segments supérieurs de l'abdomen très obtus et peu ou point prolongés en arrière; abdomen plus grossièrement ponctué. *nervosa* Ern. Ol.
 Angles latéraux des segments supérieurs de l'abdomen aigus et longuement prolongés en arrière, surtout chez les deux derniers segments; abdomen finement ponctué *ambigena* J. du V.
15. — Bord basilaire du prothorax en ligne droite, à angles droits et nullement saillants; élytres d'un testacé légèrement rembruni, à côtes obsolètes, à peine marquées; segments inférieurs de l'abdomen marqués de chaque côté près du bord latéral d'une tache rosée *barbara* nov. sp.
 Bord basilaire du prothorax prolongé de chaque côté obliquement pour former les angles postérieurs qui sont assez saillants; élytres brunes, finement bordées de testacé, à côtes très saillantes; segments inférieurs de l'abdomen concolores. *mutabilis* nov. sp.

Nyctophila.

NYCTOPHILA LIBANI Cast. *Lampyris Libani* Cast. (Type ♂ ♀ !!)
 Soc. Ent. Fr. 1833. p. 139. — J. du V. (Type ♂ ♀ !!) Gl. ent.
 1. p. 14 — *Lampyris insignis* ♂ nec ♀ Ancey (type ♂ ♀ !)
 Ab. VII. p. 86.

♂ Long. 16 mill.; larg. 6 1/2 mill. — D'un jaune roussâtre avec les élytres obscures et une tache trans-

versale noire sur la partie postérieure du prothorax. Antennes à peine plus longues ou pas plus longues que le prothorax, à 1^{er} article épais, allongé, 2^e très court, 3^e sensiblement égal au 4^e. Prothorax plus large que long, à bord antérieur bien arrondi et médiocrement relevé, à bords latéraux plans et même un peu déprimés avant les angles postérieurs qui sont obtus et saillants en arrière; bord postérieur droit, prolongé de chaque côté obliquement pour former les angles; ponctuation forte et médiocrement serrée; au milieu, dans la partie noire, un sillon assez profond, se continuant sur la partie jaune par une carène finement saillante; deux taches translucides oblongues près du bord antérieur. Ecusson jaunâtre, triangulaire. Elytres oblongues, élargies, plus larges que le prothorax, fortement obtuses à l'extrémité, brunes avec les bords sutural et marginal moins obscurs, rugueuses avec chacune trois côtes longitudinales bien marquées et les vestiges d'une quatrième au côté externe. Segments supérieurs de l'abdomen à angles aigus fortement prolongés en arrière; pygidium convexe, en carré transverse s'élargissant latéralement, à bord postérieur fortement sinué et offrant un lobe médian arrondi.

♀ Long., 20 mill.; larg., 5 mill. — Jaune-roux; prothorax orné d'une tache orangée mal limitée sur le milieu de sa moitié basilaire et de deux taches translucides, petites, oblongues près du bord antérieur, plus large que long, très convexe sur son disque, légèrement rétréci en avant; angles antérieurs obtusément arrondis mais bien marqués; bord antérieur largement cintré, le postérieur presque droit légèrement sinué près des angles qui sont obtus et nullement saillants; marge grossièrement et éparsément ponctuée; partie convexe marquée d'une impression longitudinale vague qui se continue en une carène sur la marge antérieure. Ecusson nettement carré. Moignons des élytres d'un jaune-brun, écartés, grossièrement ponctués, régulièrement et brièvement atténués, à extrémité obtuse atteignant presque le bord postérieur du premier segment abdominal; segments supérieurs de l'abdomen arqués latéralement, presque droits postérieurement avec l'angle droit, émoussé, les deux derniers for-

tement carénés, le dernier cunéiforme ou en triangle à sommet aigu ; dernier des segments inférieurs entaillé dans le milieu de son bord postérieur.

Mont Liban. (Coll. Ancey, la mienne).

M. Ancey a bien voulu me communiquer les deux sexes de l'espèce qu'il a décrite sous le nom d'*insignis*. Leur comparaison avec les types de Castelneau ne laisse aucun doute sur la parfaite identité des deux mâles, mais les femelles sont très différentes et il est certain que l'un des auteurs s'est trompé en réunissant sous le même nom des sexes d'espèces différentes. Castelneau ayant la priorité, son opinion doit prévaloir, et jusqu'à preuve évidente du contraire, on doit considérer comme femelle authentique du *Libani* l'insecte qu'il considérait comme tel et qui est celui dont j'ai donné la description détaillée d'après un type provenant de sa collection. L'*insignis* ne se trouve donc plus représenté que par une femelle. C'est là une nouvelle preuve de la grande difficulté que la dissemblance des sexes apporte à l'étude du genre *Lampyris*, pour les espèces surtout que l'on rencontre rarement ou qui ne peuvent être observées aisément par l'œil judicieux d'un entomologiste.

NYCTOPHILA MOLESTA J. du V. *Lampyris molesta*, J. du V. Gl. ent. 2. p. 102. ♂.

Chez les individus typiques de cette espèce, le bord postérieur du dernier segment ventral notablement sinué de chaque côté, présente dans son milieu un lobe court, arrondi et médiocrement saillant au-delà des côtés qui avancent plus que chez les espèces voisines ; mais quelquefois ce lobe se raccourcit tellement qu'il est difficile de l'apercevoir, et les exemplaires ainsi conformés pourraient être pris pour des *noctiluca* : on les distinguera toujours aisément par la couleur flave du dessous du corps, la bordure testacée des élytres, le prothorax plus long et moins atténué en devant (fig. 3).

Piémont. (Ma coll.).

NYCTOPHILA MACULICOLLIS Fairm. *Lampyris maculicollis* Fairm. (Type !) Soc. Ent. Fr. 1866. p. 262. ♂ ♀ et larve. — Ab. ix. 409.

A la suite de sa description, M. Fairmaire compare cette

espèce au *Reichei* ; il cite plusieurs caractères différentiels, entr'autres celui-ci que le dernier segment inférieur de l'abdomen est denté au lieu d'être échancré. C'est là une erreur d'observation : le *L. Reichei* rentre comme le *maculicollis* dans mon sous-genre *Nyctophila*, et tous les deux ont le dernier segment inférieur de l'abdomen prolongé en une pointe ou dent de longueur variable, mais toujours bien distincte. Les autres caractères cités suffisent, du reste, à distinguer les deux espèces.

Syrie : Bosz-Dagh ; Anatolie. — (Coll. Bourgeois, von Heyden).

NYCTOPHILA INCISA.

Oblonga, convexa, rufescens; prothorace transverso, lateribus arcuatis, antice rotundato, basi recte truncato, angulis rectis vix productis, macula aurantiaca quadrata ornato; elytris prothorace paulo latioribus, brunneo testaceis, sutura margineque externo dilutioribus, nitidis, costulatis; abdominis segmentorum angulis haud retro productis, obtusis; pygidio fere semirobundato; ventralium segmentorum margine apicali sinuato, in medio leviter inciso, ultimo segmento dente triangulari munito; antennis tarsisque infuscatis.

♂ Long. 13 à 14 1/2 mill.; larg. 4 à 5 mill. — Convexe, oblong, d'un jaune roux avec les élytres d'un brun testacé bordées de testacé plus clair. Antennes moins longues que le prothorax à premier article gros, épaissi au sommet, deuxième moitié plus court que le troisième; celui-ci un peu plus long et moins massif que le quatrième, les suivants encore plus courts, subégaux, le dernier allongé en une pointe obtuse. Prothorax à peine plus large que long, à bords en ligne courbe dès la base, bien arrondi et légèrement rebordé en devant, orné sur la moitié basilaire de son disque d'une tache d'un testacé orange et creusé d'un sillon longitudinal sur l'étendue de cette tache, grossièrement ponctué sur sa moitié antérieure et sur ses marges latérales; bord postérieur en ligne droite sinué près des angles qui sont droits et peu saillants. Ecusson sillonné, triangulaire. Elytres convexes, un peu plus larges que le prothorax, à extrémité obtuse, rugueuses, chargées, outre la suture, de quatre lignes saillantes, la plus interne

et la plus externe à peine marquées. Segments supérieurs de l'abdomen non ou à peine prolongés en arrière, fortement arqués latéralement avec les angles obtus ; les inférieurs très convexes longitudinalement, ayant le bord postérieur sinué et légèrement entaillé ou échancré dans son milieu, le dernier prolongé en une dent triangulaire large et courte ; pygidium arrondi ; tarsi rembrunis. ♀ inconnue.

Tekke (Turkménie). — Collect. von Heyden, la mienne.

NYCTOPHILA CAUCASICA Motsch. *Lamprotomus caucasicus* Motsch. Et. ent. 1854. p. 19. — *Lampyrus caucasicus* J. du V. (Type ♂) Glan. Ent. 1. p. 15.

♂ Long. 10 1/2 mill. ; larg. 3 mill. — Étroit, allongé, d'un jaune-roussâtre pâle. 1^{er} article des antennes renflé au sommet, 2^e très court, transverse, 3^e égal au 4^e, les suivants plus courts. Prothorax arrondi et faiblement rebordé en devant, en ligne droite à ses côtés latéraux avec une sinuosité au devant des angles postérieurs qui sont aigus et saillants en dehors, orné sur son disque d'une tache d'un testacé rosé, finement ponctué sur toute l'étendue de cette tache, plus grossièrement sur la moitié antérieure et sur les marges latérales, creusé en devant, entre les yeux, d'une large et profonde fossette circulaire ; bord postérieur en ligne droite. Ecusson d'un testacé rosé, triangulaire, à sommet arrondi. Elytres allongées, étroites, pas plus larges aux épaules que le prothorax, parallèles, atténuées en une extrémité obtuse ; d'un jaunâtre testacé un peu rembruni dans leur moitié basilaire, rugueuses, chargées outre la suture de trois côtes saillantes, la plus externe partant de l'angle huméral et atteignant le sommet. Segments supérieurs de l'abdomen carénés, arqués latéralement, à bord postérieur sinué, avec les angles latéraux aigus et assez longuement prolongés en arrière ; pygidium à côtés d'abord en ligne droite, puis atténués en forme d'ogive plus ou moins sinuée ; orné de chaque côté de sa base près du bord latéral d'une petite tache translucide, oblongue ; dernier segment ventral très convexe, arrondi sur les côtés et brusquement prolongé en une pointe obtuse un peu plus longue que le pygidium. ♀ Inconnue.

Caucase : Kulek ; Perse sept. — Coll. Bourgeois, la mienne.

J'ai reçu cette petite espèce de Russie sous le nom de *caucasica* Motsch., que je lui ai conservé sans avoir cependant une certitude absolue que ce soit bien l'espèce de l'auteur russe dont je n'ai pas vu le type, la description qu'il en donne étant insuffisante, comme, du reste, toutes celles qu'il a faites; toutefois, elle est identique à l'exemplaire étiqueté de ce nom dans l'ancienne collection Reiche appartenant actuellement à M. Bourgeois, exemplaire mentionné par Jacquelin du Val (l. c.). Dans tous les cas, l'espèce que je décris est bien caractérisée par les taches translucides de la base du pygidium qui annoncent une intensité de l'appareil lumineux plus considérable que chez les mâles de tous les autres *Lampyris*.

NYCTOPHILA HEYDENI. (fig. 4).

Elongata, pallide rufescens; elytris fuscis angustissime fulvo-marginatis; prothorace fulvo, antrorsum dilatato, angulis posterioribus rectis; elytris elongatis, subparallelis, vix costulatis; pygidio lateribus arcuatis, apice sinuato; ultimo ventrali segmento in medio posteriore triangulari dente munito.

♂ Long. 12 à 15 mill.; larg. 4 à 5 mill.—Oblong allongé, d'un jaune roux, tout couvert d'une pubescence flave. Tête noire, antennes, palpes et parties de la bouche testacés. Antennes couvertes de longs poils flaves, à 1^{er} article épaissi au sommet, 2^e moitié plus court que le 3^e, 3^e et 4^e subégaux et plus longs que les suivants, dernier allongé, pointu. Prothorax aussi long que large, à côtés arqués et élargis antérieurement, bord arrondi en devant et médiocrement relevé, le postérieur entaillé dans son milieu et prolongé obliquement de chaque côté pour former les angles qui sont droits et peu saillants en arrière; orné sur sa moitié basilaire d'une tache d'un testacé plus foncé, lisse et sillonné sur cette tache, ce sillon continué par une carène sur la partie antérieure qui est grossièrement ponctuée, ainsi que les marges latérales. Ecusson flave, tronqué au sommet. Elytres pubescentes noires, très finement bordées de testacé, plus larges que le prothorax, rugueuses, à trois côtes peu marquées, à extrémité obtuse, garnies de cils flaves sur la suture et le bord

marginal; repli huméral noir. Segments supérieurs de l'abdomen rembrunis, bordés de testacé clair, côtés latéraux faiblement arqués, les postérieurs légèrement bisinués garnis de cils flaves, à angles aigus et saillants. Pygidium convexe, pubescent, cilié, arrondi, sinué près du sommet et atténué en un lobe obtus plus ou moins prononcé. Parties inférieures d'un jaune roussâtre; lobe postérieur du dernier segment ventral triangulaire, court et obtus. Tarses et extrémité des tibias rembrunis.

♀ Inconnue.

Miramar, près Mahon (îles Baléares). Coll. Von Heyden, la mienne.

Je dois la connaissance de cette jolie espèce à M. de Heyden, de Francfort, qui a bien voulu m'en abandonner un exemplaire. Je suis heureux de la lui dédier en remerciement de l'obligeance avec laquelle il m'a communiqué sa belle collection de Lampyrides.

NYCTOPHILA SYRIACA Baudi. *Lampyrís syriaca* Baudi. Berl. Ent. Zeit. 1871. 58. ♂ ♀ — Ab. ix. 411.

Syrie (Coll. Bourgeois, la mienne).

NYCTOPHILA REICHEI J. du V. *Lampyrís Reichei* J. du V. (Type ♂ ♀ !!) Gl. Ent. 1. p. 13 — Muls. (Type !) Mollip. p. 95 — *Lampyrís mauritanica* Oliv. (Type ♂ ♀ !!) Ent. II. 28. pl. 1. fig. 5 b, c. — *Lampronetes mauritanica* Motsch. Et. ent. 1854. p. 16.

Var. a. *Reichei* — *Lampyrís Reichei* auct..

b. *hispanica*.

c. *Bouvouloiri* J. du V. *Lampyrís Bouvouloiri* J. du V. Gl. Ent. 2. p. 101.

Espagne, Portugal, Sicile, Algérie, France méridionale (remonte jusqu'au Puy-de-Dôme).

Espèce très répandue et très variable sous le rapport de la taille et surtout de la sculpture du pygidium. Chez le type, ce dernier organe est trilobé avec le lobe médian plus largement arrondi et plus prolongé en arrière que les latéraux. Le lobe médian, s'élargissant davantage, finit par absorber presque entièrement les deux autres dont la place primitive n'est plus rappelée de chaque côté que par une légère sinuosité; les sinuosités même disparaissent entièrement, et le pygidium affecte alors la forme d'un croissant ou demi-cercle régulier: c'est la variété que j'appelle *hispanica*; on la rencontre avec le type

dans le midi de la France; mais elle est surtout commune dans la péninsule Ibérique et elle est confondue dans la plupart des collections avec le *Lampyris Raymondi* qui en est bien différent. Dans la variété c, le pygidium s'allongeant encore davantage, finit par présenter la figure d'une ogive parfaite. Cette variété paraît localisée en Sicile : c'est sur elle que Jacquelin du Val avait établi son *Lampyris Bonvouloiri*. Ces différentes variétés sont reliées entre elles par des formes intermédiaires qui rendent les transitions insensibles et ne peuvent permettre aucun doute sur la validité de leur réunion en une même espèce.

Malgré toutes ses variations, le *N. Reichei* se reconnaît toujours aisément à la forme de son prothorax atténué en avant, dès la base.

Olivier n'avait pas distingué cette espèce du véritable *mauritanica* de Linné et de Fabricius. Les exemplaires du *Reichei* (un ♂ et une ♀) que je possède provenant de sa collection avec l'étiquette : *mauritanica*, sont ceux qui ont servi de modèles aux figures 5 b et 5 c et ne laissent subsister aucun doute sur l'erreur dans laquelle était tombé, à cet égard, l'auteur de l'Entomologie.

C'est bien également le *Lampronetes mauritanica* de Motschulsky; en effet, dans la description de son genre *Lampronetes* (Et. ent. 1852, p. 45), l'auteur russe dit que « le dernier segment du dessus de l'abdomen est arrondi et sinué plus ou moins profondément de chaque côté du bord postérieur », caractères qui s'appliquent très bien au *Nyctophila Reichei*, mais ne conviennent nullement au *Pelania mauritanica* de Linné.

Lampyris.

LAMPYRIS ATTENUATA Fairm. (Type!) Ann. mus. civ. Gènes. 1875. p. 512. ♂.

♂ Long. 11-13 mill.; larg. 4 mill. — Oblong, allongé, atténué en arrière, d'un jaunâtre pâle, luisant, couvert sur toutes ses parties d'une pubescence fauve. Antennes d'un jaune fauve, de la longueur du prothorax, à articles très serrés, le 1^{er} allongé, épais; le 2^e court, transverse; le 3^e un peu plus long que le 4^e; celui-ci renflé, les suivants subégaux, s'amincissant graduellement jusqu'au dernier qui est terminé en une pointe obtuse. Prothorax

fauve, un peu moins long que large, avec une tache quadrangulaire d'un jaune plus foncé, parfois rembruni, un peu moins long que large, atténué en ogive en devant, à côtés latéraux parallèles sur la moitié de leur longueur, rebordé sur tout son pourtour; bord basilaire droit; angles postérieurs droits et non saillants; ponctuation fine et très dense, sauf sur la partie discale postérieure où on ne voit que quelques points épars et qui est creusée d'un sillon longitudinal plus ou moins profond se continuant antérieurement en une très faible carène le plus souvent indistincte. Écusson fauve, ponctué, largement arrondi au sommet. Elytres plus larges que le prothorax, brunes, finement bordées de testacé, rugueuses, fortement atténuées dès avant le milieu de leur longueur jusqu'à l'angle apical, bord sutural déhiscent dans sa moitié postérieure jusque près de l'extrémité qui est obtusément arrondie et arquée en dedans, chargées de trois lignes saillantes, la plus interne se terminant aux deux tiers, la deuxième se joignant ordinairement à la troisième un peu avant l'extrémité (chez un seul exemplaire, ces deux côtes ne se joignent pas et la plus externe disparaît à la hauteur où la jonction devrait être faite). Segments supérieurs de l'abdomen à côtés latéraux légèrement courbes, à angles obtus à peine saillants et à bord postérieur fortement arqué; pygidium presque aussi large que le segment précédent, arrondi en demi-cercle, très convexe longitudinalement sur sa ligne médiane; dernier segment ventral entaillé ovalairement dans le milieu de son bord postérieur (fig. 5).

♀ Long. 19 mill. — Entièrement d'un jaune-roux; prothorax couvert d'une pubescence flave, ogival comme celui du ♂, à bords latéraux moins relevés; creusé sur son disque d'une profonde impression triangulaire; moignons des élytres très courts, séparés, divariqués, acuminés en un angle aigu; écusson large, en demi-cercle; segments supérieurs de l'abdomen fortement carénés, bord externe presque droit, à angle émoussé, bord postérieur en ligne droite; pygidium arrondi, à côtés peu dilatés; dernier segment inférieur échancré un peu plus faiblement que chez le ♂.

Tunisie : Kérouan (Mus. de Gènes). — Algérie : Bou-Saada (Coll. Bourgeois, la mienne).

M. Fairmaire a établi cette espèce sur un seul exemplaire mâle, en très mauvais état, provenant des chasses d'Abdul-Kérim en Tunisie. M. Gestro me l'ayant obligeamment communiqué en même temps que la nombreuse série des Lampyrides du musée qu'il dirige, j'ai pu rectifier certaines parties de la description que l'état défectueux du type rendait inexactes. Ainsi le côté droit du prothorax a subi, chez ce dernier, un choc qui a produit un enfoncement à la suite duquel le sillon normal disparaissant a été remplacé par une boursoufflure simulant une carène. La femelle que j'ai décrite a été rapportée, avec plusieurs mâles, de Bou-Saada, par M. Leprieur; elle appartient à mon collègue et ami M. Bourgeois qui, avec sa complaisance accoutumée, s'est empressé de la mettre à ma disposition et a bien voulu enrichir ma collection de cette intéressante espèce.

LAMPYRIS DEPRESSIUSCULA Motsch. Et. ent. 1854. p. 19.

♂ Taille du *noctiluca*; prothorax comme celui de cette dernière avec le côté de la base légèrement bisinué et les angles postérieurs aigus et saillants en arrière; élytres brunes, finement bordées de testacé, très convexes dans leur tiers antérieur, élargies et déprimées postérieurement; abdomen à segments supérieurs bruns, bordés de testacé, à angles latéraux aigus et assez longuement prolongés en arrière; pygidium cordiforme, légèrement sinué latéralement, plus étroit que le segment précédent, entouré d'une bordure testacée, convexe longitudinalement sur son milieu, mais non gibbeux; poitrine et jambes d'un roux flave; ventre testacé à dernier segment tronqué carrément ou à peine échancré.

Caucase : Derbent. — (Ma collect.)

Je ne connais pas la femelle de cette espèce. Motschulsky en donne (l. c.) une courte description insuffisante à la caractériser.

LAMPYRIS NOCTILUCA L. Syst. nat. 1., p. 643. — *Lampyris longipennis* Motsch. Et. ent. 1854, p. 21. (Voir dans Muls. Mollip., p. 74, le reste de la synonymie et la description des deux sexes et de la larve).

Var. *Bellieri* Reiche. (Type!) *Lampyris Bellieri* Reich. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 155.

Répandu dans toute l'Europe, le Caucase, le littoral algérien, la Sibérie.

Le *Lampyris noctiluca* est l'espèce la plus commune du genre : c'est sa femelle à laquelle s'applique le plus ordinairement la dénomination vulgaire de *ver luisant*. Les mâles sont souvent excessivement abondants, aux mois de juillet et d'août, dans les bois et sous les grands arbres dans les localités un peu humides. On peut les prendre en grand nombre à la nuit close à l'aide d'une lumière posée sur une nappe qui, en peu d'instant, est couverte de ces insectes accourus au vol de toutes les directions. Les femelles sont beaucoup plus rares ; on les trouve sous les gazons, les détritiques végétaux où la lueur qu'elles émettent les fait aisément découvrir à distance. Les larves vivent sous les écorces des arbres abattus, les mousses, les pierres ; elles sont lumineuses ainsi que les femelles, mais avec une intensité bien moindre.

Cette espèce, comme du reste la plupart de ses congénères, varie beaucoup sous le rapport de la taille, de la couleur et de la configuration du pygidium. Les élytres sont ordinairement entièrement noires, mais parfois la suture près de l'écusson et la marge externe vers l'extrémité sont légèrement testacées ; l'abdomen est brun avec les 2 derniers segments testacés en entier, les précédents seulement bordés de cette même couleur. Le prothorax est également sujet à varier. Sur un exemplaire de ma collection provenant des bords de la Saône, aux environs de Lyon, il est atténué en ogive et présente une forme identique à celle qu'affecte cet organe chez le *Pelania mauritanica*.

Le *Lampyris longipennis* de Mostschulsky ne peut pas se distinguer spécifiquement du *noctiluca* L. et n'en est qu'une variété insignifiante.

Dans la variété *Bellieri* Reiche, le mâle est plus large, plus allongé, son écusson est carré ou tronqué au sommet ; la femelle a les 3 premiers segments de l'abdomen et la moitié antérieure du 4^e rayés d'un sillon sur la ligne médiane, au lieu d'être carénés à partir du 2^e ; la larve est toute noire et manque des taches d'un roux testacé qui ornent le corps de celle du type. Elle parait habiter de préférence les contrées méridionales de l'Europe : Portugal, Espagne, Italie, France méridionale.

LAMPYRIS ORIENTALIS Fald. Fn. transc. i. p. 184. t. 6. f. 6-7. —

Lamprotomus orientalis Motsch. Et. Ent. 1854. p. 18. ♂ ♀.

♂ Long. 14-16 mill. — Oblong, allongé, d'un roux fauve clair; élytres d'un testacé brunâtre avec la suture et la marge externe **plus claires.** Prothorax marqué sur son disque d'une tache brune, luisante, vaguement entourée d'une bordure interrompue d'un orangé clair; convexe, plus large que long, bien arrondi au bord antérieur qui est légèrement relevé, à côtés latéraux droits, bord basilaire presque droit au milieu, mais se prolongeant de de chaque côté obliquement pour former les angles postérieurs qui sont aigus, déprimés et assez saillants en arrière; ponctuation grossière et profonde, hormis sur la partie tachée du disque; au milieu une fine carène longitudinale. Ecusson fauve, triangulaire, tronqué au sommet. Elytres allongées, légèrement atténuées, obtusément acuminées à l'extrémité, rugueuses, pubescentes, chargées de 3 côtes bien marquées, à gouttière humérale profonde et se continuant jusqu'au tiers postérieur. Abdomen pubescent, très finement ponctué, à segments supérieurs carénés et impressionnés de chaque côté de cette carène, angles latéraux aigus et peu saillants, sauf ceux des 2 derniers segments; pygidium convexe, aussi large que le segment précédent, atténué en triangle, sinueux latéralement, à sommet tronqué, parfois légèrement échancré; segments inférieurs aussi larges que les supérieurs, arrondis latéralement, à bord postérieur droit, le dernier tronqué carrément avec une très faible échancrure médiane (fig. 6).

La tache noire du prothorax, bien marquée chez certains exemplaires, fait quelquefois défaut chez d'autres où elle est remplacée par une large plaque orangée.

Géorgie, Caucase. — Coll. de Heyden, la mienne.

LAMPYRIS SOROR Schaum Cat. col. Eur. p. 61. — *Lampyrus Zen-*

keri J. du V. Gl. ent. 1. p. 10. fig. 3. *nec* Germ. — Muls. Mollip.

p. 83. *nec* Germ. — *Lampyrus algerica* Ancey (type ♂) Ab. VII.

p. 87. — *Lampyrus cincta* Motsch. Et. ent. 1854. p. 20?

Europe méridionale : Dalmatie, Etrurie, Gênes, Sicile, Sardaigne; Caucase; Algérie (Blidah). Manque en France. — Coll. Ancey, la mienne.

Jacquelin du Val n'ayant pas reconnu le véritable

L. Zenkeri de Germar, qu'il décrit plus tard, comme il le dit lui-même (l. c. 2. p. 97), sous le nom de *L. germariensis*, la dénomination qu'il a donnée à cette espèce ne peut-être adoptée, quoiqu'antérieure à celle de Schaum. Le *Lampyrus algerica* dont j'ai pu examiner le type, grâce à l'obligeance de M. Ancey, ne me semble pas différer du *soror*; mais ce n'est qu'avec doute que je lui réunis la *cincta* de Motschulsky, dont la description n'est pas assez explicite pour permettre de se prononcer formellement pour ou contre cette réunion.

LAMPYRIS MEMBRANACEA Motsch. — *Lampronetes membranacea* (type ♂ ♀ !) Motsch. Et. ent. 1854. p. 16.

♂ Long. 13 mill. — D'un jaune testacé; élytres testacées avec une bordure marginale plus claire. Prothorax d'un flave luisant, convexe, arrondi et rebordé en devant, marqué sur son disque d'une tache brune, lisse, luisante, entourée d'orangé pâle, traversée par un sillon prolongé en une carène sur la marge antérieure; bord marginal grossièrement et densément ponctué; côté de la base droit à angles postérieurs aigus et saillants. Écusson flave, étroit, allongé, arrondi au sommet. Élytres à peine plus larges que le prothorax, allongées, obtusément acuminées, rugueuses, chargées de trois lignes saillantes qui s'effacent avant d'atteindre l'extrémité; gouttière humérale peu profonde. Abdomen pubescent, très finement ponctué, à segments supérieurs carénés, avec les angles latéraux larges et obtus assez saillants en arrière; pygidium s'élargissant d'abord, puis arrondi en demi-cercle, chargé sur sa partie médiane d'une forte gibbosité qui se prolonge jusqu'au bord postérieur. Segments inférieurs arqués latéralement, le dernier tronqué carrément. Jambes flaves, tarses rembrunis.

♀ Long. 12 mill. — Brune, couverte d'une pubescence flave. Prothorax brun bordé de testacé, plus large que long, à côtés latéraux arqués fortement rétrécis en avant, les angles antérieurs arrondis; bord basilaire sinué dans sa partie médiane et prolongé de chaque côté obliquement en arrière pour former les angles postérieurs qui sont presque droits et saillants; disque creusé transver-

salement d'une large et profonde fossette, ponctué, le bord marginal plus grossièrement et plus densément. Écusson indistinct. Moignons des élytres soudés, ponctués, bruns, finement bordés de testacé, arrondis en demi-cercle. Segments supérieurs de l'abdomen bruns, carénés, à bord latéral presque droit, le postérieur droit finement bordé de testacé blanchâtre; pygidium cordiforme, légèrement sinué latéralement, à sommet taché de testacé blanchâtre. Segments inférieurs grisâtres, les trois derniers d'un blanc de cire, le dernier très légèrement entaillé postérieurement.

Caucase. (Coll. de Heyden.)

C'est une véritable bonne fortune de rencontrer un type de Motschulsky. Aussi j'ai été heureux de trouver dans la collection de M. de Heyden un ♂ et une ♀ de cette espèce, venant de M. de Manderstjerna, qui les tenait directement de l'auteur russe lui-même.

LAMPYRIS RAYMONDI Muls. et Rey. (Type!) Ann. Soc. linn. de Lyon, t. 5. 1859. — Muls. Mollip. p. 85. — *Lampyrus lusitanica*, Motsch. Et. ent. 1854, p. 19. — J. du V. (Type!) Gl. ent. 1, p. 11. — *Lampyrus mauritanica*. Kust. Kæf. Eur. 9. 26.

France mérid., Espagne, Portugal, Italie, Sardaigne, Egypte, Syrie.

Je crois devoir adopter le nom de Mulsant, bien que postérieur à celui de Motschulsky, ce dernier faisant confusion avec celui de *Lampyrus (Luciola) lusitanica*, créé par Charpentier.

M. Letourneux a capturé à Ramlé (Egypte) un seul individu qui fait partie de la collection Bourgeois et paraît constituer une espèce différente (*L. Letourneuxi*). Il ressemble beaucoup au *Raymondi*, mais en diffère par le prothorax moins atténué en avant, à angles postérieurs bien droits, tandis qu'ils ont une tendance à être obtus chez le premier; l'écusson est arrondi au sommet au lieu d'être tronqué carrément; la partie translucide du prothorax est plus étendue et le repli prothoracique arrondi au sommet présente une ligne régulièrement courbe dans sa partie déclive postérieure, tandis que chez le *Raymondi*, il est tronqué en ligne droite au sommet et sa partie déclive postérieure est largement échancrée;

les élytres sont, en outre, plus foncées, plus fortement rugueuses et la taille est moins avantageuse. Malheureusement l'examen d'un seul exemplaire ne peut suffire pour établir avec certitude une nouvelle espèce dans un genre aussi difficile.

www.libtool.com.cn

LAMPYRIS LAREYNIÉ J. du V. (Type!) Gl. ent. 1. p. 12. — Muls. (Type!) Mollip. p. 90.

Corse, Sardaigne, Sicile, Malte.

Cette espèce est très variable; la tache noire du prothorax fait très souvent défaut; la taille, la forme du prothorax et du pygidium sont loin d'être fixées. Les exemplaires de l'île de Malte sont plus pâles et plus étroits que les individus typiques de Corse: ceux de Sardaigne, au contraire, sont plus larges et plus allongés. Le pygidium est arrondi tantôt en demi-cercle, tantôt en ogive plus ou moins étroite au sommet; souvent il est rétréci brusquement près de l'extrémité en une pointe obtuse qui le fait paraître trilobé. Dans tous les cas, ces nombreuses variations se distinguent toujours des espèces voisines par les stries des élytres très saillantes dans la plus grande partie de leur longueur, les segments supérieurs de l'abdomen, convexes, à angles latéraux appliqués, le pygidium à peu près aussi large à sa base que le segment précédent.

LAMPYRIS MUCRONATA (fig. 7.)

Oblonga, testaceo-pallescens; prothorace rotundato, punctatissimo, antice carinato, angulis posterioribus obtusis, nullo modo productis, in dimidia parte basali plaga brunnea, aurantiaco limbata, ornato; scutello fulvo, sulcato; elytris prothorace vix latioribus, pallescentibus, margine suturaque dilutioribus, rugosis, trico-stulatis; abdominis segmentorum angulis, acutis et retro productis, penultimo segmento postice valde arcuato; pygidio tectiformi in medio carinato, utrinque longitudinaliter sulcato; pectore piceo nitido; ultimo ventrali segmento, margine apicali sinuato, in medio inciso, utrinque obtuse mucronato; tarsis leviter infuscatis.

♂ Long. 12-15 mill.; larg. 4-5 mill. — Oblong, d'un

Mon. des Lampyrides. — 1884.

3

jaune testacé très pâle. Antennes aussi larges que le prothorax, à 1^{er} article épaissi au sommet, 2^e court, transversal, troisième un peu plus court que le 4^e, mais plus long que le 5^e et les 5 suivants, le 11^e allongé, terminé en une pointe obtuse. Prothorax convexe, plus large que long, arrondi et à peine rebordé en devant, à côtés latéraux arqués dès la base, d'un flave très pâle, orné sur la moitié postérieure de son disque d'une tache brune, souvent entourée d'une bordure orangée, lisse sur cette tache, grossièrement et densément ponctué sur le reste de sa surface et chargé d'une carène médiane longitudinale entre cette tache et le bord antérieur; bord basilaire presque droit; angles postérieurs fortement émoussés et nullement saillants. Ecusson flave, profondément impressionné. Elytres un peu plus larges que le prothorax, d'un flave testacé, parfois un peu rembruni, suture et marge externe plus pâles, rugueuses, chargées, outre la suture, de trois côtes n'atteignant ni la base, ni l'extrémité mais fortement saillantes dans le milieu de leur longueur, la médiane surtout; gouttière humérale très prononcée, continuée jusqu'aux deux tiers. Angles latéraux des segments supérieurs de l'abdomen aigus, divergents et saillants en arrière; bord postérieur de l'avant-dernier segment arqué en croissant; pygidium plus étroit que le segment précédent, arrondi, à côtés arqués dès la base, très légèrement sinués, tectiforme, convexe dans son milieu avec un sillon longitudinal de chaque côté. Poitrine saillante, d'un brun de poix. Segments inférieurs de l'abdomen d'un flave très pâle, à angles latéraux presque droits, le dernier entaillé ovalairement dans le milieu de son bord postérieur et muni à chacun des bords de cette échancrure d'un petit mucron lisse, saillant et obtus.

♀ Inconnue.

Environs d'Alger, Sidi-Ferruch (coll. de Marseul, la mienne).

LAMPYRIS ZENKERI Germ. Reis. Dalm. 211. t. 10 f. 1-3. — Motsch.
Et. ent. 1854. p. 17. — *Lampyrus germariensis* J. du V. II. p. 97.

Cette espèce semble, jusqu'à présent, être confinée dans l'Autriche méridionale et occidentale, où elle n'est pas bien rare : Dalmatie, Croatie, Hongrie.

LAMPYRIS CASPICA Motsch. Et. ent. 1854. p. 17. (Lampronetes.)

♂ Long. 10-11 mill.; larg. 2-2 1/2 mill. — Etroit, allongé, déprimé, un peu dilaté postérieurement; d'un jaune flave. Prothorax flave, convexe, arrondi et rebordé en devant, sensiblement rétréci en arrière, à côtés latéraux arqués, orné sur la moitié basilaire de son disque d'une tache testacée ou d'un testacé rose, grossièrement ponctué sur toute sa surface hornis sur cette tache; côté de la base presque droit; angles postérieurs droits ou légèrement obtus, émoussés, nullement saillants. Ecusson flave, triangulaire. Elytres pas plus larges que le prothorax, brunes, avec une fine bordure suturale testacée, convexes d'abord, élargies et déprimées à partir de la moitié de leur longueur, pubescentes, rugueuses, chargées de 3 côtés très saillantes qui n'atteignent ni la base ni le sommet. Angles latéraux des segments de l'abdomen presque droits, à peine saillants; les 2 avant-derniers arqués postérieurement; pygidium presque aussi large que le segment précédent, transversal, à côtés latéraux atténués au sommet en ligne courbe, bord postérieur sinué, faiblement anguleux dans son milieu; dernier segment ventral légèrement entaillé postérieurement; antennes, tarses et majeure partie des tibias le plus souvent rembrunis.

♀ Inconnue.

Cette espèce habite le littoral occidental de la mer Caspienne : Sarepta (ma coll.), la Géorgie (Motschulsky), aussi l'Anatolie (de Heyden). Elle est rare dans les collections.

LAMPYRIS BERYTENSIS Fairm. (Type ♂ ♀!) Soc. ent. Fr. 1866. p. 263. not. 1.

♂ Long. 15-16 1/2 mill.; larg. aux épaules 4 1/2-5 mill. — Oblong, élargi, d'un roux brillant. Antennes fauves, de la longueur du prothorax, à articles grêles, allongés, peu serrés, le 1^{er} fortement élargi de la base au sommet, le 2^e plus court d'un tiers que le 3^e, celui-ci subégal aux suivants, qui s'amincissent graduellement jusqu'au dernier obtusément arrondi au sommet. Prothorax aussi long que large, arrondi en devant, à côtés latéraux parallèles, rebordé, caréné sur sa moitié antérieure, orné sur sa moitié basilaire d'une tache lisse, d'un testacé orange,

couvert sur le reste de sa surface d'une ponctuation profonde et peu serrée; côté de la base droit prolongé un peu obliquement de chaque côté pour former les angles, qui sont droits, un peu émoussés et à peine saillants; en avant, près du bord antérieur, 2 taches translucides assez grandes. Ecusson roux, en triangle tronqué au sommet. Elytres brunes, bordées de testacé, oblongues, élargies, à sommet arrondi, d'abord convexes, puis déprimées dans leur moitié postérieure, rugueuses avec 3 lignes peu saillantes. Angles latéraux des segments supérieurs de l'abdomen assez fortement prolongés en arrière chez certains exemplaires, beaucoup moins chez d'autres; pygidium faiblement convexe, moins large que le segment précédent, subcordiforme, parfois légèrement sinué près de l'extrémité; dernier segment ventral à bord postérieur tronqué carrément, offrant ordinairement une petite échancrure dans son milieu.

♀ Long. 25 mill.; larg. 6 mill. — Grande, allongée, d'un jaune roux brillant. Prothorax plus long que large, à bord antérieur arrondi et redressé, les latéraux droits, légèrement atténués en avant; disque orangé, peu distinctement ponctué, bord marginal flave luisant, à ponctuation serrée et grossière surtout près des angles postérieurs, orné antérieurement de 2 larges taches translucides, oblongues; côté de la base sinué, à angles droits, émoussés. Ecusson roux, large, tronqué au sommet, presque carré. Elytres larges, ovalaires, atteignant la moitié du 1^{er} segment abdominal, fortement ponctuées-rugueuses, brunes, à bordure testacée, séparées, divariquées, élargies d'abord, plus fortement au côté interne, puis acuminées en une extrémité aiguë. Segments supérieurs de l'abdomen à bord interne faiblement arqué, en ligne droite postérieurement; angles latéraux saillants à partir du 4^e segment; pygidium en forme d'ogive; dessous du corps très luisant, une tache d'un blanc de cire bien visible sur les 2 avant-derniers segments, le dernier largement et profondément entaillé postérieurement, de sorte que son extrémité se trouve partagée en 2 lobes arrondis. Jambes robustes et longues.

Syrie : Beyrouth, mont Liban (ma coll.); Egypte : mont Hermon (coll. Bourgeois ex Letourneux).

LAMPYRIS NERVOSA Ern. Oliv. (Type !!) Soc. ent. France. 1883 p. 70'.

♂ *Elongata, angusta, parallela, fulva; prothorace fulvo, transverso, antice rotundato, lateribus parallelis, angulis posticis minimo dente extus producto munitis; elytris fuscis, tenuiter flavo marginatis, prothorace vix latioribus, parallelis, rugosis; abdominis segmentorum angulis haud retro productis, pygidio dense punctato, sensim attenuato, apice rotundato, subtilissime sinuato; ultimo ventrali segmento recte truncato.*

Long. 13-15 1/2 mill.; larg. 4-5 mill.—Étroit, allongé, parallèle, d'un jaune fauve. Antennes de la longueur du prothorax, comprimées, à 1^{er} article gros, épaissi au sommet, 2^e un tiers plus court que le 3^e, celui-ci un peu moins long que le 4^e, le 11^e pas plus long que le 10^e, à extrémité arrondie. Prothorax fauve, pas plus long que large, à côtés latéraux parallèles, arrondi et rebordé en devant, orné sur sa moitié basilaire d'une tache orangée, indistinctement ponctué sur cette tache, densément et grossièrement sur les marges latérales et la moitié antérieure qui est carénée; côté de la base droit, bordé d'une strie de gros points enfoncés; angles postérieurs droits munis d'une petite dent saillante latéralement. Ecusson triangulaire, d'un testacé brunâtre. Elytres à peine plus larges que le prothorax, allongées, parallèles, pubescentes, rugueuses, chargées de 3 lignes peu saillantes, brunes, finement bordées de testacé. Abdomen à segments supérieurs légèrement arqués latéralement, à angles droits ou obtus et nullement saillants, le pénultième arqué à son bord postérieur; pygidium plus étroit que le segment précédent, convexe, cordiforme, légèrement sinué de chaque côté près du sommet, densément et rugueusement ponctué; dessous du corps fauve luisant, ventre fortement ponctué, à dernier segment tronqué carrément (fig. 8).

♀ *Roseo-flavescens; prothorace latitudine paulo longiore, in disco macula rosea ornato; elytris obscurioribus, flavo marginatis, intus valde attenuatis in triente apicali, apice obtuso, pygidio regulariter attenuato, haud sinuato.*

Long. 16 mill. — D'un jaune rosé; antennes, palpes et

pieds d'un flave testacé ; prothorax un peu plus long que large, à côtés latéraux droits, arrondi en devant, marqué sur son disque d'une tache quadrangulaire rosée ; écusson fauve, triangulaire à sommet arrondi ; élytres rembrunies, bordées de flave, pubescentes, ponctuées, atteignant presque l'extrémité du 1^{or} segment abdominal, à épaules très saillantes, fortement atténuées à leur côté interne, à partir du tiers postérieur de leur longueur, en un angle apical obtus ; pygidium arrondi au sommet, régulièrement atténué sans sinuosités.

Syrie : Haïfa. (Coll. Reitter, de Heyden, la mienne.)

LAMPYRIS AMBIGENA J. du V. (Type!!) Glan. ent. II. p. 99.

Cette espèce est spéciale à l'île de Sicile, où on la rencontre assez communément.

LAMPYRIS BARBARA.

Oblongo elongata, flavo-rufescens; prothorace antice rotundato, crebre punctato, macula aurantiaca, duabusque translucidis plagis ornato. basi recte truncato, angulis posticis rectis. haud prominulis, margine antico erecto; scutello triangulari, flavo; elytris brunneo-testaceis, sutura margineque dilutioribus; pygidio segmento præcedenti angustiore, lateribus sinuato, apice rotundato; ventri segmentis utrinque incisus et roseo-maculatis, ultimo recte truncato.

♂ Long. 17 mill.; larg. 5 mill. — Oblong, allongé, d'un jaune roussâtre. Antennes à peu près aussi longues que le prothorax, renflées dans leur milieu, à 1^{or} article grossissant graduellement de la base au sommet, aussi long que les 2 suivantes réunis, 2^e seulement un peu plus court que le 3^e, celui-ci subégal au 4^e, dernier atténué en une pointe obtuse. Prothorax plus large que long, convexe, à bord antérieur arrondi et redressé, bords latéraux en ligne courbe presque dès la base, fauve, marqué sur la moitié postérieure de son disque d'une tache quadrangulaire orangée, densément ponctué, creusé sur la tache orangée d'un sillon longitudinal qui se prolonge sur la partie fauve en une carène peu saillante ; 2 larges taches oblongues translucides près du bord antérieur ; côté de la base droit, à angles latéraux droits, nullement

saillants. Ecusson fauve, triangulaire, à sommet arrondi. Elytres d'un testacé brunâtre, finement bordées de testacé flave, convexes, plus larges que le prothorax, allongées, parallèles, rugueuses, chargées de 3 côtes peu saillantes. Angles latéraux des segments supérieurs de l'abdomen assez prolongés en arrière, chez l'avant-dernier surtout, qui est échancré en croissant; pygidium plus étroit que le segment précédent, à côtés latéraux d'abord parallèles, puis brusquement et sinueusement acuminés en une extrémité arrondie. Bord postérieur des 6 premiers segments inférieurs entaillé de chaque côté vers le quart de sa longueur, le 6^e plus faiblement; entre cette incision et le bord latéral une tache rosée ovale qui occupe le milieu de la largeur des segments; le dernier tronqué carrément.

♀ inconnue.

Je ne possède qu'un seul exemplaire ♂ de cette belle espèce, qui se trouvait dans la collection de M. Chevrolat sous le nom de *mauritanica* Ol. : l'étiquette qu'il porte mentionne qu'il fut rapporté de Barbarie par Verreaux.

LAMPYRIS MUTABILIS.

Oblongo-elongata, pallide rufescens; prothorace flavescente, macula discoidali aurantiaca, nitida, ornato, antice rotundato, lateribus arcuatis, angulis posticis paululum prominulis; scutello rufo, triangulari; elytris fuscis, testaceo-marginatis, elongatis, tricotatis; pygidio postice attenuato, ogivali vel cordiformi, vix sinuato; ultimo ventrali segmento emarginato.

♂ Long. 13-15 mill.; larg. 3 1/2 - 4 1/2 mill. — Oblong-allongé, d'un jaune roussâtre pâle. Antennes comprimées, souvent rembrunies, épaissies dans leur milieu, à 1^{er} article plus grand que les 2 suivants réunis, les suivants diminuant graduellement de longueur, le 11^e à peine plus long que le précédent, terminé en pointe obtuse. Prothorax flave, arrondi et rebordé en devant, à côtés latéraux en ligne courbe dès la base, marqué sur la moitié postérieure de son disque d'une tache lisse quadrangulaire, orangée, densément ponctué sur le reste de sa surface, caréné antérieurement, côté de la base

coupé droit prolongé obliquement en arrière de chaque côté pour former les angles latéraux qui sont droits et assez saillants chez certains individus, beaucoup moins chez d'autres. Ecusson fauve, triangulaire. Elytres brunes, bordées de testacé, allongées, rugueuses, chargées de 3 lignes élevées bien saillantes dans le milieu de leur longueur; gouttière humérale médiocrement profonde continuée jusqu'au milieu. Segments supérieurs de l'abdomen à angles latéraux peu prolongés en arrière, l'avant-dernier échancré en arc; pygidium plus étroit que le segment précédent, cordiforme ou arrondi en ogive plus ou moins cintrée, à côtés latéraux quelquefois légèrement sinués près du sommet; dernier segment ventral légèrement entaillé dans le milieu de son bord postérieur; tarsi et tibias ordinairement rembrunis.

♀ Inconnue.

Sicile : Madonia (coll. Ragusa, de Heyden, la mienne); Algérie : Bône (ma coll.)

J'ai reçu de M. Ragusa plusieurs individus de cette espèce confondue avec le *Bonvouloiri* et l'*ambigena* dont on le distingue aisément. Elle se rapproche davantage de la *Lareyniei*, dont on peut la reconnaître assez facilement à sa forme plus large, moins allongée, à son prothorax plus court, plus arrondi, sans tache brune, à angles postérieurs plus saillants, à ses élytres plus larges, moins parallèles, au pygidium plus étroit que le segment abdominal précédent, dont les angles sont étalés, divergents, au lieu d'être appliqués, etc... Je rapporte à cette espèce plusieurs exemplaires de ma collection qui m'ont été envoyés autrefois de Bône par M. Olivier Delamarque.

Genre **LAMPORRHIZA.**

Motsch. Et. Ent. 1853, p. 47.

1. — Cinquième et sixième segments de l'abdomen ornés chacun d'une plaque flave, luisante, analogue à de la cire *splendidula* L.
Cinquième et sixième segments de l'abdomen concolores ou seulement tachés de blanc jaunâtre... 2
2. — Pygidium échancré à son bord postérieur en demi-

cercle régulier; abdomen brun, finement bordé de testacé, ayant les trois segments antérieurs bien distinctement marqués chacun latéralement de deux taches jaunâtres et le sixième orné en arrière d'une petite tache jaunâtre triangulaire. *Mulsanti* Kiesw.

Pygidium entaillé rectilinéairement à son bord postérieur, avec le fond de l'entaille tronqué ou présentant une pointe obtusément saillante; abdomen testacé, ou brun sans taches jaunâtres distinctes sur les segments antérieurs..... 3

3. — Abdomen brun finement bordé de testacé, marqué sur le sixième segment seulement d'une tache transverse d'un blanc jaunâtre *Boteldieui* J. du V.
Abdomen sans bordure testacée, concolore ou avec des taches d'un blanc jaunâtre sur les cinquième et sixième segments..... 4

4. — Abdomen entièrement testacé, avec les cinquième et sixième arceaux légèrement rembrunis.

Paulinot nov. sp.

Abdomen brun ou d'un testacé obscur, avec une tache centrale d'un blanc jaunâtre sur les cinquième et sixième arceaux..... *Delarouzei* J. du V.

LAMPORRHIZA SPLENDIDULA L. *Lampyrus splendidula* L. Syst. Nat. t. 1. p. 644. 3. — *Lampyrus Sencki* Vill. (Type !!) Soc. Ent. de Fr. 1833. p. 352. — *Lampyrus Farinesi* Villa. Cat. Col. Eur. p. 62. — *Lampyrus antiqua* Brullé. Exp. de Morée, p. 143. pl. 35. fig. 12. — *Lamporrhiza splendidula* J. du V. (Type !!) Gl. Ent. 1. p. 20. — Muls. (Type !) Mollip. 113. — (Voir la suite de la synonymie dans Mulsant Mollip. p. 114.)

France, Italie, Piémont, Toscane, Grèce, Tyrol, Styrie, Hongrie, Croatie, Alsace, Saxe et toute l'Allemagne.

Je crois que le *Lampyrus Farinesi* de Villa doit être mis en synonymie de cette espèce; tous les exemplaires que j'ai vus étiquetés de ce nom, même dans les collections allemandes, se rapportent au *splendidula* et non pas au *Delarouzei* comme le prétend M. Reitter (*Catalogus coleopterorum Europæ et Caucasi. Ed. 3. p. 113*) sur la foi de M. Baudi de Selve (*Berl. Ent. Zeit. 1871. p. 100*). Notre insecte est bien le *Lampyrus splendidula* d'Olivier, mais la fig. 1^d de la planche 1 n° 28 de l'Ento-

mologie représente une larve et non la femelle qui est figurée fig. 1^e.

LAMPORRHIZA MULSANTI Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850. p. 224.

— J. du V. (Type !!), Gl. Ent. 1. p. 16. — Muls. (Type !)
Mollip. p. 101.

Découverte dans les Pyrénées françaises par M. de Kiesenwetter, cette espèce se rencontre dans diverses autres localités de la France, dans les Basses-Alpes, à Toulouse, à Béziers, dans le département de l'Allier où elle est assez commune pendant les mois de mai et juin. La femelle émet une clarté assez vive. Les cinquième et sixième segments inférieurs de l'abdomen sont ornés dans leur milieu, le long du bord postérieur, d'une bande d'un blanc de cire non prolongée jusqu'aux côtés ; il existe en outre un point d'un blanc de cire à chaque côté des segments supérieurs de l'abdomen, le long des bords latéraux, et un autre à la base de chacune des élytres. Ces taches sont autant de foyers d'où rayonne la lumière émise par l'insecte, mais elles ne sont visibles que durant sa vie et s'effacent rapidement peu après sa mort.

LAMPORRHIZA BOIELDIEUI J. du Val (Type !) Gl. Ent. 1. p. 17 ♂ ;

ii. p. 103 ♀ ; Muls. (Type !) Mollip. p. 105.

Cette espèce est peu commune ; elle se rencontre en France dans les Hautes et Basses-Alpes et en Italie dans le Piémont.

LAMPORRHIZA DELAROUZEI J. du V. (Type ♂ ♀ !!) Gl. Ent. 1.

p. 18. — Muls. (Type !) Mollip. p. 108.

La figure donnée par Mulsant (l. c. f. 7). représente une femelle de cette espèce et non pas une larve, comme le dit à tort l'explication des planches.

France méridionale : Digne, Marseille, Sainte-Baume, Le Luc, Sain - Raphaël, Hyères.

LAMPORRHIZA PAULINOÏ (fig. 9).

Elongata, parallela, testacea, pubescens; capite oculisque nigris, his valde prominentibus; mandibulis, palpis, antennisque piceis; prothorace testaceo, rotundato, creberrime profundeque punctato, carinato, basi bisinuato, angulis prosterioribus obtusis, macula trian-

gulari nigra marginem anticum attingente, duabusque pellucidis plagis, magnis, oblongis, anticis, ornato; scutello testaceo, parvo, acutissime triangulari; elytris prothorace vix latioribus, elongatis, parallelis, fuscis, sutura margineque externo tenuissime flavo marginatis, rugulosis, tricostratis; pygidio trapeziforme inciso; subtus flavescens, duobus ultimis segmentis, tarsisque leviter infuscatis.

♂ Long. 10-13 mill.; larg. 2 1/2-3 mill. — Très allongé, étroit, parallèle, d'un roux testacé, couvert d'une courte pubescence fauve; élytres brunes avec la tranche externe et le tiers antérieur de la suture testacés. Antennes plus longues que le prothorax, testacées avec les trois premiers articles plus obscurs, le premier épaissi en massue, le deuxième plus court que le troisième; celui-ci un peu plus long que le quatrième, le dernier obconique. Tête noire ou d'un brun de poix obscur, profondément excavé entre les yeux. Prothorax plus large que long, régulièrement arrondi en devant, à bord antérieur relevé; angles postérieurs émoussés mais bien saillants en arrière; côté de la base fortement bisinué; pubescent, rugueusement ponctué, d'un jaune testacé, orné sur son disque d'une tache noire en triangle très allongé dont le sommet atteint le bord antérieur; chargé en outre dans son milieu longitudinal d'une carène aiguë saillante et bien visible dans toute sa longueur d'un bord à l'autre; en avant 2 larges taches pâles translucides, ovalaires et lisses. Ecusson testacé, petit, en triangle très aigu. Elytres rugueuses, aussi larges que le prothorax, allongées, très parallèles, à épaules saillantes, atténuées seulement à leur côté externe, à partir du huitième postérieur et terminées en une extrémité obtuse; gouttière humérale assez profonde et continuée jusqu'au milieu; chargées de trois nervures dont la médiane seule est bien marquée et visible sans interruption depuis l'épaule jusqu'au près du sommet de l'angle sutural. Poitrine, cuisses et ongles des tarses d'un roux testacé; tibias et tarses obscurs. Abdomen ponctué, d'un testacé flave avec les cinquième et sixième segments inférieurs et le dessous du pygidium parfois un peu rembrunis; segments inférieurs à bord latéral très légèrement

courbe, à bord postérieur droit; le dernier très court, étroit, prolongé dans le milieu de son bord postérieur en un lobe échancré au sommet. Segments supérieurs prolongés latéralement en une longue pointe triangulaire très aiguë. Pygidium élargi en ligne courbe jusqu'au-delà de la moitié de sa longueur, rétréci ensuite, largement échancré rectilinéairement à son extrémité avec le fond de l'échancrure en ligne droite formant un angle obtus avec les côtés, de sorte que cette entaille représente exactement la figure d'un trapèze très ouvert.

Cette espèce a été capturée en assez grand nombre aux environs de Felguiera et de Coïmbre (Portugal) par M. Paulino d'Oliveira auquel je suis heureux de la dédier comme témoignage de ma gratitude pour l'obligeance avec laquelle il a bien voulu en enrichir ma collection. Elle se distingue aisément de tous les autres *Lampyris* par la couleur de son abdomen en entier d'un testacé clair et par la forme qu'affecte l'échancrure de son pygidium. La femelle m'est inconnue.

Genre **PHOSPHEOPTERUS.**

Schaufuss. Numq. ot. 1. p. 60.

Je reproduis ici la diagnose générique donnée par M. Schaufuss (l. c.) qui n'est autre que celle du *Phosphœnus* du Genera de Lacordaire (iv. 332) modifiée pour établir les caractères distinctifs du nouveau genre.

♂ Palpes courts et très robustes; le dernier article des maxillaires très gros, subtriangulaire. Yeux petits. Antennes de la longueur de la moitié du corps, robustes, filiformes, un peu comprimées, de onze articles: 1 obconique, 2 très court, 3-10 subégaux, 11 de moitié plus long que le précédent. Prothorax aussi long que large, ogival (1), très légèrement échancré à sa base, avec les côtés rebordés et les angles postérieurs saillants. Elytres allongées jusqu'à la fin de l'avant-dernier segment de

(1) Je ne peux accepter l'appréciation de M. Schaufuss en ce qui concerne la forme antérieure du prothorax que cet auteur dit être arrondi. Dans l'exemplaire de M. de Heyden que j'ai sous les yeux, le prothorax est sensiblement atténué en ogive, comme le montre du reste le dessin ci-joint (fig. 10).

l'abdomen, un peu atténuées et arrondies à leur extrémité; *ailes complètes*. Pattes robustes; tarsi courts, à articles 1-3 décroissant graduellement, 4 non lobé, 5 en partie dégagé; crochets petits et simples. Abdomen légèrement lobé sur les côtés en arrière, article sixième pellicule. Corps allongé, subparallèle.

PHOSPÆNOPTERUS METZNERI Schauf. (Type!) Numq. ot. i. p. 61.

♂ Long. 6 mill.; larg. 2 mill. — Allongé, couvert d'une légère pubescence grise, noir en dessus, d'un brun de poix en dessous; prothorax atténué en ogive en devant (1), à côtés latéraux subparallèles dans leur moitié basilaire; côté de la base à peine sinué; angles postérieurs légèrement saillants; creusé au-devant de l'écusson d'une fossette oblongue et d'une autre ovale plus petite de chaque côté entre cette dernière et le bord latéral, chargé d'un relief lisse de chaque côté de l'écusson à la base des sillons prothoraciques; disque finement ponctué, bord marginal plus grossièrement. Ecusson tronqué au sommet. Elytres d'un noir mat, rugueuses, à gouttière humérale bien marquée et prolongée jusqu'aux deux tiers de leur longueur. Hanches, genoux et majeure partie des tibias d'un testacé pâle, ainsi que le dernier segment de l'abdomen et les angles postérieurs de l'avant-dernier. Bord postérieur du dernier segment abdominal sinué en forme d'accolade avec les angles latéraux plus saillants en arrière. Ailes brunes.

Cette rare et curieuse espèce, qui fait le passage entre les Lampyrides vrais et les Phosphænides, a été découverte à Portalegre (Portugal) au mois de juin 1867 au nombre de trois exemplaires ♂ et n'a pas, à ma connaissance, été reprise depuis cette époque. MM. de Heyden, Schaufuss et de Bonvouloir sont les heureux possesseurs de cette rareté. Le premier a bien voulu me communiquer son exemplaire pour le faire dessiner et il m'a envoyé en même temps la larve dont parle M. Schaufuss à la suite de sa description (l. c.) et qui doit vraisemblablement se rapporter à cette espèce, ayant été trouvée à côté des insectes parfaits. Cette larve est mince, étroite, d'un noir mat avec une tache d'un blanc jaunâtre à chacun des

angles postérieurs de tous ses segments; la tête est noire, brillante, armée de deux mandibules aussi longues qu'elle, testacées, minces, très aiguës, arquées en demi-cercle et se croisant au sommet; le dessous du corps est d'un noir brillant à l'exception du dernier segment ventral et des hanches qui sont d'un jaune blanchâtre; les jambes sont velues et très courtes. Long. 8 1/2 mill.

La femelle qui est encore inconnue, doit selon toutes probabilités, être aptère et pourvue seulement d'élytres rudimentaires.

DEUXIÈME TRIBU.

PHOSPHÆNIDES.

Genre PHOSPHÆNUS.

Cast. Soc. Ent. de France. 1833. p. 138.

Prothorax en ogive, élytres finement ponctuées; pygidium échancré *hemipterus* Fourc.

Prothorax en carré transversal; élytres marquées de gros points varioliques; pygidium triangulaire.

Rougeti nov. sp.

PHOSPHÆNUS HEMIPTERUS Fourc. (Voir la synonymie dans Mulsant, Mollip. p. 117.)

Var. a. *coarctatus*.

b. *flavocinctus*.

c. *brachypterus* Motsch. *Phosphænus brachypterus* Motsch.
Et. Ent. 1854. p. 23.

d. *macropterus*.

Toute la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie, la Suède; moins abondant dans les contrées méridionales, Espagne, Italie.

Les deux sexes et la larve de cette espèce ont été minutieusement décrits par Mulsant (l. c.) Le mâle seul est commun; la femelle se rencontre très rarement et manque dans presque toutes les collections. On observe chez le mâle un grand nombre de variations relativement à la couleur, à la forme, et à la longueur des élytres. Je me contente de distinguer les formes extrêmes qui se reliait, du reste, toutes entre elles par de nombreux intermédiaires.

Le type est brun avec le dernier ou les deux derniers

segments supérieurs de l'abdomen testacés, au moins sur les côtés, et les deux derniers du ventre blanchâtres; les élytres, qui atteignent à peine l'extrémité du premier segment abdominal, sont déhiscentes et régulièrement rétrécies à leur côté interne à partir de l'extrémité de l'écusson jusqu'à l'angle sutural; les jambes sont brunes, avec les tarses et les genoux moins obscurs. C'est la forme la plus généralement répandue.

Dans la variété a, les élytres parvenues à la moitié environ de leur longueur, se rétrécissent subitement à leur côté interne de toute la moitié de leur largeur et se prolongent ensuite presque parallèlement jusqu'à l'extrémité apicale, qui est largement arrondie. Cette variété se rencontre dans les mêmes localités que le type, mais paraît plus rare. Je l'ai trouvée aux environs de Moulins et de Besançon.

Je dois à l'extrême obligeance de M. de Heyden la communication d'un exemplaire provenant de Slavonie dont j'ai fait ma variété *flavocinctus*, chez laquelle les élytres sont conformées comme dans le type, mais qui s'en distingue d'une façon remarquable par la coloration des autres parties du corps. Le premier article des antennes et les sept derniers sont bruns; mais les deuxième, troisième, quatrième et cinquième sont testacés; chacun des segments supérieurs de l'abdomen est bordé latéralement d'une fine bordure d'un flave luisant qui envahit le sommet tout entier des angles postérieurs; les jambes sont entièrement d'un testacé flave.

Dans la variété c, qui est le *Phosphænus brachypterus* de Motschulsky, les élytres ne dépassent pas le métathorax et parfois même ne sont guère plus longues que l'écusson: elles offrent alors une forme ovale et sont plus ou moins déhiscentes; en même temps, le prothorax est légèrement rétréci vers les angles postérieurs et s'atténue au sommet en une ogive moins aiguë. Cette forme est rare, quoiqu'elle ait été rencontrée dans la plupart des régions habitées par le type. Saxe (de Heyden); France, aux environs de Dijon (Rouget); Russie occidentale (Motschulsky); Pologne, France (ma collection).

La variété *macropterus* paraît peu commune et je n'en

ai vu que l'unique exemplaire de ma collection provenant de Chinon (Indre-et-Loire). Sa coloration est la même que celle du type; mais les élytres, couvertes d'une longue pubescence grisâtre, dépassent le bord postérieur du troisième segment abdominal; à leur côté interne, elles sont très légèrement déhiscentes et à peine atténuées jusqu'aux trois quarts de leur longueur, puis tronquées obliquement ou plutôt rétrécies brusquement jusqu'à l'angle apical qui est aigu. Cette variété est très curieuse en ce qu'elle semble, par la longueur de ses élytres, préparer une transition avec le genre *Phosphænopterus* qui s'en distinguera toujours aisément par les ailes propres au vol dont il est muni.

La femelle, plus grande que le mâle, n'a que des moignons d'élytres soudés entre eux et avec le mésothorax. Elle ressemble à une petite femelle de *Lampyris noctiluca*, mais s'en distingue aisément au premier coup d'œil, par son corps plus luisant, son prothorax beaucoup plus atténué en avant, ses antennes plus épaisses, les segments supérieurs de l'abdomen tous fortement carénés, et enfin par ses élytres prolongées en arrière sur leur ligne médiane, à l'endroit de la soudure en un lobe commun, obtriangulaire et à angle postero-externe vif et régulièrement ouvert (fig. 11.)

Les mâles n'émettent aucune lueur distincte et on les trouve durant tout le jour, surtout par les temps humides, courant sur la terre ou sur les plantes basses. Les femelles sont médiocrement lumineuses, dit Mulsant, et ne circulent que la nuit ou de très grand matin : c'est probablement à ces habitudes nocturnes qu'est due leur grande rareté.

Je dois à l'extrême obligeance de M. Rey la communication de deux exemplaires ♀, dont l'un a été capturé à Lyon; l'autre, qui provient de Villié-Morgon (Rhône), a servi de type à l'excellente description de Mulsant, dans laquelle ce savant entomologiste réfute l'erreur où sont tombés Müller (Illig. Magaz. iv, 175) et après lui Lacordaire (Gen. iv, 332), en disant que la femelle de cette espèce ne possède pas le plus léger vestige d'élytres.

La larve se trouve sous les détritux végétaux, les amas

de fumiers ; elle est parfois, dans certaines circonstances, faiblement lumineuse. On la distingue facilement des autres larves de Lampyrides à sa couleur noire, sans taches flaves, sa forme étroite, allongée et surtout aux deux lignes saillantes dont sont munis ses trois segments thoraciques.

Je dois mentionner ici le fait curieux observé aux environs d'Elberfeld (Westphalie), par le professeur Cornélius, qui trouva sous un pot de fleurs un *Phosphænus hemipterus* mâle, accouplé avec un insecte qu'il prit pour sa femelle (Stett. Ent. Zeit. 1876, p. 46) et qui est, en réalité, un individu ♀ de petite taille du *Lampyris noctiluca*. Ce couple hétéroclite fait partie de la collection de M. de Heyden qui, avec son obligeance accoutumée, a bien voulu me l'envoyer en communication, de sorte que j'ai pu constater *de visu* l'illégitimité de cette union.

Ainsi que je l'ai déjà dit en commençant, des rapprochements de ce genre doivent avoir lieu fréquemment chez les insectes qui nous occupent. Sont-ils féconds et existe-t-il des hybrides provenant du croisement entre elles des *espèces admises* actuellement ? Je n'ose répondre par la négative tant j'ai rencontré de variabilité dans chacun des divers organes des nombreux individus qui viennent de me passer sous les yeux durant le cours de cette étude. Les Lampyres semblent être des insectes imparfaits dont les formes inachevées et pas encore fixées sont en voie de se transformer en se perfectionnant. C'est ainsi que nous voyons les femelles, souvent à peine différentes de la larve dont elles proviennent, essayer parfois de s'ajuster des élytres plus ou moins rudimentaires, d'abord réduites à une simple écaille arrondie, puis allongées au point d'atteindre les premiers segments de l'abdomen. Le *Phosphænopterus* n'est pas autre chose qu'un *Phosphænus complet et achevé* et ne venons-nous pas de surprendre, dans la variété *macropterus*, une des phases évidentes de cette transformation ? Comme on le voit, il ne manque pas, en entomologie, de points obscurs à éclaircir et le champ des découvertes reste grand ouvert à tous les observateurs patients et consciencieux.

PHOSPHÆNUS ROUGETI (fig. 12).

Oblongo-elongatus, brunneo-testaceus, glaber; capite, ore, antennis, pedibus, prothoraceque flavis, hoc duabus maculis nigris ornato; prothorace transverso, quadrato, haud convexo, liantrosursum paululum dilatato, angulis obtusis, quatuor foveolis lineis elevatis separatis munito; elytris piceis, flavo externe limbatis, sub humeris ampliatis, triangularibus, dehiscentibus, metathoracis medium vix attingentibus, apice obtusis, punctis variolosis, primo seriatim dein sparsim dispositis, ornatis; alis nullis; abdomine piceo, carinato, tertio segmento aliis latiore; ventralibus segmentis flavo limbatis, superiora excedentibus et supra conspiciuis; pygidio flavo, triangulari, apice rotundato.

Long. 9 mill.; larg. 2 mill. — Tête, antennes et toutes les parties de la bouche d'un jaune testacé, brillant; vertex ponctué, creusé d'un large sillon longitudinal; yeux noirs très petits. Antennes dépassant la moitié de la longueur des élytres, hérissées de longs poils dorés épars, de 11 articles: le 1^{er} gros, épaissi au sommet et tronqué obliquement, plus court que les deux suivants réunis; le 2^e plus étroit, cylindrique; le 3^e élargi au sommet; le 4^e cylindrique; les 5^e à 10^e subégaux et d'un quart environ moins longs que le 4^e; le 11^e terminé en une pointe obtuse; les 3 1^{ers} articles sont lisses, les autres rugueusement ponctués. Prothorax en carré transversal, peu convexe, légèrement élargi en avant, à bord antérieur droit, celui de la base entaillé dans son milieu et sinué au devant des angles postérieurs qui sont obtus et nullement saillants, les antérieurs droits, émoussés; ces derniers sont déprimés, de sorte que le bord latéral qui est droit présente une ligne convexe quand on le regarde de profil; d'un jaune brillant avec une tache brune mal limitée au milieu du côté de la base, au-dessus de l'écusson, et une autre moins large est moins foncée au milieu du bord antérieur; couvert d'une ponctuation grossière et peu serrée, plus fine et encore plus éparsée sur le disque; marqué sur son milieu de lignes en relief, figurant une H et creusé de quatre fossettes irrégulières; deux sur la ligne médiane, une à la base au-dessus de

l'écusson, et l'autre près du bord antérieur, séparées par une ligne transverse saillante, et une autre, attenant à la base, de chaque côté, entre la ligne longitudinale convexe et le bord latéral. Ecusson, étroit, triangulaire, d'un jaune testacé brillant, sillonné longitudinalement. Elytres de la longueur du prothorax et un peu plus larges que lui à sa base, atteignant à peine le milieu du métathorax, très glabres, d'un brun de poix brillant, bordées de testacé à leur côté externe; creusées de gros points varioliques disposés d'abord régulièrement sur quatre stries prolongées jusqu'au milieu, semés ensuite irrégulièrement; élargies dès la base à leur bord externe en un repli huméral embrassant le mésothorax, puis brusquement rétrécies et régulièrement atténuées jusqu'à l'extrémité (fig. 12 b.) : ce repli est exactement appliqué sur les côtés du mésothorax et n'est visible que lorsqu'on regarde l'insecte de profil; vues en dessus, les élytres sont déhiscentes, triangulaires, à sommet arrondi. Point d'ailes. Abdomen de 7 segments, d'un brun de poix, bordés de testacé, chargés sur leur milieu d'une côte obtusément saillante, bord latéral en ligne courbe, avec l'angle obtus, le postérieur légèrement arrondi; pygidium testacé, petit, étroit, triangulaire à sommet arrondi; le troisième segment, le plus large de tous. Segments inférieurs débordant largement de chaque côté les segments supérieurs correspondants, à côtés latéraux fortement arqués; la partie visible en dessus est testacée. Jambes en entier d'un flave testacé, tibias convexes extérieurement; ongles des tarsi grêles et allongés.

Je ne connais qu'un seul exemplaire de cette remarquable espèce; il appartient à M. Rouget, de Dijon, qui l'a capturé aux environs de cette ville au mois de juin 1880, et qui, avec une extrême obligeance, s'est empressé de le mettre à ma disposition pour que je puisse en donner la description. Aussi c'est pour moi un véritable plaisir de lui donner le nom de ce savant collègue, aussi habile chasseur qu'entomologiste distingué. De crainte d'endommager ce précieux insecte, je n'ai pas osé le décoller et n'ai pu examiner les parties du dessous du corps et m'assurer de son sexe; mais, à en juger par la lon-

gueur et la grosseur de l'abdomen et la gracilité des antennes, j'ai tout lieu de croire que ce doit être une femelle. Quant au mâle, il peut être aptère comme chez le *Ph. hemipterus*, ou ailé comme chez les *Lampyris*. Sa découverte est un but des plus intéressants offert aux recherches des explorateurs. Par la forme du prothorax, celle du dernier segment abdominal, la grandeur et la position du repli huméral des élytres, la ténuité des tarsi et des antennes, cet insecte s'éloigne notablement des caractères du genre *Phosphænus* (Lacé. Gén. iv. 332), et j'ai eu d'abord l'intention d'établir sur lui une nouvelle coupe générique sous le nom de *Pseudo-phosphænus*. Mais la création d'un genre sur un seul individu, surtout quand il est certain que le sexe inconnu en diffère sensiblement, me semble inadmissible, et je trouve que cette espèce doit être réunie aux *Phosphænus* jusqu'au jour où la découverte d'un nombre suffisant d'exemplaires des deux sexes viendra justifier d'une façon irréfutable et peut-être même exiger sa séparation.

TROISIÈME TRIBU.

LUCIOLIDES

♂ Angles postérieurs du prothorax parfois un peu plus saillants en arrière que le milieu du côté de la base, mais n'étant pas prolongés en une oreillette ou dent triangulaire; ♀ aptères et munies d'élytres très courtes recouvrant tout au plus le quart de l'abdomen. *Lampyroïdea*.

♂ Angles postérieurs du prothorax prolongés en arrière en une sorte d'oreillette ou dent triangulaire; les deux sexes ailés et munis d'élytres recouvrant entièrement l'abdomen. *Luciola*.

Genre LAMPYROIDEA

Costa Soc. ent. Fr. 1875. Bull. CLXIX.

Ce nouveau genre a été proposé par M. Costa (l. c.) pour le *Lampyroïdea syriaca* découvert en Syrie. Il est exactement intermédiaire entre les *Lampyris* et les *Luciola* et est suffisamment justifié par les caractères précités. J'y fais entrer toutes les espèces de Lucioles,

chez lesquelles les angles postérieurs du prothorax ne sont pas prolongés en une sorte d'oreillette plus ou moins saillante en arrière. Les femelles ne sont pas toutes connues, mais, à en juger par analogie, elles doivent, chez les espèces dont les mâles sont ainsi conformés, être aptères et pourvues seulement d'élytres rudimentaires. Les insectes qui composent ce genre sont de moyenne grandeur et paraissent jusqu'à présent propres à l'Asie mineure, la Syrie et les îles de l'Archipel.

1. — Prothorax sensiblement élargi en avant 2
 Prothorax à côtés parallèles ou arrondis, mais n'étant pas sensiblement atténué en avant. 4
2. — Prothorax obscur sur la majeure partie de sa surface ; élytres brunes sans bordure testacée.
 nigrescens nov. sp.
 Prothorax entièrement testacé ou légèrement taché de noir sur son disque ; élytres testacées ou brunes, bordées de testacé 3
3. — Prothorax largement marginé à côtés s'arrondissant en devant ; élytres brunes, bordées de roux testacé.
 lucifera Reiche.
 Prothorax à marges très étroites, à angles antérieurs obtus, mais bien dessinés ; élytres d'un gris fauve à bordure plus claire. *maculithorax* Gemm.
4. — Prothorax arrondi dès la base. *dispar* Fairm.
 Prothorax en ligne droite latéralement. 5
5. — Prothorax largement marginé, taille grande ; élytres bordées de jaune orangé. *syriaca* Costa.
 Prothorax non marginé, taille petite ; élytres obscures, sans bordure jaune, *græca* Cast.

LAMPYROIDEA NIGRESCENS (fig. 13).

Angustissima, parallela, fusca; capite nigro; antennis brunneis, pilosis; prothorace infuscato, testaceo limbato, antice dilatato, angulis rotundatis; elytris obscuris, pubescentibus, rugosis; pectore pedibusque testaceis; tarsis fuscis; abdomine nigro, duobus ultimis segmentis cereis.

♂ Long. 5 1/2 mill.; larg. 1 1/2 mill. — Allongé, très étroit, parallèle ; yeux médiocrement gros ; tête noire,

ponctuée, sillonnée ; antennes aussi longues que la moitié du corps, pubescentes, d'un brun de poix ; prothorax obscur, largement bordé de testacé sur les côtés et étroitement en avant et à la base ; sensiblement élargi en avant, en ligne droite latéralement ; angles antérieurs fortement arrondis, les postérieurs légèrement obtus, presque droits ; bord antérieur un peu arqué en avant, côté de la base droit, grossièrement ponctué sur sa surface. Ecusson ponctué, brun, à sommet arrondi. Elytres un peu plus larges que le prothorax, brunes, très allongées, parallèles, pubescentes, rugueuses, à gouttière humérale, bien marquée et prolongée presque jusqu'à l'extrémité. Poitrine testacée, ainsi que les jambes ; tarses rembrunis. Abdomen noir, les deux derniers segments d'un blanc de cire. ♀ Inconnue.

Syrie. — Coll. Ancey, la mienne.

LAMPYROIDEA LUCIFERA Reiche. *Luciola lucifer* Reiche (Type!)

Soc. ent. Fr. 1857. 169 ♂.

Syrie, Ile de Chypre. — Coll. Bourgeois, la mienne.

Le prothorax, un peu anguleusement avancé, est largement marginé sur tout son pourtour et marqué d'une tache brune sur la partie antérieure de son disque ; l'écusson est flave, les élytres sont bordées de testacé, très étroitement sur la suture, un peu plus largement au bord externe et à l'angle apical ; la poitrine est testacée ; l'abdomen gris avec le dernier segment seulement d'un blanc de cire (fig. 18).

LAMPYROIDEA MACULITHORAX Gemming. *Luciola maculithorax*.

Gemming. Coll. Heft. vi. 1870. ♂. — *Luciola maculicollis* Muls.

Mém. Ac. Lyon, n. 1852. p. 3 ♂.

Syrie, Kaifa, Ile de Chypre. — Ma collection (fig. 14).

Le nom donné à cette espèce par Mulsant, bien que plus ancien que celui de Gemminger, doit être mis en synonymie, Castelnau ayant déjà décrit, en 1833, une *Luciola maculicollis*, de l'Amérique du Nord.

LAMPYROIDEA DISPAR Fairm. *Luciola dispar* Fairm. (Type!!)

Soc. ent. Fr. 1857. 739. ♂ ♀.

Beïkos (Bosphore). — Coll. Fairmaire, von Heyden, la mienne (fig. 15).

LAMPYROIDEA SYRIACA Costa (Type ♂ ♀ !!) Soc. ent. Fr. 1875.
Bull. CLXIX ♂ ♀.

Syrie : Ramleh, Kaifa, Antioche. — Coll. Bourgeois, Costa, de Marseille, la mienne (fig. 17).

LAMPYROIDEA GRÆCA Cast. *Luciola græca* Cast. (Type!!) Soc. ent. Fr. 1833. 147. www.libtool.com.cn

Ile de Naxos. — Ma collect. (fig. 16).

Cette espèce a été décrite par Castelnau sur un individu mâle rapporté par Olivier. La femelle existait également dans la collection de l'auteur de l'Entomologie; elle échappa à Castelnau; en voici la description :

Long. 7 mill. — Oblong, allongé, en entier d'un jaune testacé. Yeux petits; tête noire, grossièrement ponctuée, creusée sur le vertex d'un léger sillon. Antennes testacées, pubescentes, les 3 premiers articles épais, trapus, les autres diminuant graduellement de grosseur. Prothorax d'un testacé orangé, convexe, transverse, à côtés latéraux arqués, à angles arrondis, grossièrement ponctué, sillonné, marqué d'une tache noire sur la moitié antérieure de son disque; bord antérieur tronqué carrément, le basilaire légèrement sinué près des angles. Ecusson flave, triangulaire, arrondi au sommet. Elytres atteignant l'extrémité du 1^{er} segment abdominal, pubescentes, rugueuses, d'un brun testacé, bordées à leur côte externe et sur la moitié de la suture de testacé plus clair, divariquées à leur côte interne à partir de la moitié de leur longueur, et largement arrondies à leur extrémité. Segments supérieurs de l'abdomen tous carénés. Parties inférieures et jambes d'un jaune testacé, dernier segment ventral échancré.

Le *L. græca* ♀ se distingue aisément du *syriaca* ♀ par sa taille moindre, sa tête grossièrement ponctuée, au lieu d'être presque lisse, et creusée d'une impression en forme de fer à cheval, ses élytres à sommet arrondi et écartées seulement à partir du milieu de leur longueur, au lieu d'être divariquées dès leur base et acuminées en une extrémité aiguë.

Genre LUCIOLA.

Cast. Soc. ent. Fr. 1833. p. 335.

- | | |
|--|---|
| 1. — Elytres bordées de testacé | 2 |
| Elytres noires, sans bordure testacée..... | 3 |

2. — Taille grande (12 mill.); deux derniers segments de l'abdomen d'un blanc de cire, ornés en outre le long de leur bord antérieur d'une tache translucide en forme de croissant, d'un jaune orangé; prothorax creusé latéralement d'une impression oblongue.

www.libtool.com.cn judatca nov. sp.

Taille petite (6-8 1/2 mill.); deux derniers segments de l'abdomen d'un blanc de cire, sans tache orangée; prothorax convexe sans impressions latérales. *italica* L.

3. — Corps convexe; élytres très noires, élargies en s'arrondissant à leur côté externe; prothorax en trapèze, rétréci en avant; quatrième segment de l'abdomen légèrement sinué le long de son bord postérieur.

mingrelica Mén.

Corps peu convexe; élytres d'un brun noirâtre, allongées, parallèles; prothorax à côtés latéraux arrondis dès la base; 4^e segment de l'abdomen non sinué.

lusitanica Charp.

LUCIOLA JUDAICA (fig. 19).

Oblongo-elongata, flavo-aurantiaca; capite nigro, antennis, palpisque piceis; prothorace rugoso-punctato, in disco macula magna nigricante ornato, lateribus rectis, antice rotundato, basi utrinque sinuato, angulis posticis acutis, prominentibus, utrinque ad marginem lateralem impressione oblonga notato; scutello flavo; elytris fuscis, tenuissime flavo marginatis; pectore luteo; abdomine rufescente, quarto segmento nigro, duobus ultimis cereis macula aurantiaca ornatis; pedibus flavis, tarsis infuscatis.

♂ Long. 12 mill.; larg. 4 mill. — Oblong, allongé, d'un jaune orangé; tête noire, palpes et antennes d'un brun jaunâtre, les deux premiers articles d'un jaune pâle. Prothorax transversal, convexe, grossièrement ponctué, d'un orangé flave, marqué sur son disque d'une large tache noirâtre qui couvre souvent la plus grande partie de sa surface; côtés en ligne droite, bord antérieur un peu anguleusement avancé au milieu, le basilaire sinué près des angles latéraux qui sont aigus et assez longuement prolongés en arrière; de chaque côté, le long du bord latéral, une impression oblongue assez profonde.

Ecusson d'un jaune orangé, ponctué, triangulaire, à sommet arrondi. Elytres à peine plus larges que le prothorax, d'un brun légèrement roussâtre, finement bordées de testacé, rugueuses, marquées de légères lignes saillantes, ordinairement interrompues, mais dont quelques-unes sont parfois bien distinctes. Poitrine flave; abdomen roussâtre, le quatrième segment noir; les deux derniers d'un blanc de cire, ornés en outre d'une tache orangée, en forme de croissant, attenant au bord antérieur. Tarses et base des tibias rembrunis.

♀ Inconnue.

Syrie. — (Ma collect.)

Cette espèce se reconnaît aisément à la forme de son prothorax et à la coloration des divers segments de l'abdomen.

LUCIOLA ITALICA L. — *Lampyris italica* L. Syst. nat. 1. 2, p. 645.
— Charp. Hor. ent. p. 192. t. vi. fig. 5 ♂; 6 ♀ — Oliv. Ent. II. 28. pl. 2. fig. 12, b, c. — *Luciola italica* Cast. Soc. ent. Fr. 1833. p. 147.

Italie, Sicile, Grèce, Turquie (fig. 20).

Cette espèce est très variable et offre une foule de variétés. Chez les individus typiques, les élytres sont bordées de testacé sur la suture et la marge externe, le prothorax est orné dans son milieu d'une tache noire qui n'atteint ni le bord antérieur, ni le postérieur. Les femelles sont toujours beaucoup plus grosses que les mâles, trapues et élargies en arrière; elles ressemblent aux femelles du *Luciola lusitanica*, dont on le reconnaît aisément à leur taille bien moindre. On peut distinguer les variétés suivantes qui se trouvent dans les mêmes localités que le type et ont été élevées au rang d'espèces par certains auteurs.

Var. *illyrica* Motsch. — *Luciola illyrica* Motsch. Et. ent. 1854. p. 54.

Tache noire du prothorax élargie et adossée au bord antérieur.

Var. *suturalis* Motsch. — *Luciola suturalis* Motsch. Et. ent. 1854. p. 55.

Tache noire du prothorax prolongée postérieurement en deux lignes élargies vers la base.

Mon. de Lampyrides. — 1884

Var. *pedemontana* Motsch. — *Luciola pedemontana* Motsch. Et. ent. 1854. p. 55.

Bordure des élytres très peu marquée; tache du prothorax souvent à peine distincte.

Var. *minuta* Motsch. — *Luciola minuta* Motsch. Et. ent. 1854. p. 51.

Bordure des élytres nulle, tache du prothorax nulle. La *L. obtusangula* de Motschulsky (l. c. p. 52) me semble devoir être rapportée à cette variété.

La fig. 12 d, de l'Entomologie d'Olivier, représente une larve et non une femelle.

LUCIOLA MINGRELICA Mén. — *Luctola mingrelica* Mén. Cat. rais. 1832. p. 161. — Mann. Dej. cat. éd. 3. p. 116. — *Luciola mehadiensis* Fald. Fn. transc. I. 1835. p. 185. — Motsch. Et. ent. 1854. p. 50.

Var. *caucasica* Mots. — *Luciola caucasica* Mots. Et. ent. 1854. p. 50. Hongrie méridionale, Mingrélie, Caucase.

Le mâle de cette espèce se distingue aisément de celui du *lusitanica* aux caractères cités précédemment; le principal consiste dans la forme des élytres qui sont ovales, élargies, au lieu d'être allongées, parallèles. Les femelles se ressemblent beaucoup plus; celles du *mingrelica* sont encore plus convexes et plus élargies postérieurement.

La *L. caucasica* n'est qu'une simple variété de taille un peu moindre, comme le dit, du reste, l'auteur russe lui-même, à la suite de sa description. Auparavant, il avait mentionné le *Colophotia mingrelica* de Mannerheim comme synonyme de *Luciola lusitanica* de Charpentier, ce qui ne l'empêche pas de décrire immédiatement comme espèce la *Luciola mingrelica* Mann. C'est là un exemple du désordre et de la confusion qui se retrouvent dans tous les écrits de cet entomologiste, dont les descriptions, ce qui concerne les Lampyrides spécialement, sont par trop élémentaires.

LUCIOLA LUSITANICA Charp. — *Lampyris lusitanica* Charp. Hor. ent. p. 194. t. vi. fig. 4. — *Luciola lusitanica* Muls. Mollip. p. 125. — *Lampyris italica* Fabr. Syst. ent. p. 202. 12. — Oliv. Ent. t. II. 28. pl. 2. fig. 12 a. — *Luciola* var. *mentonensis* Perag. Soc. ent. Fr. 1863. p. 665. — *Luciola collaris* Motsch. Et. ent. 1854. p. 51.

Var. minor.

France méridionale : Nice, Hyères, Grasse ; Corse ; Sardaigne ; Espagne ; Portugal ; toute l'Italie : Crissolo (Bourgeois), mont Viso (von Heyden) ; Autriche méridionale ; Turquie ; Russie du sud et Caucase.

M. Peragallo a donné sur cette espèce et ses mœurs des détails intéressants (l. c.). Il raconte ce fait monstrueux qu'il a observé maintes fois : des mâles de *Rhagonycha melanura* accouplés avec des Lucioles mâles. Il établit une variété *mentonensis* sur des individus qui diffèrent du type par la couleur rougeâtre de leur corselet en dessus et en dessous. C'est là cependant la coloration normale et je n'ai jamais vu le prothorax noir ou obscur dans sa partie inférieure. J'ai reçu de M. Paulino d'Oliveira plusieurs individus de cette espèce, provenant des environs de Lisbonne, qui sont remarquables par leur petite taille et surtout par la couleur d'un brun roussâtre des élytres ; c'est une variété intéressante que je crois devoir distinguer sous le nom de *minor*.

Quant au *L. collaris* Motsch., qui a le corselet presque en demi-cercle, à angles postérieurs moins saillants que chez *L. mehadiensis*, les élytres plus parallèles, la forme plus allongée, plus étroite et moins convexe, il doit, sans hésitation, être rapporté au *lusitanica*, auquel tous ces caractères s'appliquent exactement.

APPENDICE

LAMPYRIS BRUTIA Costa (Type ♂ ♀ !!) Atti dell. R. Acad. di Nap. IX. 1881. pl. 6. fig. 48 ♀.

L'impression de ce travail était déjà commencée quand j'ai reçu de M. Costa, directeur du Musée zoologique de Naples, plusieurs exemplaires ♂ et ♀ du *Lampyris*, qu'il a décrit sous le nom de *brutia*.

C'est une excellente espèce qui doit prendre place entre le *soror* Schaum. et le *Lareyniei* J. du V. Elle se distingue du premier par le prothorax beaucoup moins rebordé, surtout en devant, les angles postérieurs des segments de l'abdomen moins saillants ; du second par le prothorax bien plus convexe et moins atténué en avant,

le pygidium tout autrement conformé et plus étroit à sa base que le segment précédent; des deux par les stries des élytres beaucoup moins saillantes, et les taches ovales obscures que l'on remarque sur les segments du ventre. Ce dernier caractère la rapprocherait du *barbara* dont elle s'écarte par sa petite taille et son prothorax taché de noir.

♂ Long. 10-11 mill. — Prothorax d'un blanc jaunâtre, marqué en devant de deux taches translucides étroites, avec le disque orné sur sa moitié postérieure d'une tache d'un brun testacé, médiocrement rebordé, très convexe, chargé antérieurement d'une ligne faiblement saillante; angles postérieurs aigus, légèrement saillants. Ecusson testacé, étroit, arrondi au sommet. Elytres d'un brun cendré avec la suture et la marge latérale testacées. Poitrine et jambes d'un brun jaunâtre. Angles des segments supérieurs de l'abdomen émoussés et à peine prolongés en arrière; pygidium plus étroit que le segment précédent, convexe, cordiforme, sinué latéralement. Cinq premiers segments du ventre testacés avec une tache ovale, obscure de chaque côté à la base, les autres de couleur plus pâle, le dernier largement, mais peu profondément échancré dans le milieu de son bord postérieur.

♀ Prothorax aussi long que large, arrondi en avant, légèrement convexe, très densément ponctué, muni d'une fine carène longitudinale. Ecusson tronqué au sommet. Elytres élargies dans leur tiers antérieur, puis rétrécies à leur côté interne, sinueusement et obliquement de dedans en dehors, atteignent le milieu du premier segment de l'abdomen, terminées en une extrémité aiguë; segments supérieurs de l'abdomen finement carénés sur leur milieu longitudinal. Pygidium arrondi. Brun en dessus avec la bordure du prothorax, des élytres et de tous les segments abdominaux, d'un brun jaunâtre, parfois plus ou moins rosé; brun en dessous avec les côtés rosés, les trois derniers segments d'un jaune de soufre. Jambes d'un testacé brunâtre. Chez quelques individus, le milieu de la partie postérieure du disque est un peu déprimé, mais la carène se continue au fond de cette impression.

Cette espèce, la plus petite du genre, a été capturée en grand nombre en Calabre (Italie mérid.), au mois de juillet, par M. Costa, principalement aux environs de Ciro et de San Giovanninfiore. J'y rapporte un exemplaire ♂ unique de ma collection, provenant de Grèce (mont Olympe).

SPECIES INVISÆ

LAMPYRIS BICARINATA Muls. Op. ent. xi. p. 120. — Mollip. p. 150.
Corse.

Il m'a été impossible de voir cette espèce qui n'existe pas dans la collection de M. Mulsant. Elle a été prise au nombre de deux ou trois exemplaires aux environs de Bocognano, au col de la Focce (Corse) par M. Reveillère, qui m'écrit qu'il n'en avait point conservé et qu'il n'en a jamais repris depuis. D'après la description, le dernier segment ventral serait trilobé; il est probable que ce caractère anormal était purement accidentel et que cette espèce doit être rapportée au *Lareyniei* qui se rencontre très communément dans les montagnes de l'intérieur de la Corse.

LAMPYRIS BRULLEI Reiche, Soc. ent. Fr. 1863. p. 129. — *Lampyrus Zenkeri* Brullé, Expéd. Morée, III. p. 143.
Grèce.

LAMPYRIS SIBIRICA Gebl. Bull. Moscou, 1847. p. 429.
Sibérie.

LAMPYRIS ANGUSTATA Motsch. Et. ent. 1854. p. 17.
Caucase.

LAMPYRIS COSTALIS Motsch. l. c. p. 20.
Arménie.

LAMPYRIS LIMBATA Motsch. l. c. p. 21.
Géorgie russe.

LAMPYRIS BREVICOLLIS Motsch. l. c. p. 21.
Géorgie russe.

LAMPYRIS THORACICA Motsch. l. c. p. 22.
Nord de la Sibérie orientale.

LAMPYRIS OBSCURELLA Motsch. l. c. p. 22.
Sibérie orientale.

Ces cinq dernières espèces, à en juger par la description succincte de l'auteur, ne présentent entr'elles que de très légères variations et me semblent devoir être rapportées au *L. noctiluca* que l'on trouve dans toute la Sibérie jusque dans la région de l'Amour.

LAMPORRHIZA MORIO Baudi, Soc. ent. Ital. vii. 1875. p. 35. —

Ab. 1. 18. p. 35.

Etrurie.

Je n'ai pu obtenir la communication des types de M. Baudi. Les auteurs du *Catalogus coleopterorum Europæ et Caucasi* (3^e édit. p. 113), ne paraissent pas mieux fixés que moi sur la valeur de cette espèce qu'ils placent à la fois et parmi les *Lampyris* et parmi les *Lamprorrhiza*.

LAMPORRHIZA FOLIACEA Baudi, Berl. Ent. Zeits. 1871. p. 99.

Sardaigne.

Espèce certainement très rare, établie sur un seul exemplaire mâle rapporté par Gené. MM. Reveillère et Damry, qui ont chassé durant de longues années en Corse et en Sardaigne, n'y ont jamais trouvé de représentants du genre *Lamprorrhiza*.

LAMPORRHIZA GERMARI Kuster, Käf. Eur. 1. 17. — J. du V. Gl. ent. 1. 22.

Dalmatie.

LUCIOLA PONTICA Motsch. Et. ent. 1854. p. 55.

Mingrélie.

Espèce que je n'ai jamais eue sous les yeux, mais qui est facile à reconnaître à son écusson noir et à son corselet rose avec une large bande longitudinale noire au milieu.

CATALOGUE DES LAMPYRIDES

DE LA FAUNE EUROPÉENNE ET CIRCAMÉDITERRANÉENNE

Les noms des espèces dont les femelles sont encore inconnues sont précédés d'un astérisque.

www.inboon.com.cn

LAMPYRIDES VRAIS

I. PELANIA Muls.

- 1 mauritanica L. F^o Esp. Afr^a.
 scutellata Fairm. Tunisie.
 v obtusa Fairm. Maroc, Alg.
 *2 angustipennis Ern. Oliv. Alg.

II. LAMPYRIS Geoffr.

(Nyctophila Ern. Oliv.)

- 1 Libani Cast. Syrie.
 insignis Ancey ♂ nec ♀ »
 2 Reichei J. du V. Eur^a. Alg.
 v Bonvouloiri J. du V. Sicile.
 v hispanica Ern. Oliv. Esp. Port.
 3 syriaca Baudi Syrie.
 4 maculicollis Fairm. »
 *5 incisa Ern. Oliv. Anat. Casp.
 *6 caucasica Motsch. Cauc.
 *7 Heydeni Ern. Oliv. Baléares.
 8 molesta J. du V. Italie^a.

(Lampyrus Auct.)

- 9 attenuata Fairm. Tun. Alg^a.
 10 depressuscula Mots. Géorg. russe.
 11 orientalis Fald. Caucase.
 12 noctiluca L. Eur. Cauc. Sib. Am. Alg^a.
 longipennis Motsch. Pyr.
 v Bellieri Reiche Fr^a. Port. Esp.
 13 soror Schaum. Etr. Dalm. It.
 algerica Ancey Alg^a.
 14 brutia Costa Ital. Grèce.
 15 Lareyniei J. du V. Corse, Sard. Malte,
 [Sicile].
 *16 mucronata Ern. Oliv. Alg^a.
 17 Zenkeri Germ. Autriche.
 18 membranacea Mots. Géorg. russe.
 19 Raymondii Muls. Europ^a. Syrie.
 v Letourneuxi Ern. Oliv. Egypte.
 *20 caspica Motsch. Casp.
 21 berytensis Fairm. Syr.
 *22 barbara Ern. Oliv. Alg^a.
 *23 mutabilis Ern. Oliv. Sic. Alg^a.
 24 nervosa Ern. Oliv. Syr.
 25 ambigena J. du V. Sic.

III. LAMPYRORHIZA Motsch.

- 1 splendida L. Europe.
 Farinesi Villa. Lombardie.
 2 Delarouzei J. du V. Fr^a.
 3 Boieldieu J. du V. Fr^a. Ital.
 4 Mulsanti Kiesw. Fr. cent. et sud.
 *5 Paulinoi Ern. Oliv. Esp. Port.

IV. PHOSPHENOPTERUS Schauf.

- *4 Metzneri Schauf. Port.

PHOSPHÆNIDES

I. PHOSPHÆNUS Cast.

- 1 hemipterus Geoffr. Europe.
 v coarctatus Ern. Oliv. Fr.
 v flavocinctus Ern. Oliv. Allem.
 v brachypterus Mots. Europe.
 v macropterus Ern. Oliv. Fr. cent.
 2 Rougeti Ern. Oliv. France.

LUCIOLIDES

I. LAMPYROIDEA Costa.


- *1 nigrescens Ern. Oliv. Syrie.
 *2 lucifera Reiche »
 *3 maculithorax Gemm. »
 maculicollis Muls.
 4 dispar Fairm. Bosphore.
 5 syriaca Costa Syrie.
 6 græca Cast. Naxos.

II. LUCIOLA Cast.

- *1 judaica Ern. Oliv. Syrie.
 2 italica L. Europe^a.
 v illyrica Motsch. »
 v suturalis Motsch. »
 v pedemontana Motsch. »
 v minuta Motsch. »
 v obtusangula Motsch. »
 3 mingrellica Mén. Austr^a. Cauc.
 mehadiensis Fald. Cauc.
 v caucasica Mots. »
 4 lusitanica Charp. Eur^a. Cauc.
 collaris Motsch. Russ^a.
 v minor Ern. Oliv. Port.


EXPLICATION DES FIGURES

- www.libtool.com.cn
- Fig. 1 *Pelania mauritanica* ♂.
2 *Pelania angustipennis* ♂.
3 *Nyctophila molesta* ♂. (*Pygidium vu en dessous et bord postérieur du dernier segment ventral.*)
4 *Nyctophila Heydeni* ♂. (*Prothorax.*)
5 *Lampyris attenuata* ♂; 5^a prothorax; 5^b élytre droite.
6 *Lampyris orientalis* ♂. (*Pygidium vu en dessous.*)
7 *Lampyris mucronata* ♂. (*Pygidium vu en dessous et bord postérieur du dernier segment ventral.*)
8 *Lampyris nervosa* ♂. (*Prothorax.*)
8 bis. *Lampyris ambigena* ♂. (*Prothorax.*)
8 ter. *Lampyris mutabilis* ♂. (*Prothorax.*)
9 *Lamprorhiza Paulinoi* ♂. (*Pygidium vu en dessous.*)
10 *Phosphænopterus Metzneri* ♂.
11 *Phosphænus hemipterus* ♀. (*Prothorax, antennes, élytres.*)
12 *Phosphænus Rougeti* ♀. — 12^b élytre (*la partie ombrée figure le repli huméral.*)
13 *Lampyroïdea nigrescens* ♂.
14 *Lampyroïdea muculithorax* ♂. (*Prothorax.*)
15 *Lampyroïdea dispar* ♂. (*Prothorax.*)
16 *Lampyroïdea græca* ♂. (*Prothorax.*) — 16^b ♀. (*Tête, prothorax et élytres.*)
17 *Lampyroïdea syriaca* ♂. (*Prothorax.*) — 16^b ♀. (*Tête, prothorax et élytres.*)
18 *Lampyroïdea lucifera* ♂. (*Prothorax.*)
19 *Luciola judaïca* ♂. (*Prothorax.*)
20 *Luciola italica* ♂. (*Prothorax.*)
-



H. du Buysson, et Foyade, des.

www.libtool.com.cn



in figura 12 de,

www.libtool.com.cn

NOTES COMPLÉMENTAIRES

A L'ESSAI SUR LES LAMPYRIDES

Par Ernest OLIVIER

NYCTOPHILA MOLESTA J. du V. — J'ai fait entrer dans la division *Nyctophila* les *Lampyris*, dont le dernier segment ventral est prolongé dans le milieu de son bord postérieur en un lobe linéaire, arrondi ou triangulaire. Ce caractère m'ayant paru constant et se retrouvant également sur des espèces exotiques, je crois avantageux d'adopter définitivement cette dénomination pour une nouvelle coupe générique, ayant pour type le *Lampyris Reichei* de Jacquelin du Val. Les *L. conspicua* Gyll., *fuscipennis* Guér. et plusieurs espèces encore inédites de ma collection provenant de l'Afrique australe et orientale, doivent entrer dans ce genre.

Le *N. molesta* fait le passage entre les deux genres. Le dernier segment ventral, au lieu d'être prolongé comme chez le *Reichei* en une pointe linéaire ou triangulaire, présente un lobe arrondi, large et court, et médiocrement saillant au-delà des côtés qui avancent davantage que dans la plupart des autres espèces. Ce lobe est souvent réduit chez certains individus à une légère protubérance et parfois même devient presque nul. Le mâle a été décrit et bien caractérisé par Jacquelin du Val (loc. cit.); la femelle est encore inédite. Cette dernière ressemble à celle du *Raymondi*. Elle en diffère surtout par son écusson grossièrement ponctué et fortement rétréci d'avant en arrière en un triangle à sommet obtusément arrondi, tandis que chez le *Raymondi* il est légèrement pointillé et très peu rétréci d'avant en arrière, de sorte qu'il est plus large à son extrémité qu'il n'est long sur son milieu. Les moignons élytraux sont très variables; ils sont ordinairement très courts et ne

dépassent généralement pas ou très peu le mésothorax ; ils sont fortement écartés, d'abord dilatés-arrondis à leur côté interne, puis plus ou moins rapidement rétrécis en une extrémité aiguë.

LAMPYRIS ATTENUATA Fairm. — En décrivant le mâle de cette espèce, j'ai omis de mentionner les caractères importants qui suivent : tous les tibias, surtout les postérieurs et les intermédiaires sont fortement arqués en dedans ; les fémurs postérieurs sont grêles et longs et dépassent latéralement le bord marginal des élytres. J'ai reçu plusieurs exemplaires de cet insecte capturés par M. Lataste, durant le cours de cet été, dans le sud de la Tunisie, où il paraît assez répandu. M. Valery Mayet m'en a communiqué également deux mâles et deux femelles, qu'il a trouvés accouplés dans l'île de Djerba sur un tronc caverneux d'olivier.

LAMPYRIS ZENKERI Germ. — Se trouve aussi en Italie.

LAMPORRHIZA MULSANTI Kiesw. — Cette espèce a été abondante cette année, en juin, dans les environs de Moulins. A la fin de ce mois, les femelles déposent sur les mousses et les feuilles des plantes basses, un nombre d'œufs variable d'après leur taille. Ces œufs sont d'un blond doré, ronds, de la grosseur d'un grain de millet. La fin du mois de juin est aussi l'époque de l'apparition des premiers *L. noctiluca* et il m'est arrivé fréquemment de capturer des mâles de cette espèce à côté d'une femelle de *Lamprorrhiza* ; mais je n'ai jamais pu constater d'accouplement qu'entre les *L. Mulsanti*.

LAMPORRHIZA FARINESI Villa. — Cette espèce a été décrite d'abord dans l'*Alterum supplementum coleopterorum Europæ, 1838, p. 62*, puis dans les *Actes de la société Italienne des sciences naturelles, vol. XI, 1868*. Cette seconde description est suivie d'une note dans laquelle l'auteur dit que son espèce ne doit pas être confondue avec le *L. splendidula*, que le premier individu qu'il en ait vu provenait des Pyrénées et que depuis il en a rencontré d'autres en Lombardie. La courte

diagnose qu'il en donne est, du reste, complètement insuffisante et ne permet en aucune façon de reconnaître avec certitude l'insecte, qui, à en juger par la provenance pyrénéenne indiquée, doit être le *L. Mulsanti*.

LAMPYRIDES PAULINOLI Ern. Oliv. — J'ai reçu plusieurs mâles de cette espèce, des environs de Hurdes (Espagne).

PHOSPHÆNOPTERUS METZNERI Schauf. — La larve de la collection de Heyden, qui, suivant toutes les probabilités, doit être rapportée à cette espèce, porte une seule carène longitudinale sur le dos des trois segments thoraciques; ceux de l'abdomen, au contraire, sont creusés d'un sillon longitudinal médian. Elle diffère donc de celle des *Phosphænus hemipterus*, dont elle a les dimensions, par ses taches orangées et la carène unique des segments thoraciques.

PHOSPHÆNUS HEMIPTERUS Fourcr. — D'après M. Gorham, cet insecte semble manquer en Angleterre. Je ne l'ai jamais capturé la nuit et n'ai pu constater moi-même sa phosphorescence; mais M. Rouget m'écrit qu'il a observé plusieurs fois des mâles émettant une clarté très distincte. La larve que l'on rencontre surtout dans les premiers jours d'octobre est lumineuse par intermittence; mais la lueur qu'elle émet est de peu d'intensité.

PHOSPHÆNUS ROUGETI Ern. Oliv. — Le 1^{er} juin de cette année (1884), M. Lancelevée a capturé deux exemplaires de cette rare espèce, accrochés à une tige de graminée (*Brachypodium*), sur les coteaux d'Orival, près Elbeuf. Il a bien voulu me communiquer l'un des deux que j'ai reconnu identique à l'exemplaire que j'ai décrit, sauf quelques légères modifications individuelles. Ainsi, sur l'insecte d'Orival, les reliefs du prothorax sont moins nets et les taches de ce même organe à peine marquées, les élytres dépassent légèrement la base du métathorax, les stries de points varioliques sont, à la base, au nombre de six ou sept, séparées par des intervalles saillants et costiformes, le repli huméral est moins prononcé. Il est

acquis maintenant que cet insecte n'appartient pas au genre *Phosphænus* et ne doit même pas faire partie de la famille des Lampyrides. On ne peut, toutefois, pas lui assigner avec certitude la place qu'il doit occuper, puisque l'un des sexes est encore inconnu ; mais après l'examen approfondi des exemplaires que j'ai eus sous les yeux, je crois que, jusqu'à nouvel ordre, on peut les considérer comme les femelles d'une espèce voisine de l'*Homalisus suturalis*. L'avenir, qui nous réserve la découverte du mâle, nous dira si cette opinion est erronée.

Moulins, 15 octobre 1884.

PRÉCIS DES GENRES & ESPÈCES

DE LA TRIBU

DES SILPHIDES DE L'ANCIEN-MONDE

Les SILPHIDES constituent la tribu la plus importante des Clavicornes ; ils comprennent, d'un côté, des très grands insectes, tels que les Silphes et les Nécrophores, si connus par leurs formes variées, leurs mœurs et leurs habitudes, vivant au grand jour et chassant leur proie, dont ils nous débarrassent ; de l'autre, une foule de petits insectes aux habitudes cachées, peuplant les grottes pratiquées par la Nature : monde souterrain hier encore inconnu, et que des explorations multipliées à l'envi ont découvert, surtout en France.

Le nombre de ces derniers est si considérable qu'il serait nécessaire qu'un spécialiste, tel que M. Abeille de Perrin, nous en donnât une bonne monographie ; mais très peu de ces cavernes disséminées en Europe, même en France, ayant été explorées, et, au dire de nos plus habiles, chacune ayant pour ainsi dire son espèce propre, le groupe déjà si nombreux devra s'étendre encore ; il serait prématuré d'entreprendre une étude sérieuse sur ce sujet. Cependant, on nous a donné une statistique des grottes de France (M. Lucante), un catalogue de leurs habitants (MM. Bedel et Simon), tout récent et déjà incomplet ; les espèces de France ont été publiées çà et là par La Brûlerie, MM. Abeille de Perrin, de Saulcy, etc., dans toutes sortes de Revues plus ou moins savantes, et ont soulevé des critiques et des discussions, dont le résultat était plus utilitaire que scientifique (MM. Schaufuss, Reitter) ; les espèces d'Italie (M. Baudi), celles d'Espagne (M. de Uhagon), celles de Hongrie (MM. Schmidt,

Frivaldsky), etc., etc, restent inaperçues dans des recueils divers écrits en italien, en espagnol, en allemand, en hongrois, etc.

Nous pardonnera-t-on d'avoir réuni, en un corps complet, la liste des espèces connues jusqu'à ce jour, avec les descriptions originales, et dans l'ordre qui nous a semblé plus généralement suivi.

Quant aux *Catops*, *Colon*, etc., frères terrestres des ermites souterrains, amis de l'ombre et du silence, nous avons sous la main des travaux estimés, des monographies même fort utiles; mais pourquoi, nous autres Français légers, nous contentant de notre idiome, sommes-nous peu curieux de l'anglais, qui résonne dans tous les coins de l'univers, et encore moins de l'allemand, cette langue si riche, si claire et si harmonieuse, qui nous cache tant de trésors scientifiques ou autres. Quel est celui de nos entomologistes qui pourra se servir des *Catopsides* de Murray, des *Colons* du Dr Kraatz? Nos lecteurs les consulteront facilement dans notre reproduction, revue, corrigée et augmentée.

Enfin, croyant que des insectes grands et connus, comme les Silphes et Nécrophores, ne laissaient lieu à aucune difficulté et qu'il n'y avait qu'un résumé clair et pratique à donner, nous les avons abordés tout joyeux et persuadé que la tâche était presque sans labour. Mais nous avons trouvé la plus jolie des confusions, distribution des genres, espèces et synonymies des espèces, tout dans le vague et l'incertitude. En face de ce chaos, nous nous sommes efforcé d'esquisser un travail comprenant un tableau synoptique des genres et sous-genres, des descriptions originales des espèces, leur synonymie, une synopse de celles qui nous sont connues en nature.

Tels sont, en quelques mots, le plan et le but que nous avons suivis dans ce modeste travail. Puisse-t-il être utile, c'est là notre seule ambition.

TRIBU DES SILPHIDES

Antennes de 10-11 articles, graduellement épaissies ou terminées par des articles plus grands, rarement subfiliformes. Parapleures du métathorax libres. Abdomen de 6 segments. Hanches antérieures cylindroconiques sortant des cavités cotyloïdes. Hanches postérieures rapprochées l'une de l'autre, rarement écartées. Trochanters appuyants. Cuisses postérieures dépourvues de coulisse pour recevoir les jambes. Tarses de 5 articles, articles simples au moins aux postérieurs; tarses antérieurs quelquefois de 4 articles.

Tableau synoptique des genres.

A. Yeux nuls.

B. Ecusson distinct, triangulaire.

C. Prothorax plus long que large.

D. Hanches postérieures écartées l'une de l'autre.

PHOLEUON Hampe.

D'. Hanches postérieures presque contiguës.

ORYOTUS Milr.

C'. Prothorax plus large que long.

D. Corps convexe. Dernier article des palpes maxillaires beaucoup plus court que le pénultième, conique ou subuliforme.

E. Corps ovale allongé. Prothorax dilaté-arrondi au milieu, de là rétréci par devant. Elytres plus larges à la base que le prothorax, leur bord latéral réfléchi. Mésosternum caréné.

DRIMEOTUS Milr.

E'. Corps ovale. Prothorax ayant sa plus grande largeur à la base, qui est aussi large que celle des élytres et lui est étroitement jointe.

BATHYSCLIA Schiøedt.

E''. Corps ovale. Prothorax ayant sa plus grande largeur à la base, qui est plus étroite que celle des élytres, ses angles postérieurs impressionnés avec le rebord réfléchi. Mésosternum caréné, la carène élargie en avant en une petite dent.

SPELEOCHLAMYS Dieck.

D'. Corps déprimé. Menton muni au bord postérieur d'angles spiniformes prolongés par derrière.

E. Antennes courtes, massue ovale serrée, reçue dans un article cupuliforme, logée dans une gouttière dorsale du prothorax. Elytres laissant à découvert les 5 derniers segments de l'abdomen.

www.libtool.com PLATYPSYLLA Ritzema.

E'. Antennes longues, grêles, peu épaissies vers l'extrémité, logées sous le prothorax. Elytres couvrant l'abdomen.

LEPTINUS Mulr.

B'. Ecusson non visible. Antennes presque aussi longues que le corps. Elytres ovales, gonflées, soudées à la suture. Hanches postérieures écartées l'une de l'autre.

LEPTODERUS Schmidt.

A'. Yeux distincts.

B. Antennes de 11 articles, épaissies graduellement, ou terminées par 3-5 articles plus grands.

C. Dernier article des palpes maxillaires plus petit que le pénultième, conique.

D. Antennes plus ou moins menues, les 5 derniers articles épaissis, 8° plus petit que 7° et 9°.

CATOPS Payk.

D'. Antennes comprimées, peu épaissies vers l'extrémité; 8° article égal à chacun de ceux qui le touchent.

CATOPSIMORPHUS Aubé.

D''. Antennes assez courtes, en massue, 8° article plus grand que le 7°.

COLON Herbst.

C'. Dernier article des palpes maxillaires peu différent du pénultième, ovale ou cylindrique.

D. Antennes épaissies peu à peu distinctement avec les 3 articles terminaux plus grands.

E. Stigmate prothoracique visible. Elytres subparallèles, tronquées à l'extrémité.

NECRODES Leach.

E'. Stigmate prothoracique non visible. Elytres subarrondies à l'extrémité.

SILPHA L.

D'. Antennes filiformes ou avec 5 articles terminaux distinctement plus grands.

E. Jambes garnies de poils raides au bord externe.

F. Prothorax fortement rétréci par derrière.

PTEROLOMA Gyl.

F'. Prothorax ayant sa plus grande largeur par derrière, rétréci par devant.

NECROPHILUS Latr.

E'. Jambes garnies de fines épines au bord externe.

AGYRTES Frœhl.

B'. Antennes de 10 articles apparents, terminées par une très grande massue de 4 articles perfoliés.

NECROPHORUS F.

www.libtool.com.cn

LEPTODERIDÆ.

M. Elzéar Abeille de Perrin s'étant occupé de ce groupe avec le plus grand soin et l'ayant enrichi de plusieurs espèces françaises, y a établi des genres et des sous-genres, qui nous semblent y apporter une grande clarté. Nous reproduisons, pour nos lecteurs, le tableau synoptique qu'il en a donné dans ces derniers temps.

Tableau synoptique des Leptodérides.

- A. Elytres à bords latéraux convexes et à repli nullement visible par dessus.
- B. Ecusson peu visible, en réalité très court et s'étendant tout le long de la base du prothorax.
- C. Elytres glabres. 1. LEPTODIRUS Schmidt.
- C'. Elytres velues. S.-g. PROPUS Ab. Per.
- B'. Ecusson normal.
- C. Elytres de la longueur du corps. Prothorax subcylindrique et étranglé. 2. ANTROCHARIS Ab. Per.
- C'. Elytres plus longues que le corps. Prothorax subplan et peu resserré avant la base.
- S.-g. DIAPRYSIUS Ab. Per.
- A'. Elytres à bords au moins en partie tranchants et visibles par dessus.
- B. Tarses antérieurs 4-articulés ♂. 3. ORYOTUS Milr.
- B'. Tarses antérieurs 5-articulés ♂.
- C. Repli des élytres mince. Avant-derniers articles antennaires brusquement renflés à leur sommet.
5. PHOLEUON Hampe.
- C'. Repli des élytres très large. Avant-derniers articles des antennes renflés de la base au sommet.
6. DRIMEOTUS Milr.
- Prothorax à bords, surtout postérieurement, tout à fait tranchants, translucides, relevés et séparés du disque par un sillon ou une dépression longitudinale.

- A. Pattes et antennes d'une longueur démesurée. Elytres entièrement arrondies à l'extrémité. CYTODROMUS Ab. Per.
 A'. Elytres très acuminées et divariquées au bout.

7. SPELÆOCHLAMYS Dieck.

- I — LEPTODERUS** (λεπτός, *menu*; δερή, *cou*). Schmidt, Illyr. Blat. 1832. 3°. — Sturm. Deuts. Ins. xx. 1849. p. 93. pl. 376. f. a. — *Stagobius* Schiœdt. Dansk. Vidensk. 1849. p. 15. pl. 4.

Pas d'yeux. Antennes de 11 articles, presque de la longueur du corps, le 7^e et les 3 derniers renflés un peu au bout. Mandibules bidentées à l'extrémité, avec le bord interne garni de soies serrées. Mâchoires avec un crochet corné à l'extrémité du lobe interne. Palpes maxillaires filiformes, dernier article menu et de moitié plus court que le pénultième, en pointe. Menton transverse, rétréci par devant, bord postérieur droit. Languette profondément incisée, barbue. Palpes labiaux de 3 articles, filiformes. Tarses ♂ de 5 articles, antérieurs ♀ de 4 seulement. Tête allongée, rétrécie peu à peu par derrière. Prothorax plus de 2 fois aussi long que large, cylindrique, un peu étranglé postérieurement. Ecusson nul. Elytres ovales ou oblongues, soudées à la suture, fortement convexes. Hanches postérieures écartées l'une de l'autre.

Vivent dans les grottes de Carniole.

1. LEPTODERUS (1) HOHENWARTI Schmidt. Illyr. Vochenb. 1832. n° 3. p. 9. — Sturm. Deuts. Ins. xx. 1849. 97. pl. 376. Kbevenb. Vien. Zool. Bot. i. p. 105. Jacq. Duv. Gen. Col. pl. 38. f. 190. — *Troglodytes* Schiœdt. Fn. subt. 1849. 15. pl. 1. f. 1. — Long. 8; larg. 3,5 mill. — Grottes de Carniole, Zavinka, Adelsberg et d'Istrie.

Tête et prothorax étroits, brun de poix, lisses et très luisants, celui-ci cylindrique, un peu étranglé au delà du milieu; élytres grandes, en ovale large, renflées, d'un

(1) *Leptodirus* est aussi régulièrement formé que *Leptoderus*, car les Hellènes disent δερή, aussi bien que δειρή; mais si Schmidt lui-même a préféré le deuxième (et il a dit en 1832 *Leptoderus angustatus, sericeus*), pourquoi forcer les écrivains de nos jours à suivre la première orthographe. D'ailleurs, n'est-ce pas une rectification tout à fait insignifiante! Il n'en serait pas de même s'il s'agissait de corrections fort gênantes comme ces changements de noms, maintenant en vogue en Allemagne, où, sous prétexte de rendre à

brun marron clair, transparentes comme le verre, lisses, mais un peu moins luisantes que la tête et le prothorax. Antennes et pattes longues, grêles et d'un brun-marron jaunâtre clair, comme les palpes; luisantes. Poils des antennes d'un jaune rougeâtre.

v. LEPTODERUS SCHMIDTI Mots. Et. V. 1856. 35*. — Grottes de Treffen, Carniole, Laibach.

Forme plus convexe que celle du *Hohenwarthi* et près du double plus grand; prothorax plus allongé; élytres plus distinctement ponctuées et plus obtuses postérieurement.

Ce n'est qu'une variété de grande taille de l'*Hohenwarthi*, selon M. Ab. de Perrin.

2. LEPTODERUS ANGUSTATUS Schmidt Laib. Zeit. 1852. n° 146. Stat. Zeit. 1852. 380. — Sturm. Deuts. Ins. xxii. 83* pl. 406. — Long. 5-6 mill. — Carniole, Grotte de Voleja Jama.

Brun-marron, lisse, très luisant. Tête baissée, brun-marron, luisante, sans trace d'yeux, avec quelques points épars, surtout vers la bouche, dont les parties sont rouge-brun clair. Antennes très longues et déliées, brun-rouge clair, les derniers articles d'un brun jaune, 7, 9 et 10 épaissis au bout, dernier au milieu, tous, surtout le dernier, garnis de poils jaune-rougeâtre écartés. Prothorax un peu plus long que la tête, de même couleur, ayant sa

chacun son droit, on remplace souvent à la légère des noms répandus par d'autres soi-disant antérieurs, publiés par de vieux auteurs ignorés. On va même jusqu'à rétablir un nom abandonné par l'auteur lui-même, comme fautif, par exemple, au lieu des noms du *Systema Eleutheratorum* de Fabricius, noms qui sont l'expression des dernières idées de cet auteur, on revient à ceux de ses ouvrages plus anciens : c'est absolument comme si on ne voulait pas tenir compte des *errata* après l'impression.

Un genre de corrections dont personne ne parle, sans doute parce qu'elle est moins gênante, tend à s'établir : c'est celle d'ajouter un *h* aux dérivés des mots commençant par une voyelle aspirée, telle que *Haltica* pour *Altica*. Ce puritanisme n'est pas toujours sans danger; en grec bien des mots sont aspirés ou non, l'esprit rude n'a pas toujours été admis, l'usage fréquent l'a parfois fait négliger; dans la dérivation, il n'est pas toujours admis; il est remplacé souvent par un autre signe que l'*H*. Nous recommanderons donc ici un peu de prudence si l'on ne veut pas s'exposer à se corriger de ses corrections intempestives. D'ailleurs il est fort ennuyant de chercher beaucoup de mots sous deux rubriques différentes.

plus grande largeur au milieu, fortement échancré sur les côtés de là jusqu'à la base, de sorte que la partie postérieure est considérablement plus étroite et également étranglée. Surface de la tête et du prothorax lisse, très luisante, vue au microscope, très finement aciculée, et parsemée de plus gros points. Elytres en ovale allongé, convexes, étranglées aux épaules, un peu déprimées dans la région scutellaire, fortement acuminées par derrière et arrondies au bout séparément, marron clair ou brun rouge, très luisantes, paraissant polies; à la loupe, on y aperçoit des aciculations et des points fins. Dessous, avec la coloration, l'éclat et la transparence du dessus. Pattes très longues, déliées, de la couleur des élytres. Tarses plus brun-jaune, ongles longs et pointus; pubescence d'un jaune-rougeâtre clair. — ♂ Tarses antérieurs de 5 articles, dont le 1^{er} grand, cordiforme comme les suivants qui vont en diminuant. — ♀ Un peu plus grand, avec les élytres plus ventruées, les tarses antérieurs de 4 articles, d'égale épaisseur, le 1^{er} aussi long que les 2 suivants ensemble; article ongulaire de la longueur du 1^{er}. — Se distingue du *Hohemoarti* par sa taille plus petite, ses élytres bien plus étroites et son prothorax plus large.

3. LEPTODERUS SERICEUS Schmidt. Laib. Zeit. 1852. n° 146. Stet. Zeit. 1852. 382. — Sturm. Deuts. Ins. xxii. p. 86*. pl. 247. — Long. 4,6 - 5,6 mill. — Basse-Carniole, Grottes de Cuba dol. — Mazern, Mooswald, God. Jama.

Facile à reconnaître de l'*angustatus* par une forme toute autre, les élytres densément ponctuées, pubescentes et une taille moindre. Tête abaissée, plus courte et sans trace d'yeux; front lisse entre les antennes, avec quelques points écartés, plus densément ponctué vers la bouche, chaque point muni d'un poil fin; parties de la bouche plus claires, plus jaune-rougeâtre. Antennes très longues et grêles, différent de celles des deux autres espèces, 2^e article aussi long que le 3^e, 8^e le plus menu, 9 et 10 peu épaissis au bout, apical plus épais, aussi long que les deux précédents ensemble, les 4 derniers articles jaune-rougeâtre, les autres brun-rouge, tous garnis de poils, les articles les plus clairs cependant garnis de poils jaunes plus serrés. Prothorax aussi long et aussi

large que la tête, presque cylindrique, court, peu rétrécie après le milieu, lisse et luisant, dessus à points écartés, munis d'un poil court. Au microscope, la tête et le prothorax paraissent garnis comme d'un réseau de mailles. Elytres laissant à découvert la pointe de l'abdomen, convexes, ovales, étranglées aux épaules, en pointe obtuse et arrondie par derrière, brun-rougeâtre, à peine plus claires que la tête et le prothorax, luisantes, transparentes, à points assez forts et serrés, munis d'un petit poil jaune, soyeux, luisant, ce qui rend la surface terne. Dessous densément et finement ponctué, très finement pubescent. Pattes très longues et grêles, de la couleur du corps, tarses jaune-rougeâtre clair, pubescents de même couleur. — ♂ Tarses antérieurs de 5 articles, 1^{er} un peu épaissi. ♀ d'un quart plus grand que ♂, à élytres plus ventruées, articles des antennes un peu plus courts, antérieurs de 4 articles égaux.

II — ANTROCHARIS (άντρον, *antre* ; χαίρω, *aimer*) Ab. Per.
Toul. Soc. Hist. nat. 1878. Sépar. 11*.

Antennes à 2^e article tout au plus de la longueur du suivant, au lieu d'être sensiblement plus long. Elytres allongées, ovales, très convexes ; repli à bord supérieur nullement tranchant et nullement visible par dessus ; vu par côté, ce repli est peu large, il a sa plus grande largeur tout à fait à la base et va en décroissant de la base au sommet, au lieu d'être renflé peu à peu de la base au tiers antérieur et aminci des 2/3 à l'extrémité. Du reste, tous les caractères des *Pholeuon*.

Ce genre, par son repli nullement visible par dessus, s'éloigne de tous les autres Silphides aveugles, et se rapproche des *Leptoderus*, dont il se distingue nettement par la forme de son écusson. Les proportions des antennes et la forme du repli le séparent des *Pholeuon*. Ils sont tous Français, tandis que ceux-ci sont étrangers à la France.

M. Abeille de Perrin avait d'abord publié ce genre sous le nom de *Antrodietus*, qu'il a dû changer à cause d'un genre d'*Arachnides*, connu sous ce nom.

1. **ANTROCHARIS QUERILHACI** Lespès, An. Sc. nat. 4^e sér. VII. 5^e. 1858. pl. 17. f. 16 et 10. (*Pholeuon*). Fairm. Fr. soc. Ent. 1859. 31^e. 13. pl. 1. f. 1. — Long. 3,5 mill. — Grottes de Bèdeilhac, Niaux, Lombrive et Sabart, près de Tarascon (Ariège.)

Ferrugineux ou brun, corps entièrement pubescent. Tête allongée, yeux nuls. Antennes filiformes, insérées dans une fossette latérale de la tête, 7^e article et 3 derniers épaissis, 8^e petit. Prothorax arrondi en avant, rétréci en arrière, angles postérieurs droits. Ecusson très petit, triangulaire. Elytres ovales, arrondies postérieurement. Ailes nulles. Pattes allongées; tarsi simples, antérieurs de 5 articles ♂, de 4 ♀, intermédiaires et postérieurs de 5.

S'éloigne pour la forme des *Leptoderus* et ressemble entièrement aux *Pholeuon*, mais le 1^{er} article des antennes est un peu plus long que le 2^e, ce qui n'existe pas chez les vrais *Pholeuon*, non plus que chez les *Drimæotus*. Ce seul caractère ne suffit pas pour le séparer du 1^{er} genre.

2. **ANTROCHARIS DISPAR** Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878. Sépar. 12^e. — Long. 3,2 mill. — Ariège, grottes de Fonsaint, Lherm et Crampagna.

Rouge testacé, pubescent, allongé, très convexe. Antennes très allongées, un peu plus ♂ que ♀. Prothorax pointillé guilloché, aussi long que large, fortement échancré de chaque côté au-dessus du milieu. Elytres très convexes, modérément allongées, arrondies ensemble au sommet, un peu arrondies chacune à la suture, fortement ridées transversalement. Pattes allongées.

Très voisin du *Querilhaci* Lespès et confondu avec lui, il en diffère par ses antennes sensiblement plus longues, surtout sur leurs derniers articles, un peu plus longues ♂ que ♀.

3. **ANTROCHARIS MESTREI** Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878. Sépar. 12^e. — Long. 4 mill. — Grottes de l'Homme-Mort, près Puissert (Ariège), et de Nebias (Aude).

Rouge testacé, allongé, pubescent. Tête assez large, mais à museau étroit et allongé. Antennes dépassant la moitié du corps, à articles allongés. Prothorax moins large à la base que long, convexe, à côtés assez fortement

échancrés avant la base, bien arrondis au sommet, ponctué très dru. Elytres trois fois longues comme le prothorax, ayant leur plus grande largeur un peu après le milieu, fortement rétrécies au sommet, qui n'est pas arrondi, comme chez le *dispar*, ni prolongé comme chez le *caudatissima*, fortement ridées transversalement. Tarses antérieurs de 5 articles ♂, avec les deux premiers élargis d'une façon tout à fait anormale et n'ayant de similaire que dans l'*Oryotus Schmidtii*.

Rappelle par ses élytres ridées les *Querilhaci* et *dispar*, il en diffère à première vue par sa grande taille, ses élytres acuminées et surtout la dilatation incroyable des tarses ♂.

4. ANTROCHARIS CAUDATA Ab. Per. Fr. Soc. Ent. 214. (*Pholeuon*)
2*. — Long. 3 ; larg. 1 mill. — Grotte de Vallon (Ardèche).

Roux assez clair, très brillant, pubescent. Tête à peine plus longue de la base au labre que large entre les antennes, à ponctuation très éparsse, convexe, à dernier article des palpes large et court. Antennes n'atteignant pas l'extrémité du corps. Prothorax aussi large à la base que long, à côtés à peine arrondis vers le sommet, peu échancrés avant la base, à angles postérieurs un peu moins ouverts que l'angle droit, convexe, à ponctuation très éparsse, base droite. Elytres 3 fois plus longues que le prothorax, moins de 2 fois aussi larges dans leur plus grande largeur que la base du prothorax, à épaules nulles, s'élargissant médiocrement jusqu'aux 2/5^{es} antérieurs, rétrécies de là au sommet, très acuminées et prolongés à leur extrémité, où elles sont arrondies séparément, couvertes d'une ponctuation moins fine et moins espacée que celle du prothorax, mais ne formant sous aucun jour des rides transversales. Pattes relativement courtes, jambes antérieures arquées, les autres presque droites. — ♂ Antennes atteignant l'extrémité du corps ; tarses antérieurs de 5 articles, les 2 premiers assez fortement, le 3^e moins et le 4^e à peine renflés.

Distinct par sa taille très petite, par son prolongement caudal, par son aspect très brillant dû à la ponctuation espacée, par la brièveté de la tête et le prothorax presque carré.

5. **ANTROCHARIS CAUDATISSIMA** Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878.
Sépar. 13°. — Long. 2,8 mill. — Grotte de Vallon (Ardèche).

Roux, brillant, pubescent. Tête assez large. Prothorax aussi large à la base que long, convexe, à côtés peu échancrés vers la base, peu arrondis au sommet, ponctué très éparsément. Elytres 3 1/2 fois longues comme le prothorax, étroites, ayant leur plus grande largeur près de la base, rétrécies de là au sommet, très acuminées et très fortement prolongées au-delà de l'abdomen, arrondies séparément au bout, ponctuées plus dru que le prothorax, nullement ridées. Tarses antérieurs à 2 premiers articles fortement élargis ♂.

Se distingue à première vue du *caudata* par sa forme très allongée, aussi allongée ♀, que *caudata* ♂, ses élytres très prolongées postérieurement et les tarses antérieurs ♂ deux fois plus larges que ceux du *caudata*. Les autres espèces se distinguent par leurs élytres ridées, leur prothorax plus ou moins cordiforme, etc.

III — ORYOTUS (ὄρυσσω, creuser) Miller, Vien. Zool. Bot. Ver. 1856. vi. p. 627.

Antennes de 11 articles, très longs et grêles, les 5 derniers articles épaissis vers l'extrémité, 8^e cependant un peu plus étroit que le précédent et les 3 suivants. Labre très légèrement sinué. Mandibules 4-dentées au bout, les 2 dents intermédiaires très petites. Lobe maxillaire externe pubescent en-dessus, interne muni au bout d'un petit crochet; palpes maxillaires de 4 articles, le dernier subuliforme. Menton profondément échancré en-devant, palpes labiaux de 3 articles. Pattes longues et grêles, tarses antérieurs de 4 articles dans les 2 sexes, intermédiaires et postérieurs de 5; les 2 premiers articles des tarses antérieurs dilatés ♂. — Ce nouveau Troglodyte, de forme allongée et étroite comme le *Catops augustatus*, fait, avec le *Pholeuon augusticolle*, découvert en Hongrie, à l'extérieur aussi bien que dans la forme des parties de la bouche, particulièrement les mandibules dentées au bout et ensuite les tarses antérieurs de 4 articles, un passage complet entre les genres *Catops*, *Bathyscia* et *Leptoderus*. Ce dernier genre doit faire

un groupe particulier dans la famille du *Silphides*, et ne présente pas d'étroite affinité avec les *Anisotomides* ou les *Scydmaenides*, mais est en relation plus intime avec les *Bathyscia*.

1. ORYOTUS SCHMIDTI Millr. Vien. Zool. Bot. Ver. 1856. p. 627*.
pl. vi. f. 1. — Long. 3,4 mill. — Grotte de Voleja jama (Carniole).

Allongé, étroit, très légèrement convexe, jaune-ferrugineux uniforme, vêtu d'une pubescence jaune, serrée, luisante. Antennes presque de la longueur du corps, de 11 articles, 1 renflé, les suivants longs, étroits, 7^e et les trois derniers un peu plus épais que les précédents, dernier en pointe obtuse. Prothorax très finement et densément ponctué, de chaque côté un peu au-dessus du milieu, avec une impression profonde ponctiforme, un peu plus long que large, arrondi sur les côtés, profondément sinué au-dessous du milieu, légèrement échancré en arc par derrière, angles postérieurs allongés, pointus. Elytres marquées de rides transverses très fines, irrégulières et indistinctes, près de trois fois aussi longues que le prothorax, un peu plus larges à la base que celui-ci, légèrement arrondies sur les côtés, graduellement rétrécies vers la pointe, dépassant l'abdomen. Pattes longues et grêles; tarsi antérieurs ♂ avec les deux premiers articles dilatés, le 1^{er} aussi long que les 3 suivants ensemble, 2^e de moitié plus étroit que le 1^{er} et de la longueur du 3^e.

IV — CYTODROMUS (*κύτος*, cavité; *δρομάς*, qui court)

Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878. — Sépar. 11*.

Corps peu convexe. Tête large et courte. Antennes très minces et très longues, 2^e article un peu plus long que le 3^e. Palpes maxillaires à dernier article très court et triangulaire, pointu. Prothorax large, non rétréci à la base, à peine convexe, profondément creusé de chaque côté d'une gouttière qui fait paraître les bords comme transparents. Ecusson médiocre, triangulaire. Elytres ovales, dépassant de beaucoup l'abdomen, nullement en pointe au sommet; repli à bord supérieur très tranchant et visible presque jusqu'au sommet, très large aux épaules et décroissant très rapidement de là aux deux tiers. Pattes très allongées.

Diffère des *Pholeuon* par la forme du repli. La sculpture du prothorax l'éloigne considérablement de tous les autres genres, excepté du genre *Spelæochlamys*, qui est trapu, a les antennes et les pattes courtes et dont le repli ne décroît pas rapidement au-dessous des épaules.

1. CYTODROMUS DAPSOIDES Ab. Per. Fr. Soc. ent. 1875. CLXXX*.
— Long. 3,8 ; larg. 1,8 mill. — Grotte du plateau des Lantes (Drôme).

Fauve, large, moins convexe, couvert d'une pubescence fine et uniforme. Tête assez courte, vertex peu convexe, obsolètement fovéolé, punctuation fine et serrée avec des points plus forts et écartés. Antennes assez écartées, n'atteignant pas tout à fait l'extrémité des élytres; minces, à articles allongés, 1^{er} beaucoup plus robuste que les autres, renflé au sommet, 2^e à peu près aussi long, moins épais, arqué, 3^e un peu plus court, aussi minces que les suivants qui sont subégaux, 7^e et 9^e un peu plus longs et plus épaissis à l'extrémité, les deux derniers plus courts et épaissis de même. Prothorax peu convexe, un peu plus large à la base que long, insensiblement rétréci dans le bas, se rétrécissant à partir du milieu en courbe peu marquée, vers le devant, angles de devant arrondis, postérieurs aigus et fortement prolongés en arrière; côtés bordés dans leur tiers postérieur d'une profonde gouttière, translucide, à rebord élevé; au milieu on aperçoit une dépression longitudinale réduite parfois à une fossette obsolète; punctuation fine et serrée. Ecusson grand et pointu, angulaire. Elytres larges et peu convexes, 2 1/3 fois plus longues que le prothorax, un peu plus larges que lui à la base, très peu élargies au milieu; angle huméral bien accusé, arrondi; rebord net et tranchant, visible en dessus dans toute la longueur de l'élytre, épipleures larges à la base, diminuant progressivement, nulles aux 4/5; strie suturale profonde et bien marquée jusqu'au bout; quelques autres stries rudimentaires; toute la surface couverte de points très petits et très serrés, formant d'imperceptibles rides transverses et produisant un aspect mat et soyeux; sommet régulièrement arrondi. Dessous sculpté comme les élytres. Hanches antérieures contiguës,

intermédiaires séparées par un mince intervalle, postérieures un peu davantage. Trochanters armés d'une petite épine courte, robuste et un peu arquée. Pattes très allongées; tarsi antérieurs courts et de 4 articles, les autres très allongés, de 5 articles.

V — PHOLEUON (*φωλέω*, se cacher dans une grotte) Hampe, Vien. Zool. Bot. Ver. 1856. VI. p. 463.

Palpes maxillaires à dernier article sécuriforme. Antennes de 11 articles, à peine épaissies vers l'extrémité, articles allongés, les 4 derniers plus courts que les autres. Yeux nuls. Ecusson triangulaire. Pro-, méso- et métasternum carénés. Hanches postérieures écartées. Tarsi postérieurs de 5 articles, antérieurs de 4 ♀.

1. PHOLEUON PLUTO Reitr. Deuts. Ins. Zeits. 1881. 214. 27*. — Long. 5-6 mill. — Croatie : grotte du mont Velebit.

La plus grande espèce du genre. Forme du *leptoderum*, mais plus grand, même coloration et même pubescence. Antennes presque de la longueur du corps; tous les articles, à l'exception du 1^{er} qui est plus court et plus épais, presque d'égale longueur et de même ténuité; le pénultième non raccourci, seulement très indistinctement épaissi en nœud à l'extrémité. Tête un peu plus étroite que le prothorax, plus longue que large, densément ponctuée, ainsi que celui-ci, parfois indistinctement ponctuée. Prothorax presque carré, très peu plus long que large, légèrement sinué sur les côtés au devant des angles postérieurs qui sont aigus, presque pointus; bord basal bisinué, angles antérieurs arrondis et un peu rabattus. Ecusson très petit, triangulaire. Elytres en ovale long, quatre fois aussi longues que le prothorax, dilatées-arrondies avant et au milieu, terminées en pointe comme dans les *Antrocharis* ou quelques *Mastigus*, convexes légèrement en dessus, plus fortement vers le bout, ponctuées densément et finement, mais bien plus distinctement que le pronotum, suture insensiblement élevée en toit vers la pointe; bord latéral très étroitement rabattu, près des épaules assez largement et assez fortement réfléchi. Pattes très menues et longues, jambes avec de fines

épines terminales; tarses longs, de 5 articles, ongles grêles, simples.

Diffère de toutes les espèces de Hongrie et des Balkans, par les antennes extraordinairement longues, dont les pénultièmes articles ne sont pas plus courts (s'éloignant aussi par là des *Antrocharis* des Pyrénées), et les élytres acuminées, enfin par le corps bien plus grand.

2. PHOLEUON LEPTODERUM Friv. Vien. Zool. Bot. Ver. VII. 1857. p. 44. 2'. — Grotte de Funacza, au sud du comté de Bihar.

Ressemble beaucoup à première vue au *Pholeuon angusticolle*, il s'en distingue par sa couleur plus claire, son prothorax un peu plus étroit, ses élytres plus convexes, et particulièrement par la longueur plus considérable des antennes et des tarses. Tête carrée, densément et finement ponctuée, garnie de poils jaune-brillant, marquée sur le front d'une légère fovéole. Antennes de 11 articles grêles et longues, un peu plus longues que le corps, 1^{er} article peu épais, les 6 suivants allongés, les 3 derniers plus courts, 7-10 fortement élargis à l'extrémité, demi-ovale. Prothorax à peine plus long que large, assez convexe, jaune-brun, très finement et densément ponctué, vêtu d'une pubescence soyeuse d'un jaune luisant; bord antérieur légèrement échancré avec les angles saillants, côtés dilatés-arrondis, avant le milieu, fortement sinués par derrière; bord basal presque droit, avec les angles largement angulaires. Ecusson large, triangulaire, finement ponctué. Elytres en ovale long, très convexes, et munies d'un mince rebord, d'un brun jaunâtre, densément et finement ponctuées, aciculées, ainsi que le pronotum, avec une pubescence soyeuse, d'un jaune plus luisant; base visiblement plus large que le prothorax, avec les angles huméraux arrondis, ayant leur plus grande largeur derrière le milieu, arrondies chacune à la pointe. Pattes longues et grêles; tarses antérieurs ♂ élargis, de 5 articles, ceux de la ♀ de 4; tarses intermédiaires et particulièrement les postérieurs très grêles et allongés, 5 articles dans les deux sexes; premier et dernier articles d'égale longueur, les trois intermédiaires à peine plus longs que le premier.

3. PHOLEUON ANGUSTICOLLE Hampe. Vien. Zool. Bot. vii. 1857. p. 463*. — Long. 4,6 mill. — Hongrie, grotte de Vuntsanze, dans les monts de Bihar, aux frontières de Transylv., à 4,500 pieds d'altitude.

Ovale-oblong, brun, luisant, soyeux de fauve. Tête en carré allongé, densément pubescent de jaunâtre, pubescence couchée, très densément et profondément ponctué, la place des yeux légèrement creusée et rebordée; antennes grêles, beaucoup plus longues que la tête et le prothorax, les 7 premiers articles longs, allongés, les 4 derniers très peu plus épais et beaucoup plus courts que les autres, 7^e seulement peu plus long que le 8^e, dernier conique en pointe; prothorax aussi long que large au milieu, graduellement rétréci par devant, sinué par derrière, un peu après le milieu sur les côtés, et rétréci ainsi également par derrière, convexe transversalement; bord antérieur profondément échancré, angles antérieurs sail-lants, bord basal coupé droit, avec les angles droits; sur-face très finement et densément ponctuée, avec une pu-bescence délicate jaune-rougeâtre. Ecusson large, trian-gulaire, très finement et densément ponctué et pubescent. Elytres en ovale allongé, un peu plus de moitié plus larges que le prothorax au milieu, près de trois fois aussi longues que celui-ci, très convexes, arrondies aux épaules, visiblement plus larges à la base que le prothorax, côtés à rebord tranchant, très densément et finement ponctuées, avec de fines rides transverses, et une pubescence soyeuse jaune. Pattes longues et grêles.

Très voisin des *Leptoderus*, il en diffère par la pré-sence d'un écusson, le sternum caréné, le dernier article des palpes maxillaires subulé, etc., des *Catops* par les hanches postérieures très écartées, etc.

4. PHOLEUON GRACILE Friv. Wien. Monats. v. 1861. 387. Ab. iv. p. xxi. Grotte du sud du comté de Bihar (Hongrie).
5. PHOLEUON MERKLI Friv. Termes. Fuset. III. 1879. p. 232. Balkans, Var. *affine* Friv. — Var. *simile* Friv.

VI — DRIMEOTUS (δριμωτος, *fin*) Millr. Vien. Zool. Bot. Ver. 1856. vi. p. 635.

Antennes de 11 articles, longues, 1^{ers} articles menus, épaissis vers le bout à partir du 7^e, 8^e plus court et plus étroit que le précédent et les 3 suivants, dernier pointu.

Labre très légèrement sinué. Mandibules 4-dentées au bout, les 2 dents intermédiaires plus faibles. Palpes maxillaires de 4 articles, dernier subulé. Menton profondément échancré en devant; palpes labiaux de 3 articles, le 3 aussi long que 1. Yeux nuls. Tarses antérieurs ♂ 5-, ♀ 4-articulés, postérieurs de 5 articles dans les 2 sexes. Elytres avec 3 côtes légères et le rebord latéral replié en carène tranchante.

Le genre *Drimeotus* diffère des *Catops* par les tarses antérieurs 4-articulés ♀, ainsi que par la conformation particulière des élytres dans ce groupe. Il a le faciès du *Pholeuon angusticolle*.

1. DRIMEOTUS KOVACSI Milr. Vien. Zool. Bot. Ver. 1856. vi. p. 636*:
— Long. 3,4 mill. — Grotte de Igriez et de Knoch, près Fériuse, comté de Bihar (Hongrie).

Ovale-allongé, jaune-ferrugineux unicolore, vêtu d'une pubescence jaune luisante. Tête, ainsi que le prothorax, très finement et densément ponctués. Prothorax légèrement convexe, finement et densément pubescent, un peu plus large que long, dilaté-arrondi sur les côtés au-dessus du milieu, rétréci vers le sommet, sinué au-dessous du milieu, d'égale largeur vers la base, bord postérieur échancré en arc large, d'où les angles postérieurs un peu aigus; bord antérieur presque droit, angles antérieurs cependant avancés, pointus. Elytres légèrement convexes, garnies de poils écartés plus forts, plus larges à la base que le prothorax, légèrement arrondies sur les côtés, avec les rebords latéraux réfléchis aigus jusque au-dessus de l'angle externe postérieur; la pointe de chacune arrondie; sur chaque élytre 3 côtes longitudinales raccourcies aux deux extrémités, dont la 3^e est un peu indistincte; ponctuation assez grosse et pas très serrée, formant çà et là des rides et entre les rides des rangées indistinctes. Pattes longues et grêles. Tarses antérieurs ♂ avec les 1-3 articles légèrement élargis.

2. DRIMEOTUS KRAATZI. Friv. Vien. Zool. Bot. Ver. vii. 1857. p. 45. 3*. — Grotte près de Orte Tericse, comté de Bihar (Hongrie).

Diffère du *Kovacsi* Milr. par ses élytres plus densément ponctuées et plus fortement costulées, par les bords

latéraux des élytres moins réfléchis, par la pubescence plus fine et plus courte, et surtout par les jambes courbées en dehors et les intermédiaires comprimées ♂. Tête et prothorax brun-ferrugineux ou brunâtre, pubescents de jaune brillant, assez densément et finement ponctués ; le dernier assez convexe, plus large que long, dilaté-arrondi au milieu sur les côtés, rétréci par devant et par derrière, d'égale largeur près la base ; bord antérieur considérablement échancré surtout près des angles, qui sont par suite très saillants ; bord basal échancré largement en arc, angles postérieurs largement pointus. Ecusson triangulaire densément ponctué. Elytres brun-ferrugineux ou brunâtre, pubescentes de jaune luisant, ponctuées assez densément et plus fortement que le prothorax, points confluent en fines rides, surtout dans le pourtour postérieur ; ovales, médiocrement convexes ; base plus large que le prothorax ; côtés arrondis, à rebords largement repliés, disparaissant avant la pointe, qui est arrondie séparément ; chaque élytre présente 4 côtes et plusieurs lignes ponctuées, légèrement enfoncées sur la moitié postérieure ; les 2 premières côtes se joignent à la suture après le milieu, puis s'oblitérent peu à peu ; les 2^e et 3^e côtes finissent aussi après le milieu, la 4^e est la plus faible et raccourcie avant le milieu. Pattes assez longues, toutes les jambes courbées en dehors, ♂ dernière moitié des antérieures et les intermédiaires aplaties, comprimées ; 1-3 articles des tarsi antérieurs dilatés, la dilatation allant en décroissant.

VII — SPELÆOCHLAMYS (σπήλαιον, grotte ; χλαμός, manteau) Dieck. Heyd. Spain. 1870. 93. 75.

Yeux nuls. Antennes plus longues que la moitié du corps. Pénultième article des palpes maxillaires épaissi en avant, dernier subuliforme et proportionnellement plus long que dans les *Bathyscia*. Tarsi antérieurs de 4 articles. Prothorax plus étroit que les élytres, rétréci peu à peu de la base à l'extrémité, avec les angles postérieurs largement impressionnés et relevés. Mésosternum avec une carène médiane plus élevée, surtout en avant, qui s'avance en un petit denticule ; tandis que dans les *Bathyscia* elle

forme seulement un angle simplement droit ou à peine pointu. Abdomen très court enveloppé comme d'un manteau par les élytres qui sont beaucoup plus longues; celles-ci ovales, convexes, ventruées, atténuées par derrière en pointe très aiguë, chacune à sommet aigu et prolongé. Pour la longueur des pattes et les autres caractères comme dans les *Bathyscia*, près desquels on peut le placer provisoirement, quoique son prothorax distinctement plus étroit à la base que les élytres, et à bords postérieurs repliés, le rapproche davantage du genre *Driemeotus*.

1. SPELÆOCHLAMYS EHLERSI Dieck. Heyd. Spain. 1870. 94*. — Long. 2-2,2 mill. — Grotte près d'Alcoy (Alicante).

Ovale, longuement acuminé postérieurement, d'un jaune clair, transparent dans les exemplaires frais. Corps légèrement pubescent; antennes plus longues que la moitié du corps. Prothorax ayant sa plus grande largeur à la base, bien plus étroit que les épaules, à peine distinctement sinué avant les angles postérieurs; bord antérieur échancré un peu en carré, avec les angles antérieurs pointus, angles postérieurs profondément impressionnés jusqu'au milieu des côtés, de sorte que le disque paraît pulviniforme, les angles, eux-mêmes, réfléchis en pointe très saillante, bord basal échancré en arc. Elytres très convexes, en ovale pointu, couvertes d'une pubescence et d'une ponctuation distinctes et serrées, chacune terminée en pointe aiguë, toute la base et la suture jusque près de l'extrémité légèrement enfoncées, sans trace de strie suturale; bord latéral, surtout vers les épaules, élevé en carène et largement réfléchi.

LEPTINIDÆ.

VIII— PLATYPSYLLA (πλατύς, large; ψύλλα, puce) Ritzema. (1)
Tijdschr. V. Entomol. 2^e sér. v. 1869. p. 185. Lec. Proc. Lond.
Zool. Soc. 1872. p. 779. pl. LXVIII.

(1) L'importance du sujet, à cause de sa nature et de son actualité, nous engage à reproduire en entier, malgré son étendue, cette description si précise et si exacte, donnée par le savant docteur Le Conte, à l'aide d'habiles préparations du Rév. A. Mathews, exécutées avec la même perfection que celles de son admirable ouvrage des Trichopteryx.

Menton grand, tranverse, corné, échancré en avant avec les angles largement arrondis, arqué sur les côtés, trilobé en arrière, lobe médian parallèle, arrondi au bord, lobes latéraux très grands, triangulaires, obliquement arrondis sur le bord externe, droits sur l'interne, graduellement rétrécis par derrière et arrondis au bout; ces appendices, presque aussi longs que le lobe médian, en sont séparés par une fente étroite. Languette large, cornée, remplissant l'échancrure du menton et le dépassant, échancrée, sans paraglosses. Palpes labiaux courts, de 3 articles; 1^{er} épais, plus large que long, 2^e beaucoup plus mince, aussi long que large, 3^e plus étroit et plus long que le 2^e. Langue charnue, cachée derrière la languette échancrée. Machoires grandes et robustes, les 2 lobes grands, aplatis et minces, ciliés de longs poils, externe un peu triangulaire avec les côtés courbés, interne plus étroit, largement arrondi au bout. Palpes maxillaires de 4 articles, 1^{er} court, 2^e triangulaire un peu plus long que large, muni à l'angle externe d'une forte soie de moitié aussi longue que le 3^e article, et à l'angle interne d'une soie beaucoup plus longue, atteignant presque le bout du 4^e article, 3^e triangulaire, plus grand que le 2^e, 4^e subfusiforme, plus étroit, mais moitié plus court que le 3^e.

Antennes à 1^{er} article allongé, subcylindrique, muni d'une très longue soie à l'angle externe et d'une courte à l'interne, 2^e grand, moitié de la longueur du 1^{er}, cupiforme, frangé de longs poils; les autres articles formant une massue ovale, avec des articles transverses distincts frangés de longs poils, on en voit 7, mais il est difficile d'en faire un compte exact; la base de la massue est enfoncée si profondément dans la coupe du 2^e article, qu'un article a pu échapper à l'observation. Les antennes sont insérées sous l'arête du côté de la tête, non loin des angles postérieurs, et ne sont pas beaucoup plus longues que la tête; lorsqu'elles se retirent, elles sont reçues dans de profondes fossettes créusées sur les bords à la partie dorsale du prothorax.

Mandibules petites, aplaties, presque carrées, avec le bord externe peu arrondi, l'interne profondément crénelé ou plutôt pectiné, ressemblant à celles des *Corylo-*

phus. Tête presque semicirculaire, avec l'arête aiguë; front très légèrement convexe, sans suture frontale distincte; occiput légèrement saillant, frangé de fortes épines déprimées, formant une espèce de peigne, en dehors duquel, de chaque côté, de longs poils frangeant les angles postérieurs; entre l'occiput et le bord antérieur du prothorax il existe un profond sillon oblique, formant au milieu un angle obtus. Labre de la forme d'un large segment de cercle, environ 4 fois aussi long que large. Yeux manquant complètement.

Prothorax en trapèze, très légèrement convexe; sommet échancré en angle aigu, côtés profondément creusés en gouttière jusque près des angles postérieurs, où les sillons se courbent en dedans, et sont continués par une ligne sinueuse de grands points, parallèle au bord basal; la partie antérieure de ce sillon reçoit les antennes; base du prothorax obliquement sinuée de chaque côté, largement et profondément échancrée au devant de l'écusson; angles postérieurs arrondis, frangés de longs poils. Prosternum très grand, aplati, subtriangulaire, cachant l'insertion des hanches, prolongé en arrière en un grand appendice large, arrondi au bout et frangé de longs poils; cet appendice s'étend sur la partie antérieure du mésosternum; les pièces latérales paraissent séparées du pronotum par une suture; cavités cotyloïdes ouvertes par derrière.

Mésothorax court; écusson grand et triangulaire; mésosternum obtusément élevé en avant, où il est couvert par le prosternum, prolongé en arrière en un appendice semblable large, obtusément arrondi, frangé de longs poils, et prolongé de même sur la partie antérieure du métasternum; pièces latérales grandes transverses, finement aciculées, non distinctement séparées.

Métathorax court. Métasternum couvert en avant, par le prolongement du mésosternum, et prolongé de même, frangé de longs poils, sur l'articulation des cuisses; pièces latérales grandes, transverses obliques.

Elytres pas plus longues que le prothorax, tronquées, largement arrondies à l'extrémité, légèrement imbriquées à la suture, entièrement sans veines, excepté la

juxta-suturale; épipleures non séparées par une ligne, mais avec une série de grands points le long des bords latéraux; on remarque aussi en dedans des épaules une légère impression triangulaire longitudinale; 5 derniers segments dorsaux de l'abdomen entièrement découverts ainsi que les angles du précédent. Ailes manquent.

Abdomen en dessus, déprimé, non rebordé sur les côtés, chaque segment avec une rangée transverse de petites soies abaissées; stigmates placés près des angles postérieurs, également distants du bord latéral et du bord postérieur; segments ventraux légèrement convexes, 6 visibles derrière les hanches postérieures, qui cachent les 2 1^{ers} et la base du 3^e. Sutures droites, à l'exception des 2 dernières, qui sont courbes; dernier segment faiblement bisinué au bout.

Hanches plates, nullement saillantes; antérieures petites, subtriangulaires avec les angles arrondis; intermédiaires de même forme, mais plus grandes; postérieures très grandes, atteignant les bords latéraux du corps; surface externe plate, interne avec 2 saillies obtuses, l'une près du bord antérieur, l'autre vers le milieu, servant à les fixer.

Pattes courtes; trochanters petits, formant une ligne continue avec les cuisses; cuisses robustes et comprimées; jambes comprimées, triangulaires, arrondies au bout, armées sur le bord externe de très longues épines; éperons longs et menus; jambes antérieures plus courtes et plus larges que les autres, seulement d'un tiers plus longues que larges; postérieures plus de 2 1/2 fois aussi longues que larges, avec 2 petites épines surnuméraires à la face interne, au-dessus des éperons; tarses de 5 articles, un peu plus longs que les jambes, menus, un peu comprimés, épineux en dessous, antérieurs et intermédiaires à articles 1-4 égaux, ♂ avec un rang d'appendices membraneux claviformes de chaque côté, en plus des spinules; postérieurs avec le 1^{er} article plus long que le 2^e, articles un peu obliques en dessous, épineux, mais sans papilles membraneuses; dernier article de tous les tarses de moitié plus long que le 4^e, ongles médiocres, simples.

Corps ovale, allongé, déprimé, ressemblant à première vue à une petite *Blatte*, par sa couleur brun pâle et ses côtés un peu transparents.

Le seul représentant de ce groupe vit sur le *Castor du Canada*; découvert en 1871 sur des castors du Jardin zoologique d'Amsterdam, par M. Ritzema, cet insecte a été retrouvé récemment par M. Bonhours sur le castor qui s'est acclimaté dans la Camargue, à l'embouchure du Rhône.

M. Ritzema, qui l'a décrit le premier, sous le nom de *Platypsyllus castorinus*, le regardait comme devant former une famille d'un sous-ordre (APHANIPTERA). Le professeur Westwood, considérant son organisation si étrange, a établi pour lui un nouvel ordre qu'il a nommé ACHREIOPTERA.

Le docteur Le Conte n'hésite pas à le classer dans l'ordre des Coléoptères, et prouve cette doctrine par une discussion approfondie et détaillée des organes, dont il reproduit une figure exacte et une description remarquable. Certainement, cet insecte présente des affinités multiples, mais les principales le rattachent aux *Adephages* et surtout aux Clavicornes. Il conclut qu'il doit constituer une famille particulière entre les *Hydrophilidæ* et les *Leptinidæ*, quoiqu'il ait une tendance manifeste à se rapprocher des *Trichopterygidæ* et des *Corylophidæ*.

Provisoirement, nous le placerons près du genre *Leptinus*, avec lequel il semble appelé à former une famille distincte, comme l'a déjà établie le docteur Le Conte (Ac. nat. Philad. 1866. p. 368). — LEPTINIDÆ.

1. PLATYPSYLLA CASTORIS Ritzema, Pet. Nouv. ent. 1869. 15. Tijdsch. Ent. 2^e sér. v. p. 185. — Le C. Phil. 1872. p. 804*. pl 58. — *castorinus* Westw. Ent. Mont. Mag. 1869. vi. p. 118. — Long. 4 mill. — Canada; Amsterdam, Camargue (bouches du Rhône).

Ovale allongé, déprimé, fauve jaunâtre, luisant; tête frangée aux angles postérieurs de longs poils, occiput pectiné transversalement de courtes épines couchées, sur un seul rang; prothorax trapézoïdal rétréci en avant, à peine plus court que large, points peu nombreux sur le dos, côtés obliques, sillonnés pour la réception des antennes, trisinué à la base, marqué au devant du bord

basal d'une ligne de points sinuée ; élytres transverses, à pointillé vague et clair semé, pubescentes latéralement, marquées d'une courte impression basale en dedans des épaules ; segments dorsaux de l'abdomen avec une série transverse de courtes soies.

IX — LEPTINUS (λεπτινος, *déprimé*) Muller Germ. Mag. Ent. 1817. II. p. 266. — Duv. p. 107. pl. 36. f. 176.

Ovale court, très déprimé. Tête assez grande, presque horizontale, obtusément arrondie en devant ; pas d'yeux ; labre très court, transverse ; palpes maxillaires à dernier article acuminé ; menton concave grand, tronqué en avant ; antennes assez longues, dépassant la base du prothorax, subfiliformes, insérées sous un rebord latéral du front, 1^{er} article plus gros et plus long que les suivants, 3 à 4 derniers un peu plus gros. Prothorax grand, embrassant les élytres à la base, par les angles postérieurs aigus, allongés en arrière, côtés arrondis avec les angles antérieurs. Ecusson triangulaire. Elytres soudées, sans ailes. Pattes médiocres ; cuisses comprimées ; jambes ciliées ; tarses de 5 articles, 1^{er} des postérieurs allongé.

Vit sous les feuilles mortes, sous les pierres et dans les vieux troncs d'arbre ; très rare.

1. LEPTINUS TESTACEUS Muller, Germ. Mag. ent. 1817. II. p. 268. — Thoms. Skand. Col. IX. 1867. 353*. 1. — Fairm. Fn. p. 310. — Long. 2,2 mill. — France, Allemagne, Suède.

Ovale, déprimé, peu luisant, ferrugineux et assez finement pubescent de pâle ; antennes et pattes testacées. Tête petite, courte, penchée ; labre à peine visible ; mandibules cachées ; antennes subfiliformes, plus longues que la moitié du corps, insérées sous le bord du front, qui est aplati, scape long, 3^e article plus long que le 2^e, massue très obsolète, 8^e article un peu plus petit que ses adjacents. Prothorax uniforme, presque plus large que les élytres, subéchancré au sommet avec les angles antérieurs à peine abaissés, côtés rétrécis vers le devant, base largement échancrée avec les angles postérieurs aigus, prolongés ; presque plan sur le disque, très densément ponctué, peu luisant, à pubescence moins fine.

Silphides de l'Anc.-M. — 1884.

2

Ecusson assez grand, triangulaire. Elytres à peine 2 fois plus longues que le prothorax, épipleures du sternum obsolètes, ventrales nulles, obtusément arrondies au sommet; déprimées sur le dos, très obsolètement striées, presque rugueusement ponctuées. Pattes testacées, cuisses épaisses, postérieures dépassant à peine la marge des élytres; jambes à spinules peu nombreuses; 1^{er} article des tarsi postérieurs près de 3 fois plus long que le 2^e.

2. LEPTINUS CAUCASICUS Mots. Mosc. Bull. 1840. 176*. pl. 4. f. 11.
— Long. 2,3; larg. 2 mill. — Caucase, Géorgie, Ananur.

Ovale oblong, aplati, jaune, couvert d'un duvet couché d'un jaune plus clair, ce qui lui donne l'aspect terne et velu. Tête 3 fois plus petite que le prothorax, clypéacée et assez fortement ponctuée; antennes de la longueur de la tête et du prothorax, proportionnellement très minces et presque filiformes, avec le 1^{er} article et les 5 derniers plus longs que le reste. Prothorax transverse, arrondi sur les côtés, et se rétrécissant vers la tête, postérieurement échancré en arc; ponctué comme la tête, ce qui le fait paraître plus foncé que les élytres. Celles-ci un peu plus étroites que le prothorax, parallèles, arrondies à l'extrémité, plus finement ponctuées que le prothorax et couvertes d'un duvet plus clair que le reste du corps. Pattes assez minces. Dessous du corps un peu plus foncé que le dessus et glabre.

CATOPSIDÆ

X — BATHYSCIA (βαθύσκιος, dont l'ombre est épaisse) Schiedte
Spec. Fn. subf. 1849. 10. Lond. Soc. ent. 1851. 1. p. 141. — Aubé
Fr. Soc. ent. 1851. 393*. — *Adelops* (ἀδελός, invisible; ὄψ, œil)
Tellkampf Wieg. Arch. 1844. x. p. 318.

Yeux nuls, rarement peu distincts. Antennes plus longues que la moitié du corps, filiformes, le 7^e article et les 3 derniers un peu plus renflés, insérées sur les côtés du front. Mandibules bidentées au bout, avec un denticule entre les deux dents. Mâchoires composées de 2 lobes étroits, barbus à l'extrémité, l'interne terminé par un crochet corné. Pénultième article des palpes maxillaires grand, épaissi au bout, le dernier beaucoup plus

court et plus menu, subuliforme. Lèvre comme dans les *Catops*. Tarses antérieurs de 4 articles, les autres de 5. Corps en ovale plus long ou plus court, fortement convexe. Prothorax plus large que long, ayant sa plus grande largeur au bord postérieur et appliqué étroitement contre les élytres, qui souvent sont marquées de fines raies transverses.

Tellkampf, après avoir visité l'immense grotte dite du Mammouth, dans le Kentucky (Etats-Unis), où il avait découvert des représentants de cette faune souterraine, alors inconnue et depuis si bien étudiée, décrivait, en 1844, à son retour en Europe, un curieux coléoptère voisin des *Catops*, auquel il donnait le nom générique d'ADELOPS (*yeux invisibles*). En 1849, Schiædte fit connaître, dans un mémoire intitulé : « Specimen-Faunæ subteraneanæ », publié dans les Transactions de la Société des sciences de Danemark et traduit en anglais dans les Trans. Lond. Ent. soc., 1851, 1, p. 141, deux petites espèces ressemblant aussi aux *Catops*, et présentant les caractères signalés par Tellkampf pour son *Adelops* d'Amérique. Mais le signalement incomplet de l'entomologiste allemand ne permettant pas à Schiædte de réunir avec toute sécurité ses espèces au genre *Adelops*, il créa pour elles provisoirement le genre *Bathyscia*.

Plus tard, les entomologistes identifièrent les deux genres, et les nombreuses espèces qui sont venues s'y joindre ont été pour la plupart décrites sous le nom d'*Adelops*. Mais dans ces derniers temps l'opinion contraire a prévalu et le savant Dr Horn a établi que nos espèces d'Europe (*Bathyscia*) ne pouvaient faire partie d'un même genre que l'espèce de Kentucky (*Adelops*). Nous avons suivi l'opinion commune, mais il nous a semblé inutile de rappeler, à chaque espèce que nous décrivons sous le nom de *Bathyscia*, qu'elle a été publiée par tel ou tel auteur sous celui d'*Adelops*.

1. BATHYSCIA (*Aphaobius*) MILLERI Schmidt. Wien. Zool. Bot. Ver. 1856. p. 626. pl. vi. f. 105 et v. 1855. 3°. — Long. 2,5 mill. — Grottes de Passica, près du mont Mokriz (Carniole).

S'éloigne par sa forme allongée, plus étroite, et par la longueur des antennes et des pattes postérieures des au-

tres *Bathyscia*. Corps tout couvert de poils jaunes écartés. Antennes très longues, presque de la longueur du corps. Prothorax un peu plus large que long, largement échancré en arc par derrière, parallèle sur les côtés jusqu'au milieu, puis rétréci en courbe vers le sommet; angles antérieurs rabattus, saillants en devant, postérieurs pointus. Elytres légèrement convexes, très légèrement élargies en courbe jusqu'au milieu, arrondies séparément à l'extrémité, grossièrement ridées transversalement et assez densément ponctuées. Pattes, surtout les postérieures, considérablement allongées.

2. *BATHYSCIA ACUMINATA* Milr. Wien. Zool. Bot. Ver. 1855. v. 507*.
— Long. 1,3 mill. — Grotte près de Treffen (Basse Carniole).

Jaune-ferrugineux, très finement pubescent. Antennes presque de la longueur de la tête et du prothorax, 1^{er} article de la massue plus long, les 3 suivants un peu plus courts que larges, le dernier en ovale court. Tête et pronotum très finement et indistinctement ponctués. Prothorax largement échancré par derrière, côtés arrondis, angles postérieurs pointus, saillants. Prothorax et élytres convexes en une même courbe, avec le point le plus élevé à la base. Elytres fortement rétrécies par derrière, ce qui donne à l'insecte une faciès claviforme.

3. *BATHYSCIA BYSSINA* Schiöd. Spec. Fn. subter. 1849. p. 10. pl. 2.
— Kiesw. Fr. Soc. ent. 1851. p. 396*. — Milr. Wien. Zool. Bot. Ver. 1855. v. 507*. — Lond. Soc. ent. 1851. I. p. 141. — Long. 1 mill. — Grottes de Luège et Nussdorf, d'Adelsberg (Carniole).

Ovale court, très convexe, ferrugineux-brun, pubescent de fauve, articles des palpes labiaux d'égale longueur, 9^e article des antennes 3 fois plus long que le 8^e.

Très convexe, avec la plus grande élévation avant le milieu des élytres, très finement ponctué et pubescent. Antennes menues, dépassant la moitié de la longueur du corps, articles de la massue plus longs que larges, le dernier en ovale allongé. Prothorax 2 fois aussi large que long, rétréci par devant, côtés fortement arrondis, angles postérieurs pointus, saillants. Elytres 2 fois aussi longues que le prothorax, atténuées graduellement vers l'extrémité, légèrement arrondies sur les côtés.

4. BATHYSCIA GLOBOSA Milr. Wien. Zool. Bot. Ver. 1855. v. 507*.
— Long. 0,5 mill. — Carinthie : Grotte de Ledenica, près Gr. Liplain, etc.

Ressemble beaucoup aux *Freyeri* et *Khevenhulleri* par le faciès, mais beaucoup plus petit. — Brièvement ovale, convexe, brun-roux, très densément pubescent. Prothorax largement échancré à la base, et en ce point plus étroit qu'au milieu, légèrement dilaté-arrondi sur les côtés, rétréci vers le sommet, échancré en devant avec les angles antérieurs avancés, angles postérieurs prolongés en arrière. Elytres formant une même convexité avec le prothorax, légèrement rétrécies en courbe vers le sommet. -

5. BATHYSCIA FREYERI Miller Wien. Zool. Bot. Ver. 1855. v. p. 506*.
— Long. 2,3 mill. — Grotte de Dolgajama, dans le Sumberg ; celle d'Ihansca, près de Laybach, et celle de Postovka (Basse-Carniole).

De la taille du *Khevenhulleri* ; ovale court, plus légèrement convexe. Antennes plus longues que la tête et le prothorax, finement poilues, garnies vers l'extrémité de quelques points plus longs. Prothorax fortement rétréci vers le sommet, échancré en large courbe à la base, les côtés un peu sinués à partir du milieu, angles postérieurs pointus, prolongés en arrière. Pubescence sur le pronotum et sur les élytres rangée en séries. Elytres convexes, arrondies sur les côtés, les sommets légèrement arrondis.

Semblable au *Khevenhulleri*, mais s'en reconnaît aisément à sa convexité moindre et à la pubescence du dessus plus grosse, sériée.

6. BATHYSCIA CROATICA Milr. Wien. Zool. Bot. Ver. 1868. p. 551.
Ab. vi. 106. — Croatie, grotte d'Ozali.

7. BATHYSCIA KHEVENHULLERI Milr. Wien. Zool. Bot. Ver. 1852.
I. p. 131 ; 1855. v. p. 106* . — Long. 2,3-2,8 mill. — Carniole, grotte d'Adelsberg, Gabrovica, Sessana, etc.

Rouge-ferrugineux, pubescents de jaune. Antennes plus longues que la tête et le prothorax ; massue distinctement séparée, 8^e article, comme dans toutes les espèces du groupe, plus petit que les autres articles de la massue. Tête et prothorax à points écartés indistincts ; celui-ci de

moitié plus court que large à la base, rétréci vers le sommet, côtés légèrement arrondis, bord postérieur échancré en large courbe, angles postérieurs droits ou un peu pointus. Elytres convexes, marquées de rides transverses et de points très fins et denses, arrondies, sommet obtusément arrondi.

Varie pour la forme du prothorax et par la ponctuation.

8. BATHYSCIA NARENTINA Milr. Vien. Monats. 1861. 266. Ab. iv. 21. — *pruinosa* Schauf. Num. Ot. 1863. I. 35. — Isis 1863. 145. Vien. Zool. Bot. Ver. 1863. 1222. — Dalmatie.

9. BATHYSCIA DOROTKANA Reitr. Deuts. Ins. Zeits. 1881. 215. 28*. — Long. 2,1 mill. — Herzégowine, grotte près de Drieno.

Voisin du *narentina* Milr., mais bien plus svelte, plus finement ponctué et pubescent. Ovale-allongé, assez fortement convexe, brun-ferrugineux, antennes et pattes plus claires, très densément et finement pubescent, pubescence d'un jaune gris soyeux, couchée, de sorte que la couleur foncière est entièrement voilée, couvert d'une ponctuation serrée extrêmement délicate, qui ne peut se reconnaître qu'à un très fort grossissement. Antennes grêles, presque capillaires, atteignant le milieu du corps, 1-2 articles longs, cylindriques, épais, les 4 suivants plus grêles, plus longs que larges; les autres, à l'exception du 8^e, qui est plus court et plus menu, 2 fois aussi longs que larges, le dernier un peu plus long, pointu. Tête plane. Prothorax à la base au moins de la largeur des élytres, rétréci en courbe par devant, à peine 2 fois aussi large que long, base très légèrement sinuée de chaque côté, angles postérieurs peu saillants en arrière et peu pointus. Ecusson distinct, triangulaire. Elytres beaucoup plus de 2 fois aussi longues que le prothorax, fortement rétrécies de la base au sommet, qui est presque tronqué, le rebord latéral un peu saillant, dessus transversalement strigieux, au milieu de la ponctuation, qui est extrêmement fine et serrée; strie suturale nulle. Tarses postérieurs de 5 articles, antérieurs de 4, les derniers un peu plus forts, le 1^{er} article légèrement épaissi ♂?

10. BATHYSCIA CELATA Hampe, Vien. Monats. 1861. 65. Ab. I. 109. — *Erberi* Schauf. Isis, 1863. 145. Vien. Zool. Bot. Ver. 1863. 1221. Nunq. Ot. I. 34. — Dalmatie.

11. BATHYSCIA TARSALIS Kiesw. Berl. Zeits. 1861. 377*. — Long. 1,5-2,2 mill. — Mont Rose.

Ovale, médiocrement rétréci vers le bout, ferrugineux obscur, très finement pubescent de soyeux. Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, plus grêles, à peine épaissies vers l'extrémité, 8^e article un peu plus court et plus étroit que le 9^e, 3-6 3 fois plus épais et 2 fois plus longs que le 7^e, 9^e et 10^e pas plus courts que larges. Prothorax convexe, luisant, transverse, 2 fois plus large que long, rétréci en avant, arrondi sur les côtés, tronqué au sommet, sinué de chaque côté à la base, angles postérieurs aigus, prolongés en arrière, pointillé très dense et très fin, subaciculé. Elytres peu plus étroites à la base que le prothorax, côtés presque droits, légèrement convergents, arrondies au sommet, d'un tiers plus longues que larges à la base, marquées de strigosités transverses très fines ou aciculées. Pattes testacées, tarsi antérieurs ♀ simples, de 4 articles, ♂ fortement dilatés, 1^{er} article très grand, subtransverse, les 2 suivants peu à peu plus petits, cordiformes, 4^e très petit, non dilaté, 5^e allongé, aussi long que les 3 précédents.

Voisin de *Schiedtei*, mais bien plus grand, plus foncé, plus large, antennes un peu plus longues et beaucoup plus menues, pubescence du corps plus fine, tarsi antérieurs ♂ plus fortement dilatés, quoique ayant dans les 2 espèces 5 articles ♂.

Le suivant n'est probablement qu'une variété de celui-ci :

BATHYSCIA KERIMI Fairm. Genov. Mus. Civ. 1872. III. p. 54*. —

Long. 1,5 mill. — Riva del Valdobbia, feuilles sèches.

Ovale-oblong, convexe, légèrement atténué par derrière, brun ou plus souvent testacé, luisant, pubescent de fauve, très finement et densément couvert de points râpeux. Antennes pâles, grêles, 1-2 articles allongés, subégaux, 3^e article plus court que le 2^e. Prothorax seulement rétréci en avant, bord basal droit au milieu, angles postérieurs embrassant la base des élytres, celles-ci finement rebordées, assez abruptement arrondies au bout, strie suturale à peine visible.

Voisin du *Schiœdtei*, mais distinct par ses antennes plus grêles, à peine plus épaisses au bout, derniers articles oblongs obconiques, angles postérieurs du prothorax un peu moins prolongés, et sa strie suturale peu distincte.

12. BATHYSCIA MONTANA Schiœdt. Spec. Fn. subt. 1849. 11. pl. 2. f. 1. — Milr. Vien. Zool. Bot. Ver. v. 1855. 508*. — Kiesw. Fr. Soc. ent. 1851. 396. — Trad. Lond. Soc. ent. 1851. 1. p. 141. — Long. 0,6 mill. — Carniole, basse grotte de Luëgg, en grand nombre autour du Schlossberg à Laybach et de Veldes, sous l'écorce.

Ovale, convexe, ferrugineux, pubescent de fauve, 2^e article des palpes labiaux très court; 9^e article des antennes dépassant de moitié le 8^e.

Un peu plus petit que l'*ovata*, plus légèrement convexe, élytres à peine rétrécies vers l'extrémité.

13. BATHYSCIA HOFFMANNI Mots. Et. v. 1856. 36*. — Carniole : Laybach.

Très petit. Assez convexe, presque régulièrement ovale et obtus postérieurement; d'un brun roussâtre et couvert d'un duvet cendré couché mais assez long. Antennes beaucoup plus courtes et plus grosses que chez les autres espèces; 8^e article très court, 7^e aussi gros que le 9^e.

14. BATHYSCIA SYLVESTRIS Mots. Et. v. 1856. 36*. — Carniole : grotte des Poiriers.

Ressemble à *montana*, mais du double plus grand.

15. BATHYSCIA LESINÆ Reitr. Deuts. Ins. Zeits. 1881. 216. 29*. — Long. 1,5 mill. — Dalmatie : île de Lesina.

Facile à distinguer, par la strie suturale distincte, de l'*Erberi* et des petites espèces qui vivent sous les feuilles. Assez large, ovale, légèrement convexe, jaune-rougeâtre, vêtu d'une pubescence jaunâtre couchée courte et très serrée, et ponctué bien plus finement, à peine visiblement. Antennes courtes, articles, à l'exception des 2 1^{ers} et du dernier, qui est plus allongé, et du 8^e, qui est beaucoup plus court et plus petit, peu plus longs que larges, atteignant au plus le bord postérieur du prothorax. Tête simple. Prothorax de la largeur des élytres, rétréci en arc par devant, pas tout à fait 2 fois aussi large que long, bord basal presque droit, peu sinué sur les côtés, angles postérieurs droits pointus, légèrement sail-

lants en arrière. Ecusson grand, triangulaire. Elytres 2 fois aussi longues que le prothorax, rétrécies en courbe du milieu au sommet qui est arrondi, arête latérale fine, saillante en dehors, dos assez convexe, très finement et densément strigueux-aciculé transversalement, plus distinctement que dans *dorothana*, on voit une fine strie suturale marquée comme dans les petits *Catops*. Pattes robustes, jambes droites, tarsi antérieurs plus courts, de 4 articles, les 3 1^{ers} légèrement élargis.

16. BATHYSCIA HUNGARICA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1878. 63^r. — Long. 1,4 mill. — Montagnes près Raho, sous l'écorce humide.

Rouge - ferrugineux brunâtre, légèrement convexe, ovale obtus, très finement et pas très densément pubescent de gris jaunâtre. Antennes atteignant la base du prothorax, menues, 1-2 articles subégaux, allongés, près de 4 fois aussi longs que larges, 3-6 1 1/2 fois aussi longs que larges, s'élargissant un peu, 7^e de la largeur des 3 derniers, en rectangle ou presque en carré, 8-10 légèrement transverses, 9^e un peu plus grand que le précédent, dernier oblong, coupé en pointe. Tête et prothorax au plus indistinctement alutacés-aciculés, celui-ci presque un peu plus large à la base que les élytres, rétréci en courbe par devant, obsolètement à peine distinctement ponctué, base sinuée de chaque côté, avec les angles postérieurs pointus, projetés en arrière. Elytres peu rétrécies vers l'extrémité, où elles sont arrondies ensemble, 1 1/3 fois aussi longues que larges, densément et finement ponctuées, marquées de strigosités transverses distinctes; strie suturale nulle. Toutes les jambes droites, armées au bord externe de 3-4 denticules droits.

Voisin du *pusilla* Mots., de la même taille, de la même forme et de la même couleur, mais moins convexe, et sans strie suturale sur les élytres; il s'éloigne de *muscorum* et *tarsalis* par les tarsi antérieurs ♂ de 4 articles et par sa taille moindre.

17. BATHYSCIA INSIGNIS Friv. Termes. Fuset. III. 1879. p. 181. — Hongrie méridionale, Mehadia.
18. BATHYSCIA PAVELI Friv. Termes. Fuset. III. 1879. p. 183. — Hongrie méridionale, Mehadia.

19. BATHYSCIA KERKYRANA Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884 115*.

— Long. 1,5 mill. — Corfou, Morée, Gasturi.

Ovale, brun-roux, luisant, vêtu d'une pubescence fauve très courte, duveteuse; bouche, antennes et pattes testacées; antennes grêles, articles 1-2 allongés, 3-6 plus étroits, oblongs, massue parallèle étroite, 7^e article obconique, peu plus long que large, 8^e petit, 9 et 10 presque carrés; tête luisante, assez lisse; prothorax large, à peine pointillé en avant, très finement et rugueusement pointillé vers la base, qui est sinuée de chaque côté, avec les angles postérieurs aigus; élytres 2 fois plus longues que le prothorax, plus claires vers l'extrémité, très finement et rugueusement ponctuées, marquées de strigosités transverses fortes, mais indistinctes, strie suturale nulle.

Se reconnaît à sa strie suturale nulle, aux 2 pénultièmes articles des antennes; diffère de *Erberi* par ses élytres à peine strigieuses transversalement, du *montana* par sa taille plus grande et par ses élytres fortement atténuées peu à peu vers l'extrémité.

20. BATHYSCIA DODEROI Fairm. Gen. Mus. Civ. XVIII. 1882. 446*.

— Long. 2 mill. — Grotte sur le mont Fasce (Italie).

Ovale, médiocrement convexe, testacé-roussâtre, luisant, garni d'une pubescence fauve serrée soyeuse. Antennes grêles, derniers articles (sauf le 8^e plus étroit) un peu plus épais, garnis de plus longs poils, 2^e article pas plus court que le 1^{er}. Prothorax assez ample, rétréci en devant à partir du milieu, marge postérieure largement et obsolètement bisinuée, angles postérieurs médiocrement prolongés en arrière, dos à pointillé serré, très fin et à peine distinct. Ecusson triangulaire, finement ponctué. Elytres atténuées seulement après le milieu, assez obtusément arrondies ensemble au sommet, densément couvertes d'aspérités pointillées, très fines, à peine visibles, avec des linéoles très obsolètes, strie suturale marquée, confondue au bout avec la suture; espace sutural un peu déprimé court à la base. Jambes postérieures droites; tarsi antérieurs de 4 articles, grêles; ♂ antennes plus robustes, tarsi antérieurs un peu moins étroits.

Ressemble assez au *meridionalis* des Pyrénées, mais

plus grand et un peu plus convexe longitudinalement ; angles postérieurs du prothorax plus saillants en arrière ; surtout strie suturale bien visible se confondant en arrière avec la suture, et l'espace sutural un peu déprimé en avant.

21. BATHYSCIA DORLÆ Fairm. Gen. Mus. Civ. m. 1872. 55*. — Long. 1,5 mill. — Spezzia, grotte du Monte-Ceppo, au-dessus de Fabiano (Italie).

Ovale court, atténué par derrière, testacé mais plus obscur, luisant soyeux de fauve, à points serrés, les plus fins possibles, à peine râpeux. Prothorax plus lisse. Antennes pâles ou rembrunies, testacées aux 2 extrémités, 2^e article plus court que le 1^{er}, 3-6 courts, 5 derniers épaissis. Prothorax ample, arrondi en avant. Elytres atténuées postérieurement dès avant le milieu, sommet arrondi, strie suturale entière.

Distinct de toutes les autres espèces, par sa stature courte, ses antennes assez courtes, épaisses au bout, et sa strie suturale entière.

22. BATHYSCIA SPAGNALOI Fairm. Gen. Mus. Civ. 1882. xviii. 446*. — Long. 2,8-3 mill. — Grotte près de Pigna (Italie).

Ovale, très atténué par derrière, fort convexe, testacé roussâtre, luisant, assez densément soyeux d'une pubescence fauve assez longue serrée. Antennes grêles, derniers articles (8^e plus étroit et plus court excepté) un peu plus épais, à villosité plus longue, dernier aigu, 2^e plus court que le 1^{er}. Prothorax assez ample, rétréci en devant avant le milieu, très finement et à peine visiblement pointillé. Ecusson triangulaire, finement ponctué. Elytres cunéiformes, subtronquées au sommet, à aspérités denses-assez fines, strie suturale peu marquée. Jambes postérieures droites, ♂ tarsi antérieurs de 5 articles, 1-3 dilatés villeux, 1^{er} le plus grand, 4^e étroit court, 5^e plus long, grêle, 8^e article des antennes très court, corps un peu plus petit, prothorax un peu plus ample ; ♀ tarsi antérieurs de 4 articles grêles ; antennes plus grêles, 8^e article plus étroit, mais peu plus court que les autres, corps plus grand, prothorax moins ample, strie suturale plus marquée. — Ressemble au *Gestroï* par ses élytres

en coin, atténuées dès la base et par son corps très convexe ; en diffère par la taille plus grande, la forme plus large et les élytres moins longues, presque tronquées à l'extrémité.

23. BATHYSCIA SARTEANENSIS Bargagl. Ital. Soc. ent. III. 1871. 39. pl. 2. f. 1. Ab. xvii. 87. — Italie.
24. BATHYSCIA MUSCORUM Dieck. Berl. Zeits. 1869. 349. 14. Rép. 51. — Italie.
25. BATHYSCIA EHLERSI Ab. Per. Cavernic. 1872. 18. 1. Rép. 44. — Ariège : grotte d'Aubert.
26. BATHYSCIA BONVOULOIRI Duv. Glan. 1859. 34*. 1. — Long. 3,6-4,5 mill. — Grottes de Cortat, de Conflant, près Villefranche (Pyrénées-Orientales).

Subovalaire, large en avant, notablement atténué en arrière, très peu convexe ou subdéprimé supérieurement, en entier d'un roux testacé ou parfois d'un jaune testacé plus ou moins clair, assez densément vêtu d'une très fine et courte pubescence déprimée jaunâtre. Antennes très allongées, très grêles, un peu plus longues que la moitié du corps, à peine épaissies vers l'extrémité, 1-6 articles beaucoup plus longs que larges, cylindriques, subégaux, 7^e de même mais faiblement épaissi au sommet, 8^e plus court et un peu plus étroit, 9^e subégal en longueur au 8^e mais un peu plus épais, 10^e un peu plus court que le précédent, obconique, le dernier ovale oblong, acuminé. Tête verticale, très finement pointillée, luisante. Pronotum grand, faiblement convexe, un peu luisant, en général légèrement plus large que les élytres à leur base, principalement ♂, moitié plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés en arrière, rétréci notablement en avant dans sa moitié antérieure, échancré antérieurement, bisinué à sa base, avec les angles postérieurs aigus, un peu saillants en arrière et recouvrant les épaules ; densément et très finement pointillé. Elytres presque déprimées sur leur dos en avant, simplement arquées légèrement sur les côtés, fortement atténuées en arrière et arrondies chacune au bout, marquées de stries transverses denses et fines, avec une strie juxtasaturale très légère vers sa base ou vers son milieu, nulle dans le reste, parfois même tout à fait obsolète. ♂ Tarses anté-

rieurs de 5 articles distincts, 1^{er} fortement dilaté en carré long, aussi grand que les 3 suivants réunis, 2^e bien plus petit, mais dilaté aussi, brièvement cordiforme, 3^e plus petit encore, mais toujours un peu dilaté, tous trois munis de brosses de poils inférieurement.

27. BATHYSCIA DIECKI Saulc. Ab. Per. Coléopt. Cavern. 1872. 18. 3. Rép. 45. — Ariège.

28. BATHYSCIA PYRENÆA Lesp. An. Sc. nat. 1857. 283. 4^e sér. VII. n^o 5. 1858. pl. 17. f. 16 et 10. — Ab. de Perrin, Coléopt. Cavern. 1872. 18. 4. — Fairm. Fr. Soc. ent. 1859. 32. 14*. — Long. 3,2 mill. — Grottes de Bèdeillac, près Tarascon ; Nioux, Sabart, Lombrive, Fontanat (Ariège).

Ferrugineux, corps entièrement pubescent. Yeux nuls. Antennes simples, insérées dans une fossette latérale de la tête, de 11 articles, 8^e petit. Prothorax atténué en avant, élargi en arrière, angles antérieurs droits, postérieurs aigus. Elytres un peu plus larges que le prothorax, arrondies au sommet, strie suturale courte, marquée ; tarses antérieurs dilatés, de 5 articles ♂, de 4 articles ♀,

29. BATHYSCIA DISCONTIGNYI Saulc. Ab. Per. Cavern. 1872. 18. Rép. 45. — Grottes du Bédât, de Castel-Mouly (Hautes-Pyrénées), de Massat (Ardèche).

30. BATHYSCIA BARNEVILLEI Saulc. Ab. Per. Cavern. 1872. 18. Rép. 45. — Ariège : grotte de Bèdeillac.

31. BATHYSCIA LONGICORNIS Saulc. Ab. Per. Cavern. 1872. 19. Rép. 47. — Ariège : grotte de Portal.

32. BATHYSCIA SAULCYI Ab. Per. Cavern. 1872. 19. Rép. 45. — Ariège : grotte de Montesquieu.

33. BATHYSCIA ABEILLEI Saulc. Ab. Per. Cavern. 1872. 20. Rép. 48. — Ariège : grottes du Mas d'Azil, de Peyrounard.

34. BATHYSCIA CLAVATA Saulc. Ab. Per. Cavern. 20. Rép. 48. — Ariège : grottes de Fontanet, de Moulis, d'Aubert, de Font saint.

35. BATHYSCIA STYGIA Dieck. Berl. Zeits. 1869. 348. Rép. 52. — Ariège : grotte d'Olot.

36. BATHYSCIA ZOPHOZINA Saulc. Ab. Per. Cavern. 1872. 21. Rép. 49. — Ariège : grotte Bétharam (Basses-Pyrénées).

37. BATHYSCIA SPELUNCARUM Delar. Fr. Soc. ent. 1857. xciv*. 2. — Long. 3 mill. — Ariège : grotte de Bétharam (Basses-Pyrénées).

Ovale-allongé, très peu convexe, testacé, couvert d'une

pubescence plus claire, longue et couchée. Antennes grêles, à peine épaissies à l'extrémité, dépassant le tiers des élytres. Prothorax court, peu convexe, peu sinué à la base, angles postérieurs presque droits, surface très finement et très densément granuleuse. Elytres très allongées, non tronquées, déprimées sur la suture, couvertes de petites stries transverses, irrégulières, pas de strie suturale.

38. BATHYSCIA PEYRONI Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1875. 216*. 5. — Long. 1,2-1,3 mill. — Liban, près Beyrouth.

Brun, ovale-oblong, peu atténué par derrière, strie suturale visible, suture à peine déprimée à la base, élytres à stries transverses, antennes courtes, ainsi que les pattes, formant une massue peu épaisse, tarses antérieurs dilatés ♂ en patelle.

Tellement conforme au *celata* Hampe, qu'on le confondrait avec lui si l'on ne remarquait sa strie suturale et ses articles 1-2 des antennes beaucoup plus courts et plus globuleux.

39. BATHYSCIA PERSICA Ab. Per. Fr. Soc. ent. 1861. ix. 1*. — Long. 1 mill. — Perse, Astrabad.

Brun, brièvement ovale, fort convexe, atténué par derrière, strie suturale nulle, élytres assez opaques, marquées de stries transverses à peine visibles, antennes et pattes courtes, tarses antérieurs dilatés ♂, patelliformes.

Voisin de *Peyroni*, à élytres plus courtes, plus globuleuses, sans strie suturale, à stries transverses à peine visibles.

40. BATHYSCIA PROSERPINÆ Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878. Sépar. 15*. — Long. 2,3 mill. — Grotte de l'Homme-Mort (Aude.)

Brunâtre, très convexe, très atténué en arrière, strie suturale nulle, suture non déprimée, élytres transversalement striolées, antennes assez robustes, médiocrement allongées, avec leurs articles 7, 9 et 10 très dilatés, tarses antérieurs très dilatés.

Très semblable aux *Delarouzei* et *inferna*, dont il diffère à première vue par les élytres moins arrondies au sommet et les tarses antérieurs fortement dilatés ♂; encore plus voisin du *Chardoni*, mais beaucoup plus convexe et à tarses antérieurs plus dilatés ♂.

41. BATHYSCIA SCHIÆDTEI Kiesw. Stet. Zeit. 1850. 223. — Fr. Soc. ent. 1851. 394*. — Milr. Vien. Zool. Bot. Ver. v. 1855. 508. — Long. 0,7-1 mill. — Pyrén.-Or. : La Preste, Bagnères-de-Luchon. — *grandis* Fairm. Fr. Soc. ent. 1856. 525. — *depressa* Fairm. Fn. Fr. — Basses-Pyrén. : grotte d'Isturitz.

Ovale-oblong, atténué vers le bout, ferrugineux, pubescent de fauve. Antennes un peu plus courtes que la tête et le prothorax, plus grêles, à peine épaissies vers l'extrémité, 8^e article plus petit que les contigus, dernier ovale oblong, plus court que les 2 précédents, testacées. Tête défléchie, garnie d'une pubescence très fine, clairsemée, ponctuée, luisante. Prothorax convexe, assez luisant, transverse, près de 2 fois plus large que long, rétréci en avant, arrondi sur les côtés, tronqué en devant, largement profondément sinué à la base, avec les angles postérieurs aigus, saillants, obsolètement et finement ponctué. Elytres un peu plus étroites à la base que le prothorax, peu arrondies sur les côtés, rétrécies vers le sommet, qui est subtronqué, moins convexes, très finement et transversalement strigieuses ou aciculées, pubescentes de fauve. Pattes testacées.

Ressemble assez à *montana* Schiædte, mais en général plus grand.

42. BATHYSCIA MERIDIONALIS Duv. Fr. Soc. ent. 1854. 36'. Gen. Col. pl. 35. f. 175. — Long. 2,2 mill. — France mér., Bordeaux.

Ovale oblong, légèrement convexe, atténué vers l'extrémité, ferrugineux, brièvement et finement pubescent de fauve. Prothorax transverse, densément et finement pointillé. Elytres à peine plus étroites que le prothorax à la base, marquées de très fines strigosités transverses. Neuvième article des antennes plus grand que le 8^e.

Cette espèce, jusqu'ici réunie au *Schiædtei*, en est très distincte par le prothorax ♂ grandement dilaté, très court et plus aspèremment ponctué, ainsi que ses élytres.

43. BATHYSCIA GRENIERI Saulcy Ab. Per. Cavern. 1872. 22. Rép. 50 — Pyrénées-Orientales.
44. BATHYSCIA SUBASPERATA Saulcy Ab. Per. Cavern. 1872. 22. — Ariège.

45. BATHYSCIA LARCENNEI Ab. Per. Cat. Col. Gers. 1883. App. I. p. 1*. — Long. 1,8-2 mill. — Gers : Pordiac.

Brun foncé, brillant, à vestiture très fine et peu dense,

très convexe. Antennes courtes, n'atteignant pas tout à fait les angles postérieurs du prothorax, assez épaisses, grossissant peu à peu vers l'extrémité, à peu près semblables dans les 2 sexes, 6^e article (1^{er} de la massue) de l'épaisseur des 3 derniers, 7^e plus petit, à peine plus étroit que 6 et 8. Prothorax bombé, à côtés continuant ceux des élytres, à ponctuation assez serrée et assez forte. Elytres courtes, un peu plus allongées ♀, bombées, déclives seulement sur la moitié postérieure, arrondies séparément au sommet, couvertes de stries transverses assez fortes et très serrées. Pattes courtes, épaisses; jambes antérieures légèrement courbées en dehors, intermédiaires courbées en dedans, postérieures droites. Tarses antérieurs dilatés ♂, mais à peine de la largeur de l'extrémité des jambes.

Voisin des *Schioedtei*, *Grenieri*, *lapidicola* et *meridionalis*; diffère du 1^{er} par son corps plus convexe, la ponctuation du pronotum moins forte, la strigosité des élytres plus serrée, la pubescence bien plus fine et moins fournie, ce qui le fait paraître plus brillant, par ses antennes plus épaisses à la base, à articles plus cylindriques, tarses ♂ sensiblement plus étroits; du 2^e par sa pubescence fine, la strigosité des élytres plus serrée, son aspect brillant, et surtout par son corps plus court, plus convexe et moins atténué en arrière; du 3^e par ses élytres à points moins rudes, et l'absence de caractères extraordinaires dans les jambes; enfin, du 4^e par son corps plus convexe, son prothorax moins dilaté, surtout ♂, et ses élytres à strigosités nettes et régulières, sans points aciculés; jambes antérieures non spatulées comme dans celui-ci ♂.

46. BATHYSCIA OVATA Kiesw. Stet. Zeit. 1850. 223. Fr. Soc. Ent. 1851. 395*. — Milr. Vien. Zool. Bot. Ver. v. 1855. 508. — Long. 0,2-0,6 mill. — Bagnères-de-Luchon.

Un peu plus petit que *montana*, ovale oblong, fortement atténué vers le bout, ferrugineux, pubescent de fauve. Antennes à peine de la longueur de la tête et du prothorax, assez épaisses, testacées, épaissies peu à peu vers l'extrémité, 8^e article un peu plus petit que les contigus, dernier ovale-allongé, plus court que les 2 précé-

dents. Tête inclinée, assez luisante, pubescence on ne peut plus fine, peu fournie, ponctuation très fine, rare. Prothorax transverse, près de 2 fois plus large que long, rétréci par devant, arrondi sur les côtés, échancré en devant, largement et profondément sinué à la base, angles postérieurs aigus, prolongés, à points obsolètes, moins fournis. Elytres peu plus étroites que le prothorax à la base, peu arrondies sur les côtés, fortement rétrécies vers le sommet, qui est subtronqué, pubescentes de fauve, ponctuation ruguleuse obsolète. Pattes testacées.

47. BATHYSCIA LAPIDICOLA Saulcy Ab. Per. Cavern. 1872. 22. Rép. 51. — Ariège.

48. BATHYSCIA INFERNA Dieck. Berl. Zeits. 1869. 348. Rép. 46. — Ariège.

49. BATHYSCIA DELAROUZEEI Fairm. Fr. Soc. Ent. 1860. 631*. 9. — Long. 1-1,5 mill. — Grotte Cova den Pey (Pyrénées-Orientales).

Ovale, roux-brun, assez luisant, soyeux de fauve, convexe; antennes sensiblement épaissies à l'extrémité, un peu plus courtes que la moitié du corps, 1-3 articles allongés, subégaux, 2° un peu plus épais que le 3°; antennes, palpes et pattes testacé-roux; prothorax rétréci par devant, avec les angles postérieurs subaigus; élytres ovales, très finement striguleuses, strie suturale profonde, entière, sommet obtusément arrondi.

Rappelle, pour la forme des antennes, le *Wollastoni*; mais ce dernier est plus petit et à élytres simplement ponctuées, non striolées, à strie suturale peu marquée.

50. BATHYSCIA NOVEFONTIUM La Brl. Fr. Soc. ent. 1872. 445*. 2. — Long. 3 mill. — Grotte de Neuf-Fonts, près d'Aulus (Ariège).

Testacé-roux, oblong, légèrement convexe, légèrement atténué par derrière; prothorax assez atténué en avant, médiocrement rétréci par derrière, atteignant sa plus grande largeur vers le quart postérieur; élytres transversalement striguleuses, strie suturale devenant obsolète, pattes et antennes plus allongées, les derniers articles allongés et à peine épaissis, tarsi antérieurs dilatés ♂, en patelle large.

Ressemble extrêmement aux *pyrenæa* et *Discontingyi*; un peu plus petit que *pyrenæa*, prothorax un

peu plus rétréci en avant, ayant sa plus grande largeur un peu plus en arrière ; convexité un peu plus forte ; antennes plus allongées, et chacun des articles visiblement plus long ; pattes plus longues, jambes plus étroites et plus allongées, *intermédiaires presque* droites ; tarses antérieurs ♂ plus dilatés. — Taille du *Discontignyi* et faciès semblable, largeur des antennes à peu près la même, mais articles de la massue moins épais, tarses antérieurs ♂ fortement dilatés.

51. BATHYSCIA PERIERI La Brûl. Fr. Soc. ent. 1872. 446*. 3. — Long. 2,8-3 mill. — Grotte de Lavelanet (Ariège).

Testacé-roux, oblong, peu convexe, assez atténué par derrière ; prothorax plus court, fortement atténué en avant, à peine ou nullement rétréci en arrière, à peine plus large au quart postérieur qu'à la base ; élytres transversalement strigieuses, strie suturale devenant obsolète, suture elle-même pour l'ordinaire déprimée ; antennes, ainsi que les pattes, allongées, grêles, presque semblables dans les 2 sexes, derniers articles légèrement épaissis ; tarses antérieurs dilatés ♂, en patelle.

Intermédiaire entre *novemfontium* et *Abeillei* ; prothorax plus atténué en avant et plus large à la base que le 1^{er}, moins que le 2^e ; antennes aussi longues que celles du *novemfontium*, mais articles 3-5 un peu plus grêles, 7, 9 et 10 un peu plus renflés, visiblement moins longues et moins grêles que celles de l'*Abeillei* ; élytres plus atténuées que chez l'un et autant que chez l'autre.

52. BATHYSCIA CURVIPES La Brûl. Fr. Soc. ent. 1872. 444*. 1. — Long. 3-3,2 mill. — Grottes de Rienfourcand et Lamparon près Bélesta (Ariège).

Testacé-roux, d'ordinaire plus clair, oblong, à peine convexe, atténué par derrière, ♂ bien plus large que ♀, presque déprimé au milieu du dos ; prothorax court, atténué en avant, assez fortement arrondi sur les côtés, à peine ou pas du tout rétréci à la base ; élytres marquées de strigosités transverses, substriées longitudinalement surtout ♂, strie suturale un peu plus visible que les autres, suture ordinairement déprimée, antennes assez menues, allongées ♂, du tiers de la longueur du

corps, ♀ visiblement plus courtes, peu épaissies à l'extrémité. Pattes allongées et assez robustes; jambes intermédiaires ♂ assez fortement, postérieures plus fortement courbées en dedans, ♀ presque droites, tarses antérieurs ♂ dilatés en patelle.

Se reconnaît aisément à la courbure des 4 jambes postérieures, antennes bien plus longues que celles du *pyrenæa*, 5-7 articles visiblement allongés et moins épais, 9-10 à peu près de la même épaisseur, et à peine plus allongés que dans cette espèce. Les stries ♀ sont souvent plus ou moins effacées, alors il est fort difficile à distinguer du *Perieri*.

Var. *subcurvipes* Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878. Sépar. 14. — Grotte de Nébias (Aude).

Distinct du *curvipes* par son corps plus allongé, moins atténué proportionnellement et les jambes ♂ courbées moins fortement et seulement après leur milieu.

Var. *subrectipes* Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878. Sépar. 14. — Grotte de Belvis (Aude).

Très voisin, mais distinct par les articles antennaires sensiblement moins allongés et plus dilatés, surtout les derniers.

53. BATHYSCIA PANDELLEI Ab. Per. Cat. Gers. 1883. App. I. p. 2*. — Long. 2,5 mill. — Grotte d'Aurouse, mont Ferrier (Ariège).

Testacé-fauve, allongé, peu convexe, fort atténué par derrière, strie suturale à peine visible, peu enfoncée, suture déprimée; élytres à très fines stries transverses; antennes très allongées, atteignant le milieu des élytres, 7^e article peu renflé dans les deux sexes; tarses antérieurs ♂ dilatés en patelle. — Se rapproche beaucoup, par la forme des *curvipes*, *subcurvipes* et *subrectipes*, mais ces trois espèces, plus grandes, au lieu d'avoir les jambes intermédiaires très peu courbées et les postérieures droites dans les deux sexes, les ont très courbées, ♂ surtout. *Hecatæ* Ab. Per. est encore plus voisin, mais il est plus convexe, ses antennes sont plus courtes et plus épaissies, et les tarses antérieurs ♂ sont précisément de la largeur de l'extrémité de la jambe sans être plus larges.

54. BATHYSCIA PIOCHARDI Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1873. xcviu*.
Long. 2,8 mill. — Grotte de La Bastide de Sérrou (Ariège).

Testacé-brun, ovale, peu convexe, peu atténué par derrière, strie suturale peu visible, suture déprimée; élytres marquées de stries transverses, pattes et antennes allongées, celles-ci assez épaisses au bout, articles 7, 9 et 10 ♀, 5, 6, 7, 9 et 10 ♂ médiocrement renflés; tarses antérieurs ♂ fortement dilatés en patelle. — Très voisin du *Saulcyi*, s'en distingue par sa taille plus avantageuse, son prothorax plus visiblement sinué à la base; ♂ les tarses antérieurs proportionnellement plus allongés, les articles des antennes plus massifs, mais moins élargis, les jambes antérieures moins élargies à l'extrémité, moins courbes et garnies sur leur tranche externe d'épines plus nombreuses et plus apparentes.

55. BATHYSCIA HERMENISIS Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1873. xcviu*.
— Long. 2,8 mill. — Grotte de Lherm (Ariège).

Testacé-roux, assez convexe, atténué par derrière, strie suturale peu marquée, suture déprimée, élytres à stries transverses, antennes peu allongées, ainsi que les pattes, 7, 9 et 10 articles renflés. — ♂ inconnu. — Se distingue des *Piochardi* et *Saulcyi* par son corps plus convexe et moins large, et la forme très tranchée des antennes, sensiblement plus courtes, leurs articles plus dilatés, ceux de la massue plus courts, 8° surtout plus court et plus large.

56. BATHYSCIA CRASSICORNIS La Brûl. Fr. Soc. ent. 1872. 447*. 4.
— Long. 2,2 mill. — Grotte de Peyrounard près du Mas d'Azil (Ariège).

Testacé-roux, oblong, assez convexe, légèrement atténué par derrière; prothorax atténué par devant, légèrement rétréci par derrière, côtés arrondis; élytres transversalement strigieuses, strie suturale devenant obsolète, suture elle-même déprimée; antennes égalant 2 tiers de la longueur, articles 5-7 et 9-10 fortement renflés ♂; pattes assez allongées, tarses antérieurs fortement dilatés ♂, en patelle.

Taille du *clavata*, et presque de même forme, paraît toutefois un peu plus convexe; s'en distingue par les

antennes ♂ un peu plus courtes, à articles 5, 6, 7, 9 et 10 visiblement plus courts et encore plus renflés.

57. BATHYSCIA OVIFORMIS La Brûl. Fr. Soc. ent. 1872. 447*. 5. — Long. 2 mill. — Grotte du Ker près Massat (Ariège).

Testacé-roux, régulièrement ovale, convexe, peu à peu atténué par derrière; prothorax rétréci par devant, à peine ou nullement rétréci par derrière, côtés arrondis sous la même courbe que les élytres; élytres à strigosités transverses distinctes, strie suturale presque nulle, suture déprimée; antennes atteignant 2 fois le tiers de la longueur, 5-7 articles peu épaissis ♂, presque semblables ♀, 8° petit, à peine 1 1/2 fois plus long que large, 10° un peu plus long que le 8°, formant avec 9 et 11 une massue peu épaisse; pattes assez allongées; tarses antérieurs ♂ dilatés en patelle. — Diffère du *clavata* par sa taille plus petite, sa forme plus régulièrement ovalaire, un peu moins allongée et plus convexe; son prothorax pas rétréci par derrière, et formant une même courbe avec les élytres; antennes notablement plus grêles et un peu moins longues, 5°, 6° et 7° articles beaucoup moins renflés ♂, à peine différents de ceux de ♀; 8° notablement plus court, 9-11 aussi un peu moins allongés.

58. BATHYSCIA LUCIDULA Delar. Fr. Soc. ent. 1860. xxvii*. — Long. 2-2,3 mill. — Grotte des Demoiselles près Montpellier (Hérault).

Ovale, très convexe, très atténué en arrière, forme générale de l'*ovata*; brun-rougeâtre, luisant, couvert d'une pubescence fauve, grosse, longue et peu serrée; antennes assez fortes, atteignant la base du prothorax, grossissant sensiblement vers l'extrémité, 7° article moitié plus long et plus épais que le précédent, 8° moitié plus petit que le suivant. Prothorax très convexe, deux fois aussi large que long, peu sinué à la base, angles postérieurs aigus mais peu prolongés en arrière; punctuation très fine et très écartée. Elytres très convexes, très atténuées et à peine tronquées en arrière, brillantes comme le prothorax, quoique couvertes d'une très forte punctuation, transversalement confluyente et formant ainsi des espèces de stries irrégulières; une strie suturale très fortement marquée, commençant un peu au-dessous de

l'écusson, d'abord rapprochée de la suture, puis s'en écartant et enfin venant se confondre avec elle à l'extrémité de l'élytre. — Se distingue au premier coup d'œil du *meridionalis* et des espèces voisines, par sa forme large courte et convexe, son aspect brillant et sa strie suturale.

59. BATHYSCIA GALLOPROVINCIALIS Fairm. Fr. Soc. ent. 1860. 631*. 8. — Long. 3 mill. — Hyères (Var).

Ovale-elliptique, roux-brun, assez luisant, poilu de roux; antennes plus longues que la moitié du corps, poilues, à peine épaissies au bout, 2^e article sensiblement plus petit que le 3^e; prothorax rétréci en avant, angles postérieurs obtus; élytres ovales, très finement pointillées, strie suturale profonde, suture élevée, sommet arrondi subtronqué.

60. BATHYSCIA ASPERULA Fairm. Fr. Soc. ent. 1857. 731*. 7. — Long. 1,3 mill. — Pyrénées ?

Ovale, subdéprimé, roussâtre, assez luisant, pubescent de gris, prothorax à peine plus large que les élytres, très finement ponctué; élytres atténuées vers le sommet, densément et finement couvertes d'aspérités, mais non de strigosités transversales, strie suturale nulle. — Forme et couleur du *Schiædtei*, mais beaucoup plus petit, moins convexe, à pubescence bien moins forte et moins serrée. Prothorax à peine plus large que les élytres, le bord postérieur embrassant la base de celles-ci; ponctuation extrêmement fine et peu serrée. Elytres convexes, à fines aspérités comme celles d'une râpe, serrées et faisant paraître la surface densément ponctuée, mais ne formant pas de rides transverses; pas de strie suturale. Tarses moins grêles que ceux du *Schiædtei*.

61. BATHYSCIA HECATÆ Ab. Per. Toul. Soc. Hist. nat. 1878. Sépar. 15*. — Long. 1,8 mill. — Grotte d'Espezel (Aude).

Brun-testacé, allongé, assez convexe, très atténué postérieurement, strie suturale à peine visible, suture déprimée, élytres transversalement striolées, antennes et pattes allongées, celles-là avec leurs articles 5, 7, 9 et 10 dilatés ♂, tarses antérieurs dilatés ♂.

Très distinct du *curvipes* par sa très petite taille, son

corps beaucoup plus convexe, et la dilatation du 5^e article des antennes ♂.

62. BATHYSCIA CORSICA Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1875. 216*. 4. — Long. 1,2-1,8 mill. — Corse.

Testacé-ferrugineux, ovale, fort convexe, atténué par derrière, strie suturale nulle, suture déprimée à la base. Elytres marquées de légères stries convexes. Antennes et pattes très courtes, articles sensiblement plus épais, formant une massue, tarses antérieurs peu dilatés ♂, ne formant pas de patelle. Elytres à sommet moins acuminé ♂. Le *Doriæ* paraît s'en rapprocher beaucoup, mais il est plus court et plus sphérique, et il a une strie suturale bien visible.

63. BATHYSCIA AUBEI Kiesw. Stet. Zeit. 1850. 223. — Fr. Soc. ent. 1851. 394*. — Milr. Vieñ. Zool. Bot. Ver. v. 1855. 508. — Long. 0,6 mill. — Près de Toulon, sable d'un nid de *Pompylus*.

Ovale-allongé, subparallèle, pas élargi en devant, ferrugineux, pubescent. Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, moins grêles, peu à peu épaissies vers l'extrémité, 8^e article plus petit que les contigus, dernier ovale, 2 fois plus court que les deux précédents. Tête défléchie, luisante, à pubescence plus épaisse. Prothorax transverse, 2 fois plus large que long, rétréci en avant, arrondi sur les côtés, échancré en devant, largement sinué à la base, avec les angles postérieurs aigus, saillants, peu convexe, à points fins, serrés, obsolètes. Elytres à peine plus étroites à la base que le prothorax, subparallèles sur les côtés, à peine rétrécies vers le sommet, qui est tronqué, peu convexes, très finement alutacées, une strie suturale raccourcie devant et derrière. — Facile à distinguer par sa figure longue, parallèle et peu convexe, ainsi que par sa strie suturale très remarquable.

64. BATHYSCIA OVOIDEA Fairm. Stet. Zeit. 1869. 231*. — Long. 2 mill. — France méridionale.

Brièvement ovale, convexe, roux-testacé, fauve soyeux luisant; tête et prothorax très finement réticulés; élytres atténuées en arrière, faiblement ruguleuses, assez brusquement arrondies au bout, strie suturale nulle; prothorax largement arrondi en devant, côtés rétrécis en courbe

antérieurement; antennes assez fortes, articles 3-6 sub-égaux, grêles, les 5 derniers assez épais, 7^e plus long que le 9^e, 9^e et 10^e carrés.

65. BATHYSCIA EPURAEOIDES Fairm. Stet. Zeit. 1869. 231*. — Long. 1,3 mill. — France méridionale.

Oblong, déprimé en dessus, légèrement atténué postérieurement, testacé, soyeux de fauve, finement et densément couvert de réticulations rugueuses; prothorax assez abruptement arrondi en avant, presque plus large que les élytres; élytres oblongues, atténuées graduellement et légèrement à partir de la base, subtronquées en courbe au bout, strie suturale raccourcie devant et derrière; articles des antennes 3-6 égaux, 8^e transverse, peu plus étroit, 9^e et 10^e transverses, 11^e oblong, parallèle, à pointe acuminée. — Diffère d'*Aubei* par sa stature plus grande; son corps plus déprimé, son prothorax moins élargi, ses élytres plus tronquées au bout, et sa strie suturale à peine marquée.

66. BATHYSCIA SUBALPINA Fairm. Stet. Zeit. 1869. 231*. — Long. 2 mill. — Alpes françaises.

Ovale oblong, déprimé en dessus, légèrement atténué postérieurement, testacé, soyeux de fauve, très finement réticulé-rugueux; prothorax rétréci en avant, arqué sur les côtés, presque plus large que les élytres; élytres oblongues, à peine atténuées par derrière, arrondies au sommet, strie suturale à peine marquée au milieu et de chaque côté une courte strie très obsolète; articles des antennes 3-6 peu grêles, légèrement épaissis vers la massue, qui n'est pas abrupte, 8^e article plus court mais à peine plus étroit; 9^e et 10^e un peu en carré transverse. — Diffère d'*Aubei* par sa stature plus grande, son corps plus déprimé, son prothorax moins ample, plus rétréci en avant; — d'*epuræoides* par sa stature plus grande, son prothorax plus rétréci en avant et l'angle sutural plus arrondi.

67. BATHYSCIA SIMONI Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1875. cxcix*. — Long. 1,4 mill. — Au Lioran (Cantal), dans les mousses.

Testacé-roux, convexe, élytres allongées atténuées par derrière, strie suturale nulle; antennes et pattes courtes;

prothorax et élytres rugueux et densément pointillés. Tarses antérieurs ♂ fortement dilatés, mais non en patte. — Diffère des *Bathyscia* français de même taille, du *Wollastoni* avec lequel il a le plus de rapports, par la ponctuation bien plus forte dans celui-ci, sa strie suturale bien visible, et ses antennes plus massives, leur dernier article 2 fois aussi long que le précédent. — Chez les *Schiædtei* et *Grenieri* la ponctuation est tout autre, beaucoup plus fine et formée de strioles transverses nettes et bien accusées; l'*ovata* a le prothorax beaucoup moins large, le corps plus convexe, les tarses antérieurs à peine plus dilatés ♂ que ♀. — L'*Aubei* a une strie suturale bien visible; sa pubescence est si fine qu'elle lui donne un air pruineux et ses élytres sont tronquées postérieurement.

68. BATHYSCIA TARISSANI Bedel, Fr. Soc. ent. 1878. 74'. — Long. 3,5 mill. — Drôme : grotte de Peyrus.

Tout entier d'un roux testacé, oblong, subatténué postérieurement, subdéprimé sur le dos; antennes et pattes allongées; base du prothorax droite au milieu, angles postérieurs couverts de légères aspérités, fort prolongés en arrière; élytres couvertes d'aspérités serrées, sans strioles transverses; strie suturale marquée. ♂ Tarses antérieurs dilatés, patelliformes.

L'un des plus grands du genre, remarquable par ses angles postérieurs fortement prolongés en arrière et ses élytres sans strioles transverses.

69. BATHYSCIA VILLARDI Bed. Fr. Soc. ent. 1884. Bul. 75*. — Long. 3,5-3,8 mill. — Grotte du Bugey (Ain).

Roux, luisant, ample, ovale atténué par derrière, un peu déprimé sur le dos, antennes et pattes grêles; tous les articles des antennes allongés, 8° à peine d'un tiers plus court que les adjacents. Prothorax assez court, élargi, côtés fortement courbés, angles postérieurs aigus, prolongés sur les épaules; presque lisse sur le disque et la partie antérieure. Elytres pointillées-râpeuses densément et finement à la base, éparsement et plus fortement au sommet qui est plus luisant, strie suturale marquée. — ♂ articles 1-4 des tarses antérieurs pattelliformes.

Silphides de l'Anc.-M. — 1884.

3

Voisin du *Tarissani* et formant avec lui un groupe à part, caractérisé par sa grande taille; les angles postérieurs du prothorax prolongés sur les épaules, et les élytres sans stries transverses. Il se distingue de celui-ci par sa forme élargie, son aspect luisant, ses élytres à ponctuation moins fine; encore plus rapée, très serrée en avant, plus forte et très clairsemée vers le sommet.

70. BATHYSCIA CHARDONI Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1875. 215*. 1. — Long. 2,5 mill. — Grotte d'Axat près Narbonne (Aude).

Testacé-brun, ovale, convexe, brièvement atténué par derrière, strie suturale non visible, suture déprimée, élytres à stries transverses, antennes allongées, ainsi que les pattes, articles 7, 9, 10, 11 ♀, 6 et suivants ♂ renflés, tarsi antérieurs médiocrement dilatés ♂, ne formant pas de patelle.

Voisin de *Saulcyi*, il en diffère, ainsi que tous les *Bathyscia* pyrénéens, par sa convexité et sa forme plus trapue. Ses antennes atteignant la moitié du corps, l'éloignent des *Schiædtei*, *inferna*, etc.

71. BATHYSCIA LINDERI Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1875. 215*. 2. — Long. 1,8 mill. — Grotte de St-Martin-d'Ardèche.

Ferrugineux, ovale, convexe, atténué par derrière, strie suturale non visible, suture à peine déprimée à la base, élytres marquées de légères stries transverses, antennes courtes, ainsi que les pattes, articles densément poilus, 7, 9, 10 et 11 articles ♂, épais, tarsi antérieurs peu dilatés, ne formant pas de patelle.

72. BATHYSCIA MAYETI Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1875. 215*. 3. — Long. 1,8 mill. — Grotte de St-Martin-d'Ardèche.

Testacé-brun, ovale, très convexe, surtout sur le prothorax, brièvement atténué par derrière, strie suturale non visible, suture à peine déprimée à la base, élytres ruguleuses, antennes courtes, ainsi que les pattes, articles à poils peu nombreux, épaissis comme dans le *Lindéri*, les tarsi aussi.

Ressemble fort au *Lindéri*, dont le distinguent sans peine sa forte convexité, la granulation de ses élytres et ses antennes parcimonieusement velues.

73. BATHYSCIA ALETINA Ab. Per. Cat. Gers. 1883. App. 1. p. 3^e. — Long. 2,2-2,5 mill. — Grotte d'Alet (Aude).

Testacé-fauve, peu allongé, à peine convexe, atténué par derrière; strie suturale peu enfoncée, à peine visible, suture élevée mais avec ses bords déprimés; élytres marquées de très fines strioles transverses; antennes allongées, atteignant le tiers des élytres, 7^e article fortement renflé dans les 2 sexes; tarses antérieurs ♂ dilatés en patelle.

L'espèce la plus voisine est *Chardoni*, de la grotte d'Axat, mais celui-ci est plus convexe et se reconnaît tout de suite à sa suture déprimée. *Proserpinæ* lui ressemble aussi beaucoup par la taille et les proportions, mais il est aussi plus convexe, sa sculpture est plus grossière, les articles de ses antennes sont plus noueux, et ses tarses antérieurs sont encore plus dilatés.

74. BATHYSCIA GROUVELLEI Ab. de Per. Rev. d'Ent. 1882. 17. 2^e. — Long. 2 mill. — Alpes-Maritimes, près Nice, à 200 mètres.

Même taille, même forme que *ovoidea*, dont il diffère par la couleur brunâtre, par ses antennes plus massives, par ses élytres à peine moins pointues au sommet, marquées d'une strie suturale profonde et entière, par les tarses antérieurs ♂ dilatés beaucoup plus fortement, sans qu'ils égalent la largeur de la jambe au sommet, par ses jambes intermédiaires armées à leur sommet externe de 5 longues épines, les 4 dernières implantées par paire et fortement divergentes; enfin par son corps plus brillant, ce qui provient d'une sculpture moins dense.

75. BATHYSCIA BREVICOLLIS Ab. de Per. Rev. Soc. Française d'Ent. 1882. 19^e. 5. — Long. 0,6 mill. — Saint-Martin de Lantosque; mousses.

Exactement pareil à l'*Aubei*, dont il diffère uniquement par sa couleur brune, son prothorax plus court; les jambes postérieures ♂ droites et les tarses antérieurs beaucoup moins larges que le sommet de la jambe, c'est-à-dire plus minces et plus longs que chez l'*Aubei*; ce dernier caractère le sépare de l'*epuræoides*. Il est en outre sensiblement plus convexe que ses deux congénères, et ses élytres sont tronquées au sommet.

76. BATHYSCIA GESTROI Frm. Gen. Mus. Civ. III. 1872. 55*. — Long. 2 mill. — Grotte près d'Ulassai (Sardaigne), sous un Rhinolophe mort.

Ovale oblong, fort convexe, très atténué par derrière; testacé, luisant, pubescent de fauve, couvert de points râpeux denses et très fins; antennes pâles, grêles, pas plus courtes que la moitié du corps, 1-2 articles subégaux, 3^e article plus long que le 2^e. Prothorax presque conique, angles postérieurs plus prolongés en arrière. Élytres rétrécies vers l'extrémité presque dès la base, sommet obtus, strie suturale distincte postérieurement à partir du milieu. — Assez voisin du *speluncarum*, mais distinct par son corps plus convexe, ses élytres très atténuées par derrière, 3^e article des antennes plus long et sa strie suturale marquée.

77. BATHYSCIA DAMRYI Ab. de Perr. Soc. ent. 1879. IX. 3*. — Long. 1 mill. — Sardaigne.

Testacé-brun, ovale-oblong, convexe, à peine atténué postérieurement, strie suturale subobsolette, élytres subparallèles, peu luisantes, marquées de strioles transverses, antennes et pattes très courtes, tarsi antérieurs dilatés ♂, patelliformes.

Voisin du *corsica* Ab. Per.; il en diffère par sa taille plus petite, ses élytres moins cunéiformes, son prothorax moins large et plus allongé, etc.

78. BATHYSCIA MIALETENSIS Ab. de Per. Fr. Soc. ent. 1879. IX. 4*. — Long. 1,8 mill. — Gard : grotte de Mialet.

Brun, brièvement ovale, très convexe, fort atténué postérieurement, strie suturale nulle, élytres luisantes, avec de légères strioles transverses, antennes et pattes courtes, tarsi antérieurs dilatés et patelliformes ♂.

Lucidula est la seule espèce française qui ait la même forme générale; mais elle est beaucoup plus grande et ses articles antennaires sont beaucoup plus allongés.

79. BATHYSCIA DESTEFANII Rag. Nat. Sic. I. 1881. 6*. pl. 1. f. 5, 6. Long. 2,5 mill. — Sicile : Navurra près Altavilla, sous les pierres, en janvier.

Brun-testacé, recouvert d'une pubescence assez forte d'un jaune gris. Antennes pas longues, arrivant à peine à la base des élytres, avec le 8^e article assez court. Pro-

thorax fort convexe. Élytres quasi sans strie suturale, caractère qui le fait distinguer facilement des espèces voisines, en outre de sa grandeur.

Se doit placer près du *tarsalis* Kiesw., auquel il ressemble beaucoup pour la taille et la pubescence, mais dont il diffère par les antennes moins longues.

80. BATHYSCIA KIESENWETTERI Dieck. Berl. Zeits. 1869. 350. Rép. 49. — Pyrénées.

81. BATHYSCIA DOHRNI Schauf. Stet. Zeit. 1862. p. 126*. — *Bonvouloiri* Schf. Zeits. 1861. p. 426. (*Quæstus*). — Long. 3,3; larg. 1,6 mill. — Pyrénées.

Convexe, testacé, soyeux. Tête et prothorax très finement ponctués, et finement pubescents de jaune comme tout le reste du corps. Prothorax très convexe, faiblement élargi derrière le milieu, arrondi en arc par devant, base droite, avec les angles un peu avancés par derrière, de sorte qu'ils forment un angle droit. Antennes un peu plus longues que les élytres, 2-7 presque d'égale longueur, 7^e élargi au bout, 8^e parallèle, 2/3 aussi long que le 7^e, 9-11 d'égale longueur, dernier en pointe. Écusson très petit, triangulaire. Élytres allongées, rétrécies par derrière à partir du milieu, régulièrement marquées de fines rides transverses, légèrement impressionnées à la base de chaque côté près de l'écusson; on observe aussi des vestiges de stries longitudinales.

Diffère du *Bonvouloiri* Duv. par ses élytres courtes, son pronotum convexe pulviniforme, mais surtout par sa base presque droite, dont les angles sont très peu saillants par derrière, de manière à former néanmoins un angle droit, tandis que dans le *Bonvouloiri* ils sont bien plus avancés en arrière et couvrent une partie des épaules; enfin, l'écusson est petit, et celui du *Bonvouloiri* est au moins 2 fois plus grand.

82. BATHYSCIA TRIANGULUM Sharp. Esp. Hist. nat. 1872. 268. Ab. xvii. 27. — Espagne nord.

83. BATHYSCIA VASCONICA La Brûl. Fr. Soc. ent. 1872. 448. 6*. — Long. 1,6-2 mill. — Grottes de la Pena de Orduna (Vittoria) Espagne.

Testacé-roux, densément vêtu d'une pubescence soyeuse brillante, ovale, très convexe, assez fortement atténué

par derrière ; prothorax court, près de 3 fois plus large que long, fort arrondi sur les côtés et très atténué en avant, non rétréci par derrière, échancré à la base ; élytres marquées de très fines strigosités transverses, strie suturale très fine, peu marquée, quelquefois tout à fait obsolète ; antennes menues, peu épaissies au bout, dépassant un peu le milieu de la longueur ♂, un peu plus courtes ♀, 8^e article à peine de moitié plus court, un peu plus étroit que le 9^e. Pattes médiocrement allongées, assez menues, jambes intermédiaires légèrement incurbées, surtout ♂ ; postérieures un peu sinuées ; tarsi antérieurs ♂ dilatés, un peu plus larges que l'extrémité du tarse en patelle. — Rappelle un peu le faciès de *l'inferna*, mais d'un tiers plus petit, pas tout à fait aussi convexe, et de forme un peu moins raccourcie ; les tarsi antérieurs dilatés ♂, les antennes plus larges, à 8^e article moins raccourci, l'en éloignent encore davantage.

84. BATHYSCIA CROTCHI Sharp. Esp. Hist. nat. 1872. 270. Ab. xvii. 28. — Espagne.

85. BATHYSCIA CISNEROSI Per. Arc. Rép. Hist. nat. 1872. 127. Ab. xvii. 17. — Espagne.

86. BATHYSCIA ARCANA Schauf. Stet. Zeit. 1861. 425*. (*Quæstus*) pl. 1. f. 1. — Long. 2,3 ; larg. 1,3 mill. — Grottes des monts Cantabres.

Ovale, convexe, ferrugineux, soyeux. Tête et prothorax très finement ponctués ; ce dernier, largement échancré à sa base avec 2 sinuosités très légères, angles postérieurs prolongés en pointe, dirigée en arrière, antérieurs infléchis, côtés fortement rétrécis en courbe par devant, finement rebordés, bord antérieur échancré. Antennes à 2^e article plus long que le 1^{er}, 4-6 d'égale longueur, 7^e élargi et plus grand que l'un des précédents, 8^e de même largeur, plus petit que le 9^e ou le 10^e, dernier aussi long que les 2 précédents ensemble. Écusson petit, triangulaire. Élytres rétrécies peu à peu par derrière, côtés faiblement arrondis, sommet arrondi. Tarsi et jambes postérieurs grêles et allongés.

87. BATHYSCIA PEREZI Sharp. Esp. Hist. nat. 1872. 269. Ab. xvii. 28. — Nord de l'Espagne.

88. BATHYSCIA ADNEXA Schauf. Stet. Zeit. 1861. p. 427*. pl. 1. f. 2. (*Quæsticulus*). — Long. 1,6 ; larg. 1 mill. — Grotte près Panés Nord de l'Espagne.

Ovale, convexe, brun-testacé, soyeux, luisant. Tête fortement enfoncée. Prothorax très convexe, très finement ponctué, fortement rétréci en avant au-delà du milieu, formant un demi cercle avec la portion de la tête très peu visible du dessus. Base très légèrement sinuée de chaque côté, angles postérieurs prolongés en arc par derrière, pointus, côtés droits jusqu'au milieu. Élytres aussi larges à la base que la base du prothorax, rétrécies par derrière, sommet large et obtus, finement ponctuées et plus densément garnies que le prothorax de poils gris-jaune fins, de chaque côté le long de la suture une fine ligne enfoncée, souvent aussi plus foncée, qui se rapproche par derrière. 1-2 articles des antennes prennent presque le quart de la longueur de l'antenne, subcylindriques, les 9 suivants moniliformes, 7, 9-11 sont 2 fois aussi forts que 3-6, 8° un peu plus faible que le suivant, court, 11° aussi long mais plus de 2 fois aussi large que le 1^{er}. Tarses antérieurs ♂ à 1^{er} et 2^e articles d'égale force, 2^e peu plus court, 3^e et 4^e ensemble aussi longs que le 1^{er}, arrondis ; 5^e aussi long que le 1^{er} et le 2^e ensemble. ♀ 1^{er} art. plus court que les 2 suivants ensemble, 4^e aussi long que le 2^e et 3^e réunis ; ongles courts. — Ressemble beaucoup au *Schiœdtei*, seulement il est plus petit, au contraire il est plus grand que l'*Aubei* Kiesw.

89. BATHYSCIA RUGOSA Sharp. Esp. Hist. nat. 1872. 271. Ab. xvii. 29. — Nord de l'Espagne.

90. BATHYSCIA UHAGONI Sharp. Esp. Hist. nat. x. 1881. 121. Ab. xvii. 29. — Nord de l'Espagne.

91. BATHYSCIA FLAVIOBRIGENSIS Uhag. Esp. Hist. Nat. x. 1881. 121*. — Long. 2-2,2 ; larg. 1-1,2 mill. — Grotte de San Roque, près de Bilbao ; juillet et août.

Ovale, fortement convexe, fortement et presque obliquement atténué par derrière, roux-testacé ou roux de poix, très finement ponctué, densément pubescent, soyeux, brillant ; antennes grêles, légèrement épaissies vers l'extrémité, articles médiocrement allongés, 3^e un peu plus court et plus étroit que le 2^e, 4-6 subégaux, 7^e légèrement

plus épais que celui-ci, 8° un peu plus court et plus étroit que le précédent, 9° à peine visiblement plus long que le 8°, 10° subégal, dernier oblong, près de deux fois plus long que le pénultième. Prothorax court, plus de deux fois plus large que long, très atténué en avant, fort arrondi sur les côtés, largement échancré à sa base. Élytres sans strigosités transverses, strie suturale ou obsolète ou peu marquée, à peine visible à la base. Pattes assez allongées, jambes intermédiaires légèrement incurbées dans les deux sexes. — ♂ Antennes plus longues, dépassant le milieu, jambes antérieures peu élargies, tarses de 5 articles, dilatés, distinctement plus larges que l'extrémité de la jambe. ♀ Antennes plus courtes, tarses antérieurs de 4 articles, simples.

Ressemble à *Cisnerosi* et a les mêmes proportions, mais il est plus convexe antérieurement, avec les élytres plus déclives et plus rétrécies vers l'extrémité, le 2° article des antennes est plus long et plus délié à sa base, les tarses antérieurs ♂ sont visiblement plus élargis. Pour la forme des élytres, il se rapproche du *triangulum*, mais en outre des autres caractères, sa taille 3 fois plus petite le distingue aisément. Il est aussi moindre, plus convexe, plus brusquement rétréci par derrière que *arcana*, *vasconica*, *Crotchi*, et que les espèces décrites ici; *Perezi* a les antennes plus courtes et plus robustes, leurs articles de proportions différentes.

92. BATHYSCIA MAZARREDOI Uhag. Esp. Hist. nat. x. 1881. 123°.

— Long. 2,5-2,6; larg. 1,2-1,4 mill. — Grotte de San Valerio, dans les monts près d'Elorrio; Espagne.

Ovale-oblong, convexe, assez fortement atténué en courbe par derrière, roux-testacé, très finement ponctué, densément vêtu d'une pubescence soyeuse, brillante; antennes grêles, peu épaissies vers l'extrémité, articles médiocrement allongés, 3° à peine plus court que le 2°, plus rétréci, 4-5 subégaux au 3°, 6° un peu plus court que les précédents, légèrement plus épais que le 7°, 8° plus de 2 fois plus petit que le 7°, obconique, 9° près de 2 fois plus grand que le 8°, et égal au 10°, dernier oblong, un peu plus long que le pénultième. Prothorax court, plus

de 2 fois aussi large que long, très atténué en avant, fortement arrondi sur les côtés, largement échancré à la base. Elytres à strigosités transverses très fines, sans strie suturale. Pattes assez allongées, jambes intermédiaires légèrement incurbées dans les deux sexes — ♂ antennes plus longues, atteignant ou même dépassant le milieu, jambes antérieures un peu épaissies, tarses de 5 articles, médiocrement dilatés, à peine plus larges que l'extrémité de la jambe; ♀ antennes plus courtes, tarses antérieurs de 4 articles, simples.

Très voisin de *vasconica*, dont le séparent sa forme moins ovale, ses élytres plus longues, ses antennes plus longues, avec l'article 8 plus court et les suivants un peu plus gros et moins cylindriques. — Plus voisin encore de *Crotchi*, même forme, taille égale et antennes de structure identique; dans celles-là le dernier article des antennes forme un ovale-oblong, dont les côtés offrent une courbe régulière, dans celui-ci il est pyriforme; les articles des tarses ♂ sont plus larges et plus transverses dans *Crotchi*, ils vont en décroissant jusqu'au 4^e dans *Mazarredoi*, au lieu d'être parallèles jusqu'au 3^e où ils se rétrécissent notablement. Enfin les élytres sont plus allongées dans le *Crotchi*.

93. BATHYSCIA FILICORNIS Uhag. Esp. Soc. Hist. nat. 1881. 113*.
Long. 2,5-2,7; larg. 1,2-1,5 mill. — Grotte du mont Serantes, près de Santurie (Espagne), en août.

Ovale, assez convexe, rétréci postérieurement, jauneferrugineux, assez brillant, à points fins et espacés, pubescence jaune, abondante, fine, soyeuse et dirigée en arrière. Tête avec les antennes très longues, déliées, comme filiformes, à peine plus grosses vers l'extrémité, garnies de poils fins et abondants, tous les articles plus longs que larges, 3^e et suivants parfaitement cylindriques et parallèles, sauf 7^e, 9^e et 10^e qui le sont moins, 1^{er} assez robuste, 2^e plus parallèle, un peu plus délié et légèrement plus court, 3^e de 1/3 plus court que 2^e, 4^e un peu plus long que le 3^e et égal au 5^e et au 6^e pour la forme et la longueur, 7^e aussi long ou à peine plus court que le 6^e, graduellement et très légèrement plus gros vers l'extré-

mité, qui paraît aussi plus visiblement tronquée que les articles précédents, 8° un peu plus court que le 7° et de forme analogue à celle du 6°, 9° légèrement plus court que le 7°, presque de la longueur du 8° et très peu plus long que le 10° et conformé comme celui-ci, mais paraît se rapprocher pour la structure plus du 7° que des autres; 11° aussi long et aussi épais que le 10° et plus ou moins terminé en pointe. Prothorax transverse, assez convexe, à peine plus de 2 fois plus large que long, très étroit vers le devant, où il est tronqué avec les angles antérieurs déclives, côtés arrondis, base droite et légèrement sinuée de chaque côté, pour former des angles aigus, avancés en arrière. Ecusson en triangle, transverse. Elytres assez convexes, déclives jusqu'au 5°, aussi larges à la base que le prothorax, un peu plus de 2 fois plus longues que larges, et graduellement rétrécies en courbe vers l'extrémité, à points fins et espacés, sans rides transverses, strie suturale à peine visible, généralement nulle, mais représentée par une ligne obscure. Pattes longues et assez fortes, jambes antérieures légèrement sinueuses, et dirigées vers le dehors, intermédiaires aussi un peu sinueuses à la base, puis un peu courbées en dedans; postérieures presque droites. Dessous très-finement ponctué et pubescent. — ♂ antennes dépassant le milieu, jambes antérieures plus robustes, leurs tarses de 5 articles, 1-3 épaissis, 1° à peine ou très peu plus large que l'extrémité de la jambe, 2 fois plus grand que le 2°; ♀ antennes plus courtes, jambes antérieures un peu plus déliées, tarses antérieurs de 4 articles simples.

Taille et forme de l'*inferna*, mais outre que celui-ci a ♂ les tarses antérieurs simples, les côtés du prothorax sont ici moins arrondis, les antennes beaucoup plus longues et la forme des articles est différente; leur structure se rapproche de celle du *triangulum*; il s'en distingue sans peine par la forme des élytres, plus courbées et plus rétrécies postérieurement, et particulièrement par la dilatation plus grande des tarses antérieurs.

94. BATHYSCIA SEEBOLDI Uhag. Esp. Hist. nat. x. 1881. 115*. — Long. 2,2-2,5; larg. 1,2-1,4 mill. — Grotte de la Magdalena de San Roque, autour de Bilbao (Espagne).

Ovale-oblong, convexe, fortement atténué en courbe par derrière, testacé-fauve, très finement ponctué, densément vêtu d'une pubescence soyeuse, brillante; antennes grêles, très légèrement épaissies vers l'extrémité, articles allongés, 3° un peu plus court et plus étroit que le 2°, 4-6 subégaux, 7° légèrement épaissi vers l'extrémité, subtronqué, 8° un peu plus court et plus étroit, 9° un peu plus long que le 8°, 10° à peine visiblement plus court que le précédent, dernier oblong, allongé. Prothorax court, 2 fois plus large que long, fort atténué en avant, arrondi sur les côtés, largement échancré à la base. Elytres sans strigosités transverses, strie suturale peu marquée, plus ou moins distincte ou obsolète. Pattes allongées, jambes intermédiaires légèrement incurbées dans les deux sexes. — ♂ antennes plus longues, dépassant le milieu du corps, jambes antérieures à peine épaissies, tarses de 5 articles, médiocrement dilatés, à peine ou un peu plus larges que l'extrémité de la jambe; ♀ antennes plus courtes, tarses antérieurs de 4 articles simples.

Presque de la taille du *stygia*, mais moins parallèle, plus large relativement vers la base des élytres et plus brusquement rétréci vers l'extrémité. — Un peu plus petit que *flicornis*, moins ovale, plus allongé, avec les élytres plus longues et plus étroites postérieurement, antennes légèrement plus robustes, leurs articles pas si déliés ni si longs. — Un peu plus grand et plus convexe que l'*arcana*, dont il est distinct, ainsi que du *vasconica*, par ses antennes bien plus longues et la proportion de leurs articles. — Moins oblong que *Crotchi*, qui a aussi les antennes bien plus courtes et plus robustes.

95. BATHYSCIA CANTABRICA Ubag. Esp. Hist. nat. x. 1881. 118*.
— Long. 2,2-2,5; larg. 1,2-1,5 mill. — Espagne : grotte de la Magdalena, de Arenaza (monts Galdanas), avec *Seeboldi*.

Ovale, convexe, assez fortement atténué en courbe par derrière, testacé-roux ou roux de poix, très finement ponctué, densément pubescent de soyeux brillant; antennes grêles, légèrement épaissies vers l'extrémité, articles médiocrement allongés, 3° un peu plus court et plus étroit que le 2°, 4-6 subégaux, 7° légèrement épaissi

vers le bout, subtronqué, 8° un peu plus court et plus étroit, 9° à peine distinctement plus long que le 8°, 10° un peu plus court que le précédent, dernier oblong, un peu plus allongé que le pénultième. Prothorax court, plus de 2 fois plus large que long, fort atténué en avant, fort arrondi sur les côtés, largement échancré à la base. Elytres sans strigosités transverses, strie suturale ou obsolette, ou peu marquée, à peine visible à la base. Pattes assez allongées, jambes intermédiaires légèrement incurbées dans les 2 sexes. — ♂ Antennes plus longues, atteignant le milieu ou le dépassant, jambes antérieures à peine épaissies, tarses de 5 articles, médiocrement dilatés, un peu plus larges que l'extrémité des jambes; ♀ antennes plus courtes, tarses antérieurs de 4 articles, simples.

Un peu plus grand et voisin pour la forme de *Schioedtei*, mais plus large, moins parallèle et plus brusquement rétréci vers l'extrémité, avec les élytres sans stries transverses, les antennes beaucoup plus longues, avec leurs derniers articles bien plus allongés. Plus court et plus large que *Seeboldi*, avec les antennes bien plus courtes et le prothorax plus transverse. Plus ovale et plus grand que *Cisnerosi*; plus ovale également que *arcana* et que *vasconica*, il se distingue du 1^{er} par le prothorax plus large, plus arrondi sur les côtés, les antennes plus grêles, avec le dernier article plus court, et du 2° qui a les mêmes organes moins longs, à articles moins allongés. Notablement plus grand, moins oblong, à antennes bien plus déliées que *Perezi*. Plus petit, moins triangulaire, avec les tarses antérieurs beaucoup moins élargis ♂ que *triangularis*.

96. BATHYSCIA TROPICA Ab. Per. Fr. Soc. Ent. 1881. ix. 2°. — Long. 1,5 mill. — Espagne : Carthagène, Murcie.

Brun, très brièvement ovale, très convexe et globuleux, atténué postérieurement, strie suturale nulle, élytres luisantes et densément ponctuées, sans stries, antennes et pattes courtes, tarses antérieurs ♂ légèrement dilatés, ne formant pas de patelle.

Remarquable par sa forme large et globuleuse, qui n'a rien de comparable dans tout le genre *Bathyscia*.

97. BATHYSCIA WOLLASTONI Janson Ent. An. 1857. 70. pl. 1. f. 8.
— Long. 2; larg. 1 mill. — Angleterre, France boréale.

Obovåle, assez convexe, roux-brun, antennes et pattes plus claires, vtu d'une fine pubescence grise, couche, assez paisse. Antennes allonges, minces, atteignant presque la base du prothorax, un peu paissies vers l'extrmit, 2^e article presque gal au 1^{er}, long, 3-6 trs petits, serrs, les 5 derniers graduellement paissis en massue, 8^e plus petit que ses 2 voisins, dernier en ovale oblong acumin. Prothorax trs finement pointill, comme la tte, large, convexe; cts arqus largis vers la base, fort rtrcis et abaisss en avant, bord apical lgrement chancr, avec les angles saillants obtus; bord basal largement chancr en arc, avec les angles projets embrassant les lytres. Ecusson en triangle large, pointill. Elytres rebordes sur les cts, attnues par derrire, termines en pointe arrondie, strie suturale trs fine obsolte avant le milieu, surface couverte d'un pointill acicul trs fin et trs serr, substrigueuses. ♂ Tarses antrieurs dilats; jambes postrieures droites.

98. BATHYSCIA PUSILLA Mots. Mosc. Bul. 1844. 175. — Weise Led. Cauc. 142*. — Long. 1,1 mill. — Caucase, Dumaniss, Katharinenfeld, sous les feuilles.

Facis du *tarsalis*, mais bien plus petit, un peu plus troit, d'un bruntre plus clair; antennes jaune-clair, 1^{er} et 2^e articles forts, 2^e presque plus long que le 1^{er} et aussi long que 3-5 ensemble, ceux-ci d'gale longueur, 6^e un peu plus court que le prcdent, 7^e, 9^e, 10^e et 11^e fortement paissis, 8^e à peine moiti aussi long et large que 7^e, dernier large et en pointe obtuse. Tte et prothorax couverts de points trs fins, carts, chagrins dans l'intervalle, peu densment pubescents, assez luisants. Prothorax 2 fois aussi large que long, bord basal sinu lgrement en devant de l'cusson, plus fortement avant les angles postrieurs, ceux-ci pointus et saillants par derrire. Elytres graduellement rtrcies de l'paule à l'extrmit, qui est arrondie sparment, ponctues un peu plus fortement que le prothorax, avec de fines strigosits transverses.

montana est plus court, avec les antennes plus épaisses et plus courtes, plus finement ponctué ; — *ovata* et *acuminata* sont bien plus larges et plus fortement ponctués ; — *byssina* est plus élargi postérieurement, a le 8^e article des antennes 2 fois plus long.

CATOPS (κατὰ, *en bas* ; ὄψ, *œil*) Payk. Fn. Suec. i. 1798. p. 342.

Choleva (χολεύω, *boîter*) Latr. Précis des caractères généraux, 1996.

— Gen. Crust. II. 1807. 26. — Hist. nat. III. 1804. — *Ptomaphagus*

(πτῶμα, *cadavre* ; φάγω, *manger*) Helwig).

Menton en carré transverse, un peu rétréci en avant ; languette de la largeur du menton à sa base, élargie et profondément échancrée en avant. Lobe interne des mâchoires terminé par un crochet corné ; palpes maxillaires sensiblement plus grands que les labiaux, leur 3^e article obconique, le 4^e bien plus menu, conique et acuminé ; 3^e article des palpes labiaux ovale, un peu plus long que le 2^e. Mandibules courtes, munies d'une dent à la base, arquées, acérées au bout, avec une dent subapicale. Labre court, arrondi, un peu sinué au milieu du bord antérieur. Tête inclinée obtuse ; yeux subarrondis, médiocres, non saillants. Antennes au moins de la longueur du prothorax, 4-6 articles de longueur variable, subcylindriques, les 5 derniers formant une massue, qui est tantôt si allongée et si menue qu'elle est à peine distincte, tantôt très bien marquée ; 8^e article plus court que le 7^e et le 9^e. Prothorax de forme variable. Elytres oblongues ou ovales, courbées en dessus. Pattes longues et grêles, les 4 1^{ères} articles (spécialement les 2 1^{ères}) des tarses antérieurs, quelquefois le 1^{er} des intermédiaires, dilatés ♂ et garnis en dessous de poils jaunes. Mésosternum quelquefois caréné. Corps oblong ou ovale, vêtu d'une très fine pubescence soyeuse.

Tableau synoptique des espèces de Catops (ex Murray).

A. Mésosternum simple.

B. Antennes presque filiformes et incontestablement plus longues que le prothorax.

C. Prothorax plus large vers la base qu'en devant.

9. *agilis* Illig. fig. Eur^a. méd.

- C'. Prothorax pas plus large vers la base qu'en devant.
- D. Ponctuation grosse ; pubescence longue et éparse ; élytres ventruës. 1. *spadiceus* Sturm. fig. Eur. méd.
- D'. Ponctuation fine ; pubescence dense et courte ; élytres allongées, étroites.
- E. Bords du prothorax plus pâles que le milieu.
3. *angustatus* F. fig. Eur.
- E'. Bords du prothorax pas plus pâles que le milieu.
3. v. *cisteloides* Frœhl. Eur. méd.
- B'. Antennes plus ou moins en massue, pas ou très peu plus longues que le prothorax.
- C. Base du prothorax rentrée en dedans, ne formant pas de ligne continue avec les élytres.
- D. Couleur de la pubescence grise et brune, ou jaune terne sur le pronotum, poils jaunâtres sur la base et les bords des élytres manquant ou à peine sensibles, et sans inflorescence sur les élytres.
- E. Antennes allongées et subfiliformes, non en massue épaisse.
- F. Elytres strigieuses transversalement.
13. *acicularis* Kr. ESic.
- F'. Elytres non strigieuses transversalement.
- G. Antennes avec l'extrémité pâle.
31. *picipes* F. fig. Eur.
- G'. Antennes avec l'extrémité pas plus pâle que le reste.
- H. Angles postérieurs du prothorax acuminés par derrière.
- I. Angles postérieurs fortement prolongés ; antennes entièrement ferrugineuses.
32. *meridionalis* Aubé FE.
- I'. Angles postérieurs légèrement prolongés ; antennes plus obscures vers l'extrémité.
41. *nigricans* Spenc. fig. Eur^a. méd.
- H'. Angles postérieurs du prothorax non acuminés par derrière. 36. *fuscus* Panz. fig. Eur.
- E'. Antennes plus courtes et plus en massue.
- F. Antennes en massue très épaisse.
49. *chrysomeloides* Panz. fig. FA.
- F'. Antennes en massue moins forte.

- G. Insecte délié et étroit. 44. *morio* F. fig. Eurⁿ. méd.
 G'. Insecte plus court et plus trapu.
 42. *coracinus* Keln. Eur. méd.
 D'. Couleur de la pubescence jaune-clair sur le pronotum, bleu-brunâtre ou pourpre sur les élytres, avec des poils jaunâtres sur la base et les côtés des élytres.
 E. Antennes comparativement longues et subclaviformes. 46. *nigrata* Er. fig. Eurⁿ. méd.
 E'. Antennes en massue épaisse.
 F. Pronotum profondément ponctué.
 53. *neglectus* Kr. FA.
 F'. Pronotum plus ou moins granuleux ou ridé transversalement.
 G. Prothorax presque parallèle sur les côtés.
 45. *quadraticollis* Aubé F.
 G'. Prothorax non parallèle sur les côtés.
 H. Pronotum à rides transverses faibles.
 I. Prothorax court, transverse, pas large ; élytres ordinairement très longues.
 51. *tristis* Panz. fig. Eur.
 I. Prothorax large ; élytres modérément longues.
 47. *v. grandicollis* Er. fig. FA.
 H'. Pronotum granuleux.
 52. *v. rotundicollis* Keln. Eurⁿ. méd.
 C'. Base du prothorax formant avec les élytres un profil continu ou à peu près.
 D. Tarses intermédiaires élargis ♂.
 E. Antennes en massue épaissè.
 F. Prothorax pas plus étroit à la base que les élytres.
 56. *fumatus* Spence. Eurⁿ. méd.
 F'. Prothorax légèrement plus étroit à la base que les élytres. 54. *alpinus* Gyl. fig. Eurⁿ. méd.
 E'. Antennes subclaviformes.
 F'. Prothorax à angles postérieurs arrondis.
 59. *brevicollis* Kr. Sic.
 F'. Prothorax à angles postérieurs non arrondis.
 G. Prothorax à bords latéraux sinués réfléchis.
 35. *depressus* Mur. F.
 G'. Prothorax à bords latéraux arrondis.

- H. Prothorax à angles postérieurs fortement saillants en arrière, formant un angle aigu ; élytres non distinguées par une pubescence soyeuse.
38. *umbrinus* Er. fig. FAR.
- H'. Prothorax à angles postérieurs légèrement saillants en arrière, non aigus mais droits ; élytres distinguées par une pubescence soyeuse qui, sous différents jours, montre une légère bandes croisant. 38. *scitulus* Er. fig. Eurⁿ. méd.
- D'. Tarses intermédiaires non dilatés ♂.
- E. Prothorax pas plus large à la base que les élytres.
- F. Elytres plus de 3 fois plus longues que le prothorax. 12. *transversostratus* Mur. Port.
- F'. Elytres pas plus de 3 fois plus longues que le prothorax.
- G. Marge basale du pronotum sinuée.
18. *velox* Spenc. fig. E.
- G'. Marge basale du pronotum droite.
- H. Angles postérieurs du prothorax droits.
21. *badius* Sturm. fig. A.
- H'. Angles postérieurs du prothorax obtus.
- I. Insecte arrondi. 68. *anisotomoides* Spenc. fig. E.
- I'. Insecte plus allongé.
25. *brunneus* Sturm. fig. Hong.
- E'. Prothorax légèrement plus large à la base que les élytres.
22. *præcox* Er. fig. E.
- A'. Mésosternum caréné.
- B. Corps poli et luisant. 61. *lucidus* Kr. Dalm.
- B'. Corps non poli.
- C. Elytres non tronquées.
- D. Elytres acuminées. 14. *strigosus* Kr. A.
- D'. Elytres non acuminées. 69. *colonoïdes* Kr. Eurⁿ.
- C'. Elytres tronquées.
- D. Antennes avec l'article apical pâle.
65. *varicornis* Rosh. AR.
- D'. Antennes avec l'article apical non pâle.
- E. Antennes fortement en massue, avec la base pas plus pâle que le reste. 63. *validus* Kr. Hong.
- E'. Antennes médiocrement en massue, base plus pâle que la massue. 66. *sericeus* F. fig. E.

Choleva Latr.

1. CATOPS SPADICEUS Sturm Deuts. Ins. xiv. 1839. 11. pl. 273. f. B. — Kr. Stet. Zeit. xiii. p. 399. 1. — Mur. Mon. Cat. 21*. 1. f. 4. — Long. 4,7-5,6 mill. — France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Russie, Kiew.

Oblong, noir de poix, élytres brun-marron, plus foncé sur la moitié postérieure, les exemplaires immatures sont d'un brun-jaunâtre. Antennes assez longues, à peine aussi longues que la moitié du corps, brun-rouge, les 5 derniers articles plus obscurs, 1^{er} un peu plus fort, 3^e un peu plus longs que ses adjacents, 2^e, 4^e et 5^e d'égale longueur, 6^e un peu plus court que 5^e et aussi long que 7^e et 9^e, 8^e un peu plus court que 9^e, lui-même un peu plus long que 10^e, dernier un peu plus long que le précédent, fortement acuminé. Tête brun de poix, parties de la bouche d'un rouge ferrugineux; ponctuation fine et éparse sur le vertex, plus forte et serrée sur le front. Prothorax plus étroit que les élytres, un peu convexe, plus large que long, côtés arrondis, ayant leur plus grande largeur avant le milieu, plus rétréci par devant que par derrière, angles postérieurs arrondis-obtus, base tronquée-droit, la moitié postérieure latérale est largement rebordée-réfléchie, présentant vu d'en haut un rebord élevé et une ligne enfoncée; dessus fortement et profondément ponctué, densément vêtu d'une pubescence jaune d'or, marqué au milieu d'une ligne enfoncée, occupant le tiers de la longueur. Ecusson triangulaire, ponctué, brun. Elytres assez convexes, dilatées après l'épaule en ventre, avec sa plus grande largeur avant le milieu, stries assez légères, mais très distinctes, ponctuation forte et un peu rugueuse; pubescence longue, moins serrée que dans les espèces voisines. — ♂ Trochanters postérieurs développés en ciseau et en gouge.

2. CATOPS PUNCTATUS Bris. Fr. Soc. Ent. 1866. 364. Ab. Rép. 55. (*Choleva.*) — Reynosa (Espagne).
3. CATOPS ANGUSTATUS F. Syst. El. II. 20. 23. (*Gistela*). — Er. Mark. Brand. I. 233. 1. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 5. pl. 272. fig. m. — Fairm. Fr. Fn. 299. 1. — Mur. Mon. Cat. 12*. 1. — *agilis* F. Syst. El. II. 20. 27. — *elongatus* Payk. Fn. Suec. I. 345. 3. — Gyl. Ins. I. 281. 16. — *rufescens* Illig. Käf. Pr. 87. 1. — *oblongus*

Latr. Gen. Crust. II. 27. 1. Spence. Lin. Transac. XI. 138. 1. — Long. 5,6 mill. — Toute l'Europe, Sibérie.

Étroit allongé. Tête noire; parties de la bouche et antennes brun-ferrugineux. Antennes de plus de la moitié de la longueur du corps, 1^{er} article plus fort et aussi long que 2, 3 près de deux fois aussi long que les adjacents, 8 un peu plus court que 7 et 9, qui sont de même largeur, dernier plus long que le précédent, long et acuminé. Tête à points fins et écartés. Prothorax peu plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur avant le milieu, rétréci par derrière; angles postérieurs presque droits à pointe plus ou moins obtuse, dessus couvert de points serrés et fins ♂, plus écartés ♀, finement pubescent; légèrement impressionné dans sa largeur au milieu et aux angles extérieurs; brun de poix, brun ferrugineux aux bords, rarement sur toute sa surface. Elytres légèrement striées, très finement et densément ponctuées, finement pubescentes de soyeux, brun-ferrugineux. Dessous noir de poix, les segments de l'abdomen bordés de rougeâtre. Pattes brun-ferrugineux. ♂ présente des variétés remarquables dans la structure des cuisses et trochanters postérieurs : 1. Trochanters simples et cuisses munies en dessous d'une petite dent fine. — 2. Trochanters armés d'une dent aiguë et cuisses simples. — 3. Trochanters allongés et munis d'une gouge convexe en dehors, concave en dedans, tronqué droit au bout avec les angles repliés en dedans, et les cuisses simples. — 4. Trochanters et cuisses simples. Pour certains auteurs ce sont autant d'espèces différentes.

Var. *angustatus* Kr. Stet. Zeit. XIII. 401. 3.

Est oblong, brun de poix, présente le prothorax moins densément et finement ponctué, avec sa plus grande largeur avant le milieu, les angles postérieurs obtus, plus clairs ainsi que les bords; les élytres substriées, d'un roux ferrugineux, parfois rembrunies par derrière vers la suture. ♂ Trochanters postérieurs ordinairement en ciseau; ♀ ? Elytres acuminées au sommet.

Var. *intermedius* Kr. Stet. Zeit. XIII. 401. 2.

Est oblong et brun, prothorax plus étroit par derrière,

avec sa plus grande largeur avant le milieu, angles postérieurs un peu obtus; élytres substriées concolores; antennes et pattes ferrugineuses. ♂ Trochanters postérieurs en oiseau.

Var. *cisteloides* Froehl. Naturf. 28. 25. pl. 2. f. 50. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 404. Fairm. Fn. 1. 299. — *castaneus* Sturm. Ins. Deuts. xiv. 9. 3. pl. 273. f. A. Kr. Stet. Zeit. xii. 284. 4.

Oblong, noir de poix; prothorax noir de poix, à peine plus large avant le milieu, angles postérieurs un peu obtus; élytres substriées, brunes ou marron. ♂ Trochanters postérieurs acuminés ou avec une dent plus ou moins courbée au bord inférieur.

Var. *humeralis* Brul. Exp. Mor. m. 162*. 255. Mur. Mon. Catops 22*. 3. — Long. 5,6; larg. 2,8 mill. — Arcadie; fleurs, juin.

Tête noire, finement ponctuée, avec la bouche et la moitié des antennes ferrugineuses; celles-ci légèrement pubescentes, 5 derniers articles bruns. Prothorax un peu moins long que large, arrondi sur les côtés, élevé aux angles postérieurs, tronqué à la base; finement ponctué, brun noirâtre, plus clair sur les côtés, et couvert d'une courte pubescence rougeâtre. Ecusson triangulaire, noirâtre et pubescent comme le pronotum. Elytres ovales, un peu plus larges que le prothorax, marquées de profondes stries longitudinales formées de gros points profonds, assez fortement ponctuées dans les intervalles; d'un brun foncé, marquées d'une grande tache ferrugineuse à chacun des angles antérieurs, couvertes d'une pubescence rougeâtre redressée et assez dense. Dessous du corps finement ponctué, noirâtre, avec les bords des segments abdominaux ferrugineux. Pattes de cette dernière couleur, cuisses postérieures en partie brunes.

Le type de Brullé a disparu.

4. CATOPS NIVALIS Kr. Stet. Zeit. xvii. 1856. 238*. 5. — Long. 6 mill. — Allemagne, monts Géants.

Très voisin du *cisteloides*, il s'en distingue par les caractères suivants: toujours distinctement plus grand, surtout un peu plus large, d'un brun foncé unicolore. Antennes conformées, comme dans celui-ci, un peu plus fortes et un peu plus courtes, rouge-brun foncé, même

aux premiers articles. Tête d'un noir de poix uniforme luisant, à points un peu plus clair semés et plus distincts. Prothorax conformé comme chez le *cisteloides*, mais un peu plus court, généralement beaucoup plus distinctement abaissé sur les côtés, qui sont encore plus faiblement arrondis. Elytres toujours de la couleur du prothorax, un peu plus longues, plus larges et un peu plus ventruées, dans les gros exemplaires souvent déprimées près de la moitié antérieure de la suture, stries longitudinales bien plus fortement marquées. La ponctuation des élytres comme du pronotum est distinctement plus éparse, ce qui fait paraître l'insecte un peu plus luisant, surtout sur les élytres. Pattes d'un brun de poix, tarsi brun-rouge. — ♂ Trochanters postérieurs, terminés en une longue épine recourbée en dedans.

5. CATOPS ANGUSTICOLLIS Kr. Span. 1870. 98*. 79. (*Choleva*). — Long. 3,6 mill. — Cordoue (Espagne).

On reconnaît comme *Choleva* cette espèce à forme plus allongée et à couleur claire, mais elle est plus petite et de la taille de l'*acicularis*, dont elle se distingue par son prothorax étroit. Antennes allongées comme dans *cisteloides*, de même structure, 8^e article près de deux fois aussi long que large, peu plus court, mais distinctement plus étroit que 10, celui-ci plus court et aussi large que 9, 11^e acuminé à partir du milieu, où il reste plus large que le précédent. Tête et prothorax ponctués grossièrement chagrinés; ponctuation assez serrée, mais proportionnellement forte, d'un brun de poix foncé, dans les exemplaires fraîchement éclos, la couleur des élytres est d'un brun jaune-clair. Prothorax pas beaucoup plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, légèrement et graduellement rétréci de la base vers le devant, angles postérieurs légèrement obtus, bord basal sinué légèrement au milieu, à peine de chaque côté, surface marquée de chaque côté d'un sillon oblique distinct, au devant du bord basal non loin de la base de l'écusson. Elytres presque aussi étroites que dans le *cisteloides*, plus ventruées au milieu, plus fortement rétrécies par derrière, la pointe (♀) prolongée en dedans en un denticule distinct, et en dehors en un

autre faible à peine visible; stries longitudinales, en dehors de la suturale, très distinctes, dont les interstries sont çà et là légèrement élevés, du reste marquées de strigosités transverses assez denses et assez fortes. Pattes allongées, brun-rouge.

6. CATOPS STURMI Bris. Gren. Cat. 7. 1864. Ab. 1. 11. (*Choleva*). — Paris, Le Mans, Collioure (France); Europe bor. : Belgique, Suède.
7. CATOPS NORWEGICUS Sparre. — Europe boréale, Suède, Belgique.
8. CATOPS CUNEIFORMIS Fairm. Fr. Ent. Soc. 1879. 166*. — Long. 4 mill. — Sicile, Etna.

Oblong, convexe, élytres atténuées postérieurement presque dès la base, entièrement d'un roux testacé, à peine luisant, finement soyeux de fauve. Antennes grêles, dépassant la base du prothorax, les 5 derniers articles un peu épaissis, 7 1^{ers} allongés, 8^e plus court, les 2 derniers plus courts, dernier prolongé en pointe. Prothorax convexe, transverse, large, arqué sur les côtés, rétréci en devant, base à peine sensiblement sinuée de chaque côté, densément alutacé. Ecusson triangulaire, aigu, alutacé. Elytres pas plus larges que le prothorax, dilatées tout près des épaules et bientôt atténuées vers l'extrémité, qui est obtuse, faiblement striées, strie suturale un peu plus profonde, suture élevée, intervalles densément et faiblement râpeux. — ♂ Tarses antérieurs et intermédiaires épaissis à la base, les 2 postérieurs grêles, jambes à peine plus courtes.

Rappelle assez, pour la forme générale, le *depressa* Mur., mais la coloration est différente, les élytres sont plus longues, plus atténuées dès la base, et les antennes bien plus longues et grêles.

9. CATOPS AGILIS Illig. Kæf. Prus. 882. (*Choleva*). — Spence Lin. Trans. XI. 1402. — Er. Kæf. Brand. 234. 2. Sturm. Ins. Deut. XIV. 7, 2. pl. 272. fig. N. — Kr. Stet. Zeit. XIII. 405. — Fairm. Fn. Fr. 300. — Mur. Mon. 23*. 4. — *fuscus* Gyl. Ins. Suec. I. 281. 5. — *testaceus* Lat. Gen. Crust. XI. 28. 2. — Long. 5,3 mill. — Europe, Grande-Bretagne, Suède, France, Allemagne, Suisse; assez rare.

Ovale-oblong, plus court et un peu plus large que l'*angustatus*, noir de poix ou d'un testacé brun. Antennes plus claires, à peine de moitié aussi longues que le

corps, 3^e article presque de 2 fois aussi long que le 2^e, 4-6 presque d'égale longueur, 7-11 un peu plus forts, 8^e moitié aussi long que le 9^e, qui est égal au 10^e, dernier de moitié plus long que le pénultième, en pointe obtuse. Tête brune, à points extrêmement fins et assez épars. Prothorax près de 2 fois aussi large que long, presque de la largeur des élytres, plus étroit en devant qu'en arrière, avec sa plus grande largeur après le milieu; angles postérieurs obtus et arrondis; côtés ni aplatis ni relevés, surface marquée de points assez serrés et très fins, et entièrement lisse; d'un brun ferrugineux foncé, plus obscur au milieu, rarement tout noirâtre. Elytres généralement ferrugineuses ou testacées, quelquefois marron ou brun de poix; finement et densément ponctuées; stries ponctuées très faibles à la base, plus distinctes vers l'extrémité. Pattes brun-ferrugineux, jambes intermédiaires ♂ fortement incurbées; trochanters postérieurs non distants, et armés en dedans d'une courte dent pointue, forte.

Se distingue aisément par la forme du prothorax, sa surface presque lisse, et les jambes intermédiaires fortement courbées ♂.

10. CATOPS ORCHESIOIDES Fairm. Fr. Soc. Ent. 1879. 165. 21*. — Long. 2,5 mill. — Algérie : Oran, Daya.

Oblong, atténué par derrière, assez convexe, d'un testacé brun-pâle, assez luisant, côtés du prothorax, antennes et pattes plus clairs; tête un peu plus obscure; antennes assez grêles, dépassant à peine la base du prothorax, légèrement épaissies vers l'extrémité, articles 1-3 allongés, subégaux, les suivants plus courts, 8^e un peu plus étroit, un peu plus court que le 9^e. Prothorax transverse, ample, dilaté-arrondi avant la base et un peu plus large que les élytres, atténuées en avant, bord basal presque droit, angles postérieurs obtus, très finement et très densément ponctué-râpeux; écusson triangulaire, très densément ponctué-râpeux. Elytres oblongues, atténuées postérieurement avant le milieu, obtusément arrondies au sommet, plus longues que l'abdomen, densément marquées de strigules transverses, strie suturale

assez marquée, un peu moins en avant, les autres très obsolètes, marge externe étroitement réfléchie. Pattes médiocrement allongées, cuisses comprimées, 1^{ers} articles des 4 tarsi antérieurs dilatés, mais décroissants.

Ressemble un peu à l'*agilis*, mais il est plus court, avec le prothorax plus large.

11. CATOPS CANELLINUS Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1876: 27. Fr. Soc. Ent. 1879. 166*. 22. — Long. 3,5 mill. — Algérie, Bou-Saada.

Oblong, presque également rétréci devant et derrière, convexe, d'un roux testacé clair, vêtu d'une fine pubescence grise-soyeuse. Antennes grêles, à peine plus courtes que la moitié du corps, à peine épaissies peu à peu vers l'extrémité, dernier article en pointe aiguë. Tête et prothorax très finement et densément pointillés, celui-ci transverse rétréci en avant, côtés arqués, bord basal légèrement sinué près des angles postérieurs, qui sont aigus en arrière. Ecusson triangulaire aigu. Elytres à peine plus larges à la base que le prothorax, légèrement dilatées un peu avant le milieu, ensuite un peu atténuées, faiblement marquées de stries, obsolètes en dehors, suturale plus marquée, densément et finement râpeuses, bord réfléchi large, brusquement rétréci après le milieu. Pattes allongées.

Sa coloration et surtout sa forme l'éloignent des autres espèces; il pourrait former la transition entre le groupe des *cisteloides*, *agilis*, etc., et celui des *meridionalis*, *umbrinus*.

12. CATOPS LATERITIUS Mén. Pet. Ac. Mém. 6^e sér. vi. 1849. 52. — Mur. Mon. Cat. 24*. — Long. 4,6; larg. 1,5 mill. — Nova Alexandrowska.

Ovale-oblong, d'un roux ferrugineux pâle, vêtu d'une courte pubescence grise. Antennes grêles de la longueur de la moitié du corps. Prothorax transverse, subdéprimé, élargi par derrière, angles obtus, côtés subréfléchis. Elytres très densément pointillées, substriées, strie suturale profonde.

Voisin d'*agilis* Illig., mais proportionnellement plus étroit, prothorax beaucoup moins large et plus déprimé, antennes beaucoup plus longues.

13. CATOPS ACICULARIS Kr. Stet. Zeit. XIII. 406*. 6. — Mur. Mon. Cat. 25*. 6. — Long. 3,8 mill. — Sicile, Espagne, Algérie.

Oblong, brun-ferrugineux, facile à distinguer par ses élytres à strigosités transverses. Antennes plus grêles, brun-rougeâtre, pas tout à fait aussi longues que les élytres ; 1^{er} article un peu plus court que le 2^e, qui est égal au 3^e, 3^e égal au 5^e, 4^e un peu plus long et plus gros que le 6^e, 8^e de 1/3 de la longueur du 7^e, et un peu plus étroit que celui-là de chaque côté, 9^e un peu plus court que le 7^e, presque un peu plus gros et égal au 10^e, 11^e aussi gros, moitié aussi long que le précédent, rétréci en cône à partir du milieu, acuminé. Tête densément et finement ponctuée, noir de poix. Prothorax presque de la largeur des élytres, deux fois aussi large que long, légèrement convexe, côtés entièrement arrondis, un peu plus fortement en arrière qu'en avant, d'où la plus grande largeur en arrière du milieu ; angles antérieurs un peu rabattus, fortement arrondis ; postérieurs obtus, un peu avancés en arrière ; bord basal légèrement sinué de chaque côté près de l'écusson ; dessus assez densément et finement ponctué chagriné. Elytres en ovale allongé, graduellement rétrécies par derrière, arrondies chacune au sommet, avec de légères traces de stries longitudinales, et en dehors des bords du pronotum à stries transverses presque parallèles. Pattes déliées, brun-rouge.

14. CATOPS STRIGOSUS Kr. Stet. Zeit. XIII. 441. 31. — Mur. Mon. Cat. 73*. 51. fig. 46. — Long. 3,3 mill. — Autriche ; très rare.

Ovale, roux ferrugineux. Antennes grêles, entièrement d'un brun rougeâtre, 1^{er}, 2^e et 3^e articles de même longueur, 5^e à peine plus long que ses adjacents, moitié aussi grand que le 1^{er}, 7^e un peu plus long et plus épais que le suivant, égal au 9^e et au 10^e, 8^e à peine moitié aussi long et un peu plus menu que le 7^e, 11^e un peu plus long que le 10^e, acuminé en pointe assez aiguë. Tête brun-rouge, densément et finement ponctuée. Prothorax près de 2 1/2 fois aussi long que large ; à la base de la largeur des élytres ; graduellement rétréci vers le sommet, gentiment arrondi sur les côtés, dessus assez densément vêtu d'une pubescence jaune d'or, grossière-

ment granulé; angles antérieurs obtus, inclinés en bas; angles postérieurs presque pointus se projetant assez fortement en arrière, embrassant les élytres, de sorte que le bord basal paraît fortement sinué des deux côtés près des élytres. Elytres ovales, fortement rétrécies du milieu vers le sommet, chacune assez fortement acuminée, assez densément et finement pubescentes, marquées de profondes strigosités transversales, avec des vestiges distincts de stries longitudinales. Dessous et pattes brun-rougeâtre. — Très voisin du *velox*, de sa forme, mais un peu plus petit, plus acuminé postérieurement, et très reconnaissable à son mésosternum caréné. Se distingue du *validus* par sa forme différente, ses antennes plus longues, de l'*acicularis*, le seul du groupe précédent qui ait les élytres transversalement strigieuses, par sa plus petite taille et par sa forme plus courte et plus large.

15. CATOPS GRACILIS Kr. Span. 1870. 99°. 80. — Long. 3 mill. — Espagne, Cordoue.

Très svelte, d'un brun foncé comme le *Catops badius*, aussi long, mais beaucoup plus étroit; peu plus large que *præcox*, mais beaucoup plus long, bien distinct de l'un et de l'autre par les élytres à fines strigosités transverses, qui dans les derniers n'offrent pas de traces de stries longitudinales, en dehors de la suturale, qui devient très légère près de l'écusson, palpes jaune-rouge. Antennes déliées, brunâtres, 1^{er} et dernier articles brun-rouge, 2^e un peu plus long et plus fin que 1, un peu plus long que 3, 4-6 d'égale longueur, près de 3 fois aussi longs que larges, 7 un peu plus fort et aussi long, 8 beaucoup plus petit, à peine plus long que large, 9 et 10 un peu plus courts et plus forts que 7, 11 presque aussi long que 9-10 ensemble. Tête noir de poix, très densément et finement ponctuée; prothorax ponctué de même, cependant brun-foncé comme les élytres, fortement transverse, bord basal sinué légèrement au milieu et de chaque côté; ayant sa plus grande largeur un peu au-delà du milieu, de là plus fortement rétréci devant que derrière. Elytres très longues, de la largeur du prothorax à la base, peu élargies vers le milieu et graduellement rétré-

cies au-delà, densément marquées de fines rides transverses, finement pubescentes, faiblement déprimées au milieu antérieur. Pattes déliées, brun-rouge. ♂ 1-3 articles des tarsi antérieurs, 1-2 des intermédiaires dilatés.

16. CATOPS GRÆCUS Kr. Span. 1870. 98*. note 8. — Long. 2,8 mill. — Grèce.

Ovale-oblong, brun, base et extrémité des antennes, côtés du prothorax et épaules un peu plus clairs, tête brun de poix, antennes en massue, 8^e article à peine plus long que large, prothorax transverse, un peu plus rétréci vers le sommet, densément et finement ponctué, angles postérieurs obtus, élytres plus de trois fois plus longues que le prothorax, marquées de strigosités transverses moins fines, et de stries longitudinales.

Pourrait se confondre avec le *gracilis*, mais pas tout à fait aussi svelte, d'une couleur un peu plus forte, ses élytres à strigosités transverses plus fortes et plus écartées, à stries longitudinales légères mais distinctes.

17. CATOPS COSTATULUS Kr. Span. 1870. 100*. note. — Long. 3,3 mill. — Algérie, Edough.

Ovale-oblong, brun de poix, palpes, base et extrémité des antennes et pattes rousses, antennes filiformes, 8^e article près de deux fois plus long que large, tête à ponctuation fine, moins serrée, prothorax transverse, plus fortement rétréci vers le sommet, moins densément et finement ponctué, angles postérieurs très obtus, bord basal légèrement sinué de chaque côté, élytres plus de 3 fois plus longues que le prothorax, un peu plus étroites au milieu que le prothorax à la base, légèrement rétrécies au-delà du milieu, à strigosités transverses et à stries longitudinales plus fortes, interstries plus distinctement élevés.

Voisin du *græcus*, mais beaucoup plus grand, plus foncé, antennes plus grêles, strigosités transverses et stries longitudinales fortes, sulcifformes sur la moitié postérieure des élytres, les interstries s'élevant en côtes.

18. CATOPS VELOX Spence Lin. Trans. xi. 154. 13. — Er. Brand. 241. 14. — Sturm. Deuts. Fn. xiv. 3. 5. 17. pl. 277. fig. B. — Heer. Fn. Helv. 383. 17. — Redt. Fn. Aust. 144. 15. — Kr. Stet.

Zeit. xiii. 437. 25. — Fairm. Fr. Fn. 304. 18. — Mur. Mon. Cat. 59. 32. fig. 34. — Long. 2,5 mill. — Pas rare en Grande-Bretagne, ainsi que sur tout le continent; Kiew, Madère.

Ovale, rouge ferrugineux. Tête brune, rougeâtre en devant, très finement ponctuée. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, délicées, très faiblement épaissies vers l'extrémité, ferrugineuses, dernier article pas plus grêle que le précédent, entaillé au bout. Prothorax densément et finement ponctué, aussi large à sa base que les élytres, moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, rétréci en avant; angles postérieurs droits, pointus en dedans, bord basal légèrement mais visiblement sinué de chaque côté; ferrugineux, avec le disque plus foncé, et les bords à demi transparents. Elytres à peine élargies au milieu, obtusément arrondies au sommet, avec des stries très indistinctes; surface densément ponctuée, finement strigieuse transversalement. Pattes antérieures légèrement élargies à l'extrémité; tarses intermédiaires non dilatés ♂.

Se distingue du *scitulus*, auquel il ressemble beaucoup, par ses antennes plus grêles, sa couleur plus pâle, les bords du prothorax plus pâles que le disque, ses élytres à strigosités transverses, et les tarses intermédiaires non dilatés ♂; — de *l'umbrinus*, par sa taille plus petite, sa couleur plus claire, les angles postérieurs du prothorax non prolongés en arrière, les strigosités des élytres et les tarses intermédiaires non dilatés ♂.

19. CATOPS NOTATICOLLIS Baudi Berl. Zeits. 1864. 227. Ab. xiii. 52. — Chypre.

20. CATOPS DORSIGER Mars. Ab. 1. 1864. xii. — *pleticollis* (Kr.) Saulcy Fr. Soc. ent. 1864. 426. — *ampliocollis* Baudi Berl. 1864. 226. — Chypre.

21. CATOPS BADIUS Sturm. Deuts. Ins. xiv. 40. 20. pl. 278. fig. B. — Heer. Fn. Helv. 383. 19. — Redt. Fn. Aust. 145. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 438. 26. — Mur. Mon. Cat. 60. 33. fig. 35. — Long. 2,3-3,8 mill. — Autriche: Vienne; rare.

Ovale régulier, le petit bout en arrière, légèrement convexe, brun de poix clair, tout le dessus vêtu d'une fine pubescence serrée, d'un gris jaunâtre. Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax, jaune-fer-

rugineux, un peu épaissies vers la pointe ; 7^e article un peu allongé, 8^e plus court mais plus large que le dernier, l'article apical obtusément arrondi. Tête très finement ponctuée ; yeux noirs. Pronotum finement et densément ponctué, court, aussi large par derrière que la base des élytres, fortement rétréci en avant, bords antérieur et postérieur non sinués, côtés légèrement arrondis, angles postérieurs droits, un peu avancés sur les épaules des élytres. Ecusson grand, triangulaire, finement ponctué. Elytres en ovale oblong, ayant leur plus grande largeur au milieu, en ovale acuminées par derrière, finement chagrinées, avec une strie suturale profonde, mais sans trace d'autres stries. Dessous du corps et pattes de même couleur que le dessus, seulement un peu plus clairs.

Se distingue du *velox* par sa forme nettement plus svelte, sa couleur toujours brun de poix, et non brun-rougeâtre, et par les angles postérieurs du prothorax un peu avancés sur les bords des élytres ; — du *præcox* par son prothorax pas plus large que ses élytres, et du *brunneus* par sa taille plus grande, et les angles postérieurs du prothorax non obtus.

22. CATOPS PRÆCOX Er. Brand. 242. 15. — Sturm. Deuts. Fn. xiv. 37. 18. pl. 277. fig. c. — Heer Fn. Helv. 318. 18. — Redt. Fn. Aust. 145. 16. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 438. 27. — Fairm. Fn. Fr. 304. 19. — Mur. Mon. Cat. p. 61. 34*. fig. 36. — *Wilkins* Spence Lin. Trans. xxi. 157. — Long. 2-2,2 mill. — Toute l'Europe, même en Ecosse, mais rare partout.

Ovale oblong, graduellement rétréci par derrière, avec le sommet un peu tronqué, ferrugineux brunâtre, vêtu d'une très fine et rare pubescence jaunâtre. Antennes rouge-ferrugineux, presque plus longues que la tête et le prothorax, seulement les 3 derniers articles sont visiblement plus épais que les précédents, 8^e nettement plus court mais pas plus grêles que le 7^e. Tête fréquemment brunâtre ou noirâtre sur le front. Prothorax grand, transverse, peu, mais toutefois encore distinctement, plus large que les élytres ; côtés arrondis, plus rétrécis en avant qu'en arrière ; angles postérieurs obtus ; marge basale droite ; très finement et densément ponctué. Ecusson en triangle équilatéral. Elytres oblongues, droites,

sensiblement rétrécies par derrière, avec la pointe tronquée, un peu déprimées, plus distinctement ponctuées que le pronotum, très faiblement et indistinctement striées, sauf la strie suturale profonde. Jambes antérieures légèrement élargies vers l'extrémité.

Lorsque la largeur caractéristique du prothorax est bien marquée, on reconnaît aisément cette espèce, à la base du prothorax un peu plus large que les élytres, et par les élytres se rétrécissant par derrière et tronquées au sommet; mais lorsqu'elle est moins marquée, sa taille plus petite, sa forme plus étroite, les bords droits des élytres et leur rétrécissement par derrière, la distinguent du *velox*. Il se reconnaît du *badius* à sa taille plus petite, à sa couleur bien plus claire, au bord basal du prothorax droit, ne projetant pas ses angles postérieurs en arrière; — du *brunneus* par la ponctuation des élytres plus fine.

23. CATOPS FUNGICOLA Koln. Melet. v. 51. — Mur. Mon. Cat. 66*.
40. — Long. 2,5; larg. 1,3 mill. — Elisabethopol, mont Ssarijal; champignons.

Tête brun-noirâtre, luisante, à peine pointillée; prothorax testacé ou marron, pubescent, très finement pointillé. Elytres convexes, brun-marron, luisantes, rétrécies par derrière, arrondies, pointillées. Ecusson brun, pointillé.

24. CATOPS LEDERI Weise, Led. Canc. 1878. 144*. — Long. 3,7 mill.
Mamudly et Elisabeththal; fourmières, novembre.

Ressemble au *fungicola*, de couleur foncée, un peu plus luisant, il se distingue aisément par les côtés du prothorax fortement arrondis. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, assez épaisses, article 2 peu plus étroit et presque aussi long que 1, 3, 5 et 7, d'égale longueur, 3 distinctement plus court que 2 (*fungicola* égal à 2), 4 et 6 plus courts que leurs adjacents, 8 moitié aussi long que 7, celui-ci et les trois terminaux légèrement épaissis, 9^e carré, 10 transverse, 11 deux fois aussi long que le précédent, avec la pointe obtuse. Prothorax près de 2 fois aussi large que long, comme la tête, à points écartés à peine visibles, garni d'assez longs poils écartés, plus ou moins rétréci par devant, fortement

arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, bord postérieur légèrement sinué près des angles, de sorte que ceux-ci paraissent non tout-à-fait arrondis mais fortement en angle obtus. Elytres légèrement dilatées-arrondies jusqu'au milieu, puis fortement rétrécies, arrondies ensemble au sommet; un peu déprimées, assez fortement ponctuées, garnies de poils jaunâtres un peu plus serrés et plus longs que ceux du prothorax; strie suturale forte, les autres visibles seulement de côté.

25. CATOPS BRUNNEUS Sturm. Deuts. Ins. xiv. 38*. 19. pl. 278 f. A. — Redt. Fn. Aust. 145. 16. — Kr. Stet. xiii. 439. 28. — Mur. Mon. Cat. 63*. 36. fig. 37. — Long. 2,3 mill. — Autriche, Hongrie.

Aussi grand que *præcox*, mais d'une forme toute différente. Ovale large, assez déprimé, largement tronqué par derrière, brun-ferrugineux et luisant. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, déliées, un peu épaissies graduellement vers l'extrémité, article apical arrondi, pubescent, 8° court. Tête large, noir de poix, finement ponctuée, parties de la bouche rouge-ferrugineux. Prothorax grand, large, aussi large à la base que les élytres, légèrement rétréci en avant, côtés légèrement arrondis, angles postérieurs obtus, bord basal droit, légèrement convexe, un peu plus foncé sur le dos, très finement et densément ponctué, faiblement couvert d'une fine pubescence gris-jaunâtre. Ecusson en triangle obtus, densément ponctué. Elytres en ovale court et large, largement tronquées au bout, finement ponctuées-chagrinées, finement vêtues d'une pubescence gris-jaunâtre; strie suturale profonde, les autres stries nulles. Abdomen noir de poix; pattes jaune-ferrugineux.

Plus grand, plus densément pubescent, plus fortement ponctué et moins luisant que l'*anisotomoides*.

26. CATOPS SULCIPENNIS Fairm. Belg. Soc. ent. 1884. LIX*. — Long. 3 mill. — Philippeville (Algérie).

Ovale-oblong, convexe, un peu atténué par derrière, brun, assez luisant, côtés et bord postérieur du prothorax et base des élytres brunâtres, brun-marron en dessous, pattes d'un roux testacé; antennes brunes, testacées à la

base. Tête lisse, un peu plane. Antennes grêles, légèrement épaissies vers l'extrémité, atteignant le milieu des élytres, articles allongés, 1^{ers} égaux, derniers un peu plus courts, 8^e plus petit, dernier acuminé, plus long que le précédent. Prothorax transverse, pas plus large que les élytres à la base, mais élargi avant le milieu, arrondi sur les côtés, un peu plus étroit en devant, angles postérieurs obtus, mais visibles, disque très densément mais finement ponctué, marqué postérieurement d'une petite fovéole de chaque côté. Ecusson triangulaire aigu, densément ponctué, strigieux, avec une petite place lisse à la base. Elytres arrondies en angles aux épaules, légèrement dilatées au milieu, ensuite atténuées, assez fortement déclives, obtuses au bout, striées, les deux premières stries, surtout la suturale, profondes, les autres faibles, interstries densément marquées de strigosités transverses. Pattes assez grêles, hanches et tarses simples, ♀.

Distinct des espèces voisines par sa forme un peu plus courte et par ses élytres à stries bien marquées, surtout les 2 premières qui sont profondes.

27. CATOPS CRIBRATUS Saulcy Fr. Soc. ent. 1864. 427. Ab. Rép. 53. Jérusalem (Palestine).
 28. CATOPS SUBCOSTATUS Reiche Fr. Soc. ent. 1864. 236. Ab. Rép. 53. — Bône (Algérie).
 29. CATOPS CONJUNGENS Saulcy Fr. Soc. ent. 1864. 427. Ab. Rép. 56. Jérusalem (Palestine).

Ptomaphagus Helwig.

30. CATOPS BUGNIONI Tourn. Suis. Soc. ent. III, p. 436. Ab. 14, 13. — France, Suisse.
 31. CATOPS PICIPES Fr. Syst. El. 1. 251. 10. — Illig. Käf. Pr. 893. Er. Brand. 236. 1. — Sturm. Deuts. Fn. xiv. 17. 7. pl. 274 f. c. — Heer. Fn. Helv. 378. 5. — Redt. Fn. Austr. 144. 10. — Kr. Stet. Zeit. XIII. 428. 9. — Fairm. Fr. Fn. 300. 4. — Mur. Mon. Cat. 28*. 9. fig. 8. — *striatus* Duft. Fn. Aust. III. 74. 3. — *blapsoides* Germ. Spec. 84. 142? — Long. 5,6 mill. — Presque toute l'Europe; rare.

La plus grande espèce du genre à l'exception du *meridionalis*. Ovale, convexe, noir. Antennes à peine épaissies à l'extrémité, brun-rougeâtre à la base, noirâtre à

l'extrémité, excepté le dernier article qui est jaune-clair. Tête très densément et finement ponctuée, bouche rougeâtre. Prothorax très densément et finement ponctué, avec une fine pubescence soyeuse, noir, fortement arrondi sur les côtés, rétréci derrière, et surtout par devant, angles postérieurs obtus, bord basal très légèrement sinué de chaque côté, la plus grande largeur est derrière le milieu. Elytres ovales, très convexes, noires, avec une légère efflorescence d'un gris de givre, très densément ponctuées, avec des stries faibles en avant, plus profondes en arrière. Dessous noir, abdomen et pattes brunes, jambes brun-ferrugineux, tarses ferrugineux pâle.

On ne saurait le confondre qu'avec le *nigricans*; sa grande taille l'éloigne de tous, sauf *meridionalis* et *chrysomeloides*. En outre des autres caractères, sa couleur le distingue tout de suite du *meridionalis* qui est ferrugineux; de plus, les angles postérieurs du prothorax ne sont pas projetés; ses antennes subfiliformes le distinguent du *chrysomeloides* à antennes claviformes. Quant au *nigricans*, qui lui ressemble extraordinairement, le *picipes*, plus large et plus robuste, a les élytres bien plus convexes et ventruës, le prothorax bien plus rétréci en avant, et il n'est pas marqué sur le disque de deux ou trois dépressions comme cela se voit d'ordinaire dans le *nigricans*.

32. CATOPS MERIDIONALIS Aubé Fr. Soc. ent. 1850. 326. pl. 11. f. 2. — Kr. Stet. xiii. 428. 10. — Mur. Mon. Cat. 27*. 8. — Long. 6 mill. — France, Sicile, Espagne.

Brun de poix, intermédiaire entre *fuscus* et *picipes*. Tête noire et finement ponctuée. Antennes ferrugineuses, ainsi que les palpes, de la longueur de la tête et du prothorax, seulement faiblement épaissies vers la pointe; 1^{er} article aussi long que le 3^e, et près de deux fois autant que le 2^e, 4^e égal au 5^e et aussi au 6^e, et un peu plus court que le 3^e, 7^e égal au 2^e, cependant un peu plus fort que les adjacents, 8^e à peine moitié aussi long que le 7^e, à peine plus grêle, un peu plus court que le 9^e, 11^e acuminé. Prothorax brun de poix, assez convexe, transverse, de la largeur des élytres, 1 1/2 fois aussi large que long, échancré en devant, tronqué presque droit par derrière,

où il a sa plus grande largeur ; côtés largement arrondis, angles antérieurs déprimés et arrondis, postérieurs projetés par derrière et un peu aigus. Ecusson assez grand, finement ponctué et réticulé. Elytres brunes, ovale-oblong, près de deux fois aussi larges que longues, finement ponctuées-réticulées, marquées de chaque côté de la suture d'une strie assez distincte, et sur le disque de plusieurs autres beaucoup moins visibles, particulièrement en devant. Pattes ferrugineuses.

Ressemble beaucoup, à première vue, à un très grand *fuscus*, mais bien distinct, la proportion des articles des antennes, ainsi que d'autres caractères, étant très différente.

33. CATOPS GRANDIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 56*. — Long. 6,5 mill. — Morée, Hagios-Vlassis ; un seul ♀.

Ovale, convexe, noir, subopaque ; palpes, antennes et pattes roux-brun, articles 7-9 des antennes rembrunis. Tête et prothorax très densément et très finement pointillés, avec une pubescence soyeuse très courte ; prothorax transverse, deux fois plus large que long, arrondi sur les côtés, très large derrière le milieu, angles postérieurs presque droits, peu saillants en arrière ; bord basal obscurément subbisinué ; écusson triangulaire, très finement et densément pointillé, pubescent de fauve ; élytres ovales, fort élargies, plus larges que le prothorax, arrondies en dehors, à stries subsulciformes au bout, suturale à peine plus-marquée, alutacées, très densément et très finement ponctuées, à pubescence blanchâtre, très courte.

Le plus grand du genre, voisin des *picipes* et *meridionalis*, dont il se distingue tout de suite par son prothorax bien plus large et les élytres très ventrues latéralement. Dans les espèces comparées, le prothorax est 1 1/2 fois aussi large que long, tandis qu'ici il est grandement 2 fois ; les angles postérieurs sont presque droits et distinctement saillants, cependant moins que dans le *meridionalis* ; l'*andalusicus* est plus petit, avec le prothorax comme dans *meridionalis*.

34. CATOPS ANDALUSICUS Heyd. Span. 1870. 95*. 76. — Long. 4,7-5 mill. — Sierra de la Neige, près de Ronda (Andalousie).

Très voisin du *meridionalis* Aubé, il s'en distingue

par ses antennes plus longues et par les angles postérieurs du prothorax moins fortement projetés. Dessus brun de poix rougeâtre, avec un éclat soyeux, peu convexe. Antennes plus longues que la tête et le prothorax, peu épaissies vers l'extrémité, rougeâtres, articles 7-10 plus foncés, dernier jaune; 1^{er} aussi long que 3, un peu plus épais et deux fois aussi long que 2, 4 un peu plus long que 5 (de même longueur dans *meridionalis*), celui-ci égal à 6 et un peu plus long que 2, 7 égal à 6, cependant un peu plus fort et foncé au bout, 8 moitié aussi long que 7, plus étroit, 9 à peine un peu plus long que 10, dernier pyriforme, pointu. Tête brun-foncé, densément et finement ponctuée, vêtue d'une pubescence jaune soyeuse. Prothorax à côtés rougeâtres, transparents, particulièrement aux angles antérieurs, aussi large au milieu que le milieu des élytres, 1 1/2 fois aussi large que long, côtés arrondis, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, bord antérieur échancré, plus étroit que le postérieur, angles antérieurs arrondis, postérieurs droits projetés par derrière, mais moins que dans *meridionalis*. Elytres de la couleur du prothorax, en ovale allongé, deux fois aussi longues que larges, un peu plus larges ♀, stries longitudinales légères, un peu plus distinctes par derrière, suturale visible presque jusqu'à l'écusson, bord latéral distinctement réfléchi luisant. Pattes brun-rouge, longues, jambes postérieures un peu plus longues que les cuisses. Tarses antérieurs et 1^{er} article des intermédiaires fortement dilatés. ♂, jambes intermédiaires un peu courbées dans les deux sexes, tarses ♀ simples. Mésosternum sans carène.

35. CATOPS DEPRESSUS Mur. Mon. Cat. 57*. 30. fig. 32. — Long. 3,5 mill. — Un seul ex. — Europe.

Ovale, court, atténué postérieurement, entièrement d'un ferrugineux pâle, élytres plus pâles, pattes testacées. Antennes déliées, ferrugineux-pâle, 1^{er} article plus fort et plus long que le 2^e, 3 près de deux fois aussi long que le 2^e, 4^e presque aussi long que le 3^e, 5 et 6 de même longueur et de même largeur, et plus courts que le 3^e, 7^e un peu plus long et plus large que le 6^e, 8^e moitié aussi long, mais à peine plus étroit que le 7^e, 9 et 10

presque de même longueur, un peu plus larges que le 7^e, 11^e presque rond, mais avec une légère pointe obtuse au bout. Tête brune, assez densément et distinctement ponctuée, plus profondément en devant, avec une légère dépression frontale, vêtue d'une pubescence jaunâtre. Prothorax **transverse, lib subdéprimé** et plus rétréci en devant, angles postérieurs rencontrant la base des élytres et aussi ou presque aussi larges qu'elle, bord latéral avec une légère apparence d'inflexion juste au devant des angles postérieurs, antérieurs arrondis; angles postérieurs subaigus, bord basal largement sinué vers les côtés; ponctué-chagriné, vêtu d'une pubescence jaunâtre. Elytres 2 1/2 fois aussi longues que le prothorax, rouge-ferrugineux, épaules saillantes, de là, allant en diminuant vers la pointe, et tournant brusquement de manière à la faire paraître légèrement tronquée. Ecusson en triangle large. Elytres marquées autour d'une large dépression, suivant la suture jusqu'au milieu, le disque de chaque élytre s'élevant en bosse; une profonde ligne suturale suit le milieu de la dépression, touche à la suture au bout, s'écarte dans sa marche ascendante et se rapproche de nouveau de la suture vers l'écusson; élytres assez distinctement striées, stries plus profondes à l'extrémité, ponctuées-chagrinées, pubescentes de jaune testacé. Pattes et dessous de même couleur que le dessus, mais un peu plus pâles, avec une semblable pubescence.

Ressemble au *fuscus* et se doit placer auprès de lui, s'en distingue par la forme de la partie postérieure du prothorax, qui, dans celui-ci, rentre pour rencontrer la base des élytres. Les articles des antennes n'ont pas les mêmes proportions et les élytres rentrent plus rapidement au sommet, qui a une tendance à devenir sub-tronqué.

36. CATOPS FUSCUS Panz. Fn. Germ. 18. 1. — Fröchl. Naturf. 28. 24. 2. pl. 1. f. 16. — Er. Brand. 235. 3. — Sturm. Deuts. Fn. xiv. 13. 5. pl. 274. f. A. — Heer. Fn. Helv. 379. 4. — Redt. Fn. Austr. 164. 11. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 407. 8. — Fairm. Fr. Fn. 101. 7. — Mur. Mon. Cat. 26^e. 7. f. 6. — *sericeus* Payk. Fn. Suec. i. 342. 1. — Spence Lin. Trans. xi. 145. 6. — *rufescens* F. Syst. El. ii. 563. 1. — *festinans* Gyl. Ins. Suec. iv. 314. 1-2.

— Long. 4,6 mill. — La plus grande partie de l'Europe, Grande-Bretagne, France, Allemagne.

Ovale court, brun-foncé. Antennes brun-ferrugineux, très faiblement épaissies vers l'extrémité, pas tout à fait aussi longues que la tête et le prothorax; 1^{er} article plus long que les suivants, 2^e très peu plus court que le 3^e, 3-4 presque égaux, 5-6 égaux, un peu plus courts que le 4^e, 7^e pas beaucoup plus long que le 6^e, mais bien plus large, 8^e plus court que les adjacents, mais pas beaucoup plus étroit; 9 et 10 à peu près de même grandeur, 11^e acuminé, près de 2 fois aussi long que le 10^e. Tête et prothorax noirs, très densément ponctués, avec une pubescence serrée gris-jaunâtre; bouche rougeâtre, angles du prothorax d'un ferrugineux brun. Prothorax arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, près de deux fois aussi large à la base que long, très légèrement arrondi en dedans aux angles postérieurs, qui sont droits, avec une légère tendance à se projeter en arrière. Elytres brun-rougeâtre, couvertes d'une inflorescence gris-bleuâtre; un peu élargies au milieu, presque acuminées au bout; densément ponctuées, avec des stries visibles vers l'extrémité, à peine perceptibles en avant. Pattes brun-rougeâtre.

Se distingue de toutes les autres espèces de la section, par la largeur du prothorax en arrière, qui établit à première vue son profil, vu avant la jonction du prothorax et des élytres, il a l'apparence d'un ovale continu, légèrement interrompu à la base des élytres.

37. CATOPS PALLIDUS Mén. Cat. rais. 1832. 169. — *Menetriesi* Fald. Transc. I. 284*. — *rufus* Kr. Heyd. Span. 1870. 96*. 77.— Long. 4,6 mill. — Caucase, Espagne.

Ressemble beaucoup aux exemplaires du *fuscus* nouvellement éclos, cependant il est d'un jaune rouge ou rougeâtre plus intense, bien plus étroit, beaucoup plus densément et plus finement ponctué, le prothorax plus étroit, les élytres un peu plus longues et plus fortement rétrécies par derrière, il ressemble encore plus pour le faciès au *depressus*, mais encore plus étroit que lui. Antennes grêles, jaune-rouge, seulement peu épaissies

Silphides de l'Enc.-M. — 1884.

5

vers l'extrémité, 8^e article près de 2 fois aussi long que large, tandis que dans le *fuscus* il est au bout presque plus large que long. Tête jaune-rougeâtre. Prothorax et élytres plus légèrement arrondis sur les côtés que dans le *fuscus*, par où il se rapproche un peu du *Choleva tristis*, quoiqu'il ait le faciès d'un *catops*; les fines stries des élytres ne sont visibles que sous un certain jour. ♂ 3 premiers articles des tarsi antérieurs et 1^{er} article des intermédiaires dilatés.

Testacé roux-intense, ovale acuminé, antennes filiformes, prothorax transverse, légèrement arrondi sur les côtés, graduellement rétréci vers le sommet, très densément et très finement ponctué, base légèrement sinuée de chaque côté avec les angles postérieurs droits, subaigus, élytres plus fortement acuminées vers l'extrémité, finement striées, pattes grêles.

Quoique le *rufus* de Kraatz nous paraisse identique au *pallidus* Mén. (*Menetriesi* Fald.), nous reproduisons la description originale de ce dernier :

Stature et taille du *picipes*, cependant un peu plus petit, surtout plus étroit et ordinairement moins convexe. Tête inclinée, ronde, convexe, peu atténuée en avant, densément pointillée, ferrugineuse; yeux très noirs, globuleux, saillants; antennes dépassant de beaucoup la base du prothorax, testacées, faiblement pubescentes, épaissies graduellement, en dehors, dernier article pâle. Prothorax transverse, à peine de moitié plus large que long, ferrugineux, un peu arrondi à la base, légèrement bisinué, angles droits; côtés peu arrondis, un peu rétréci en avant, tronqué au sommet, avec les angles fortement abaissés, arrondis; convexe, éparsément vêtu d'une pubescence ocracée. Ecusson petit, subtriangulaire, brun-obscur. Elytres peu plus larges que la base du prothorax, un peu élargies vers le milieu, atténuées postérieurement, sommet arrondi, marge latérale plus obscure, étroitement rebordée; convexes, très finement et très densément pointillées, à stries très obsolètes, à pubescence ocracée éparsée; disque un peu rembruni. Dessous ferrugineux, un peu obscur, pointillé obsolète, pubescence peu épaisse. Pattes, surtout les postérieures, très

allongées, ferrugineuses, pubescentes de jaune, tarses très longs, grêles.

38. CATOPS UMBRINUS Er. Kæf. Brand. 235. 4. — Redt. Fn. Aust. 771. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 407. 16. — Fairm. Fn. 303. 15. — Mur. Mon. Cat. 59^t. 31 fig. 33. — Long 4 mill. — France, Allemagne, Russie méridionale; sous les feuilles.

Ovale-court, brun. Antennes à peine épaissies vers l'extrémité, ferrugineuses, plus claires à la base, jaune-clair au bout. Tête presque noire, bouche rougeâtre. Prothorax densément et finement ponctué, ayant sa plus grande largeur par derrière, bord postérieur sinué, angles postérieurs en pointe, saillants, embrassant la base des élytres. Elytres très légèrement élargies au milieu, obtusément arrondies au bout, finement et densément ponctuées, avec des stries indistinctes, à peine plus visibles par derrière. Pattes rougeâtres, tarses intermédiaires dilatés ♂.

Sa forme exactement ovale, le profil du prothorax continué parfaitement par les élytres, le distinguent bien de presque toutes les espèces, les antennes menues le séparent de la section précédente; vient près du *velox*.

39. CATOPS FLAVICORNIS Thoms. Skand. Col. ix. 1867. 346. Ab. Rép. 56. — Scanie (Suède).

40. CATOPS FEMORALIS Thoms. Skand. Col. iv. 1862. 64^t. 8. — Long. 3 mill. — Laponie.

Oblong, noir-brun, subopaque, très finement pubescent de soyeux. — Ressemble beaucoup au *morio*, distinct par son prothorax plus court, la structure des antennes et les cuisses antérieures ♂. — Tête noire, très finement pubescente de soyeux, palpes d'un ferrugineux obscur. Antennes atteignant la base du prothorax, moins grêles, plus obsolètement claviformes, brunes, massue plus obscure, article 3^e 1 1/2 fois plus long que ses adjacents, 4-6 graduellement plus courts, 6^e légèrement transverse, 2 fois plus long que le 8^e, dernier brièvement ovale, pénultième subtransverse, un peu plus long. Prothorax de la largeur des élytres au milieu, subtransverse, aussi large au sommet qu'à la base, légèrement et également arrondi sur les côtés, à peine échancré au bout, avec les

angles subdéfléchis, obtus; tronqué à la base, très légèrement sinué près des angles, qui sont à peine saillants; légèrement convexe, noir-brun, très finement pubescent de soyeux. Elytres 4 fois plus longues que le prothorax, ovale-arrondi à l'extrémité, peu convexes, noires, subopaques, vêtues d'une pubescence brune, soyeuse, très fine, striées très obsolètement à l'extrémité. Pattes brunes, tarsi ferrugineux, cuisses postérieures brunes. — ♂ Jambes antérieures sinuées à la base, cuisses antérieures munies en dessous au milieu d'un petit tubercule.

41. CATOPS NIGRICANS Spence Lin. Trans. xi. 141. 3. — Er. Kæf. Brand. i. 237. 6. — Sturm. Deuts. Fn. xiv. 18. 8. pl. 273. f. c. — Heer Fn. Helv. i. 380. 6. — Redt. Fn. Aust. 144. 11. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 429. 11. — Fairm. Fr. Fn. 303. 16. — Mur. Mon. Cat. 29*. 10. — Long. 3,8-4,6 mill. — Presque toute l'Europe.

Ovale-oblong, convexe, noir ou brun de poix. Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax, très légèrement épaissies vers l'extrémité, quelquefois entièrement ferrugineuses, plus généralement ferrugineuses à la base et rembrunies vers la pointe. Tête finement ponctuée, bouche d'un brun rougeâtre. Prothorax très densément et finement ponctué, finement pubescent, un peu plus étroit que les élytres, côtés arrondis, avec la plus grande largeur au milieu, très généralement avec 2 ou 3 dépressions sur le disque; angles postérieurs à pointe projetée un peu en arrière, ce qui fait paraître le bord postérieur visiblement sinué de chaque côté. Elytres d'un brun noirâtre, parfois plus pâles, en ovale allongé, un peu convexes, densément et finement ponctuées; faiblement striées, stries visibles vers l'extrémité, effacées en devant. Dessous noir; pattes brun rougeâtre, cuisses noirâtres.

Var. *longipennis* Chaud. Mosc. Bul. 1845. III. p. 196.

Plus grand. Antennes un peu plus allongées, élytres plus campanulées, plus convexes, à stries plus faiblement marquées.

Var. *fuliginosus* Er. Kæf. Brand. 239. 10. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 28. 13. — Redt. Fn. Aust. 771.

Antennes plus foncées, rouge-brunâtre, les 4-5 derniers

articles noirâtres; bord basal du prothorax faiblement sinué de chaque côté; élytres très indistinctement striées.

Var. *calignosus* Steph. Ill. Brit. III. 12.

Var. *soror* Newm. Ent. Mag. 1. 508.

42. CATOPS CORACINUS Kelln. Stet. Zeit. VII. 177. 3. — Redt. Fn. Aust. 771. — Kr. Stet. Zeit. XII. 431. 12. — Mur. Mon. Cat. 32*. 11. fig. 10. — Long. 3,3 mill. — Toute l'Europe.

Ressemble beaucoup au *nigricans* Spence pour la forme des élytres et des antennes, mais il est plus petit et son contour est plus continu : les angles postérieurs du prothorax sont très légèrement acuminés, et ne sont observables qu'à un examen attentif, les élytres sont indistinctement striées. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, légèrement épaissies vers la pointe, tantôt plus, tantôt moins, brun-rougeâtre; massue ordinairement noirâtre, la couleur étant plus ou moins intense.

Tête et prothorax noirs, densément et finement ponctués, avec une fine et courte pubescence jaunâtre. Prothorax presque aussi large que les élytres, ayant sa plus grande largeur au milieu, droit à la base, angles antérieurs arrondis, postérieurs réellement droits; écusson grand, et pubescent comme le pronotum. Elytres ovales, densément et finement ponctuées, noires, couvertes d'une pubescence ou purulence gris-cendré, indistinctement striées : pas de pubescence jaune le long de la base des élytres. Pattes brun-rougeâtre.

Sa petite taille, ses antennes plus courtes et plus épaissies, son pourtour plus uniforme et moins campanulé, le distinguent du *picipes*. Ses antennes plus courtes et plus épaissies, la pubescence jaune du prothorax et de l'écusson, l'absence de dépressions sur le disque du pronotum et des angles postérieurs avancés, le distinguent des petits *nigricans*. — L'absence de pubescence jaune le long de la base des élytres, de tous ceux qui ont le pronotum pubescent de jaune (*tristis*, *abdominalis*, *montivagus*, etc.). — Le *morio*, avec lequel il pourrait se confondre, a la forme plus allongée et plus grêle; il n'a pas les angles postérieurs légèrement acuminés, mais ils sont obtus et non droits; le pronotum est aussi plus déprimé.

43. CATOPS NITIDICOLLIS Kr. Stet. Zeit. xvii. 1856. 238*. 4. — Long. 3,3 mill. — France, Paris.

Un peu plus petit que le *coracinus*, moins densément et plus fortement ponctué, noir profond, finement pubescent, plus fortement luisant sur le pronotum, celui-ci plus étroit, à peine élargi par devant, ce qui rend l'insecte plus régulièrement ovale. Antennes un peu plus courtes que dans le *coracinus*, du reste conformées et colorées de même, brun de poix foncé, brun-rouge à la base. Tête densément et fortement ponctué. Prothorax distinctement plus étroit à la base que les élytres, un peu plus de moitié plus large que long, légèrement rétréci par derrière, distinctement arrondi avant le milieu, avec les angles postérieurs obtus, légèrement convexe en dessus, beaucoup moins densément et plus distinctement ponctué que dans les espèces voisines, d'où plus luisant, en outre finement pubescent de jaune d'or. Elytres ovales, aussi moins densément et plus distinctement ponctué que dans les espèces voisines. Pattes noir de poix, tarsi bruns.

44. CATOPS MORIO F. Syst. El. II. 564. 4. — Er. Brand. 240. 11. — Sturm Deuts. Fn. xiv. 29. 14. pl. 276. fig. B. — Heer Fn. Helv. 382. 14. — Redt. Fn. Aust. 144. 13. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 431. 13. — Fairm. Fr. Fn. 301. 8. — Mur. Mon. Cat. 33*. 12. fig. 11. — *dissimulator* Spence Lin. Trans. xi. 150. 11. — *sericeus* Gyl. Ins. Suec. iv. 313. 1-2. — Long. 3,8 mill. — Europe, Sibérie; sous les feuilles et dans les crevasses des arbres.

Ovale-oblong. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, insensiblement mais peu fortement élargies vers la pointe; 1-2 articles jaune-ferrugineux, les autres noirs, à l'exception du dernier, qui est jeune; rarement elles sont en entier ferrugineuses. Corps noir; tête densément et distinctement ponctué, parties de la bouche rouges. Prothorax un peu déprimé, densément et finement ponctué, avec une fine pubescence serrée d'un gris jaunâtre; moitié aussi large que long, légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci en avant, mais seulement un peu plus étroit par derrière qu'au milieu; angles postérieurs presque obtus; bord basal tronqué droit. Ecusson pubescent comme le pronotum. Elytres couvertes

à la base d'une pulvérulence gris-cendré, et non d'une pubescence jaune, densément ponctuées, presque sans traces de stries, un peu élargies au milieu, terminées en pointe obtuse. Pattes d'un rouge ferrugineux, cuisses brunes.

Très voisin du *coracinus*, il se distingue des autres espèces du groupe par les mêmes caractères.

45. CATOPS QUADRATICOLLIS Aubé Fr. Soc. ent. 1850. 326. 35.
— Fairm. Fn. 302. — Mur. Mon. Cat. 46*. 16. fig. 21. —
Long. 3,8 mill. — France.

Ovale-oblong, convexe, noir-brunâtre, couvert d'une pubescence gris-jaunâtre, maigre; bouche et base des antennes d'un ferrugineux obscur. Antennes graduellement épaissies en massue, un peu plus longues que la tête et le prothorax. Prothorax presque aussi large que long, côtés faiblement arqués, presque droits, excepté en devant, où ils sont assez fortement arrondis; angles postérieurs droits, un peu pointus; très finement et densément ponctué. Elytres avec une ponctuation plus marquée, très dense; strie suturale profonde, disparaissant au tiers antérieur; on aperçoit, à un fort grossissement, des traces de stries. Cuisses noir-brunâtre, jambes et tarsi ferrugineux-obscur.

Presque du faciès du *tristis*, dont il est très voisin par la forme et la couleur. Il est cependant un peu plus allongé et généralement d'une couleur plus foncée, et ses antennes sont moins claviformes; la principale différence gît dans la forme du prothorax, qui est presque aussi long que large et rectiligne sur les côtés, en réalité presque carré; angles postérieurs plus droits; les bords latéraux sont un peu plus arrondis ♂ que ♀.

46. CATOPS NIGRITA Er. Brand. 239. 9. — Heer Fn. Helv. 381. 12.
— Redt. Fn. Aust. 84. 13. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 432. — Fairm.
Fr. Fn. 301. — Mur. Mon. Cat. 34*. 13. fig. 12. — *tristis*
Gyl. Ins. Suec. iv. 311. 1. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 24. 11.
pl. 275. f. c. — *morio* Payk. Fn. Suec. i. 344. 2. — Long.
3,6 mill. — Largement répandu sous les feuilles et les cadavres
des petits oiseaux.

Ovale-oblong. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, imperceptiblement épaissies vers l'extrémité,

1-6 articles brun-rougeâtre, les autres bruns, 8^e pas beaucoup plus petit que les autres, dernier ovale, acuminé, jaune. Prothorax à peine moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande largeur au milieu, un peu plus étroit et plus rétréci devant que derrière; angles postérieurs quelquefois un peu pointus, bord basal tronqué droit, très légèrement sinué vers le milieu, couvert d'une pubescence soyeuse jaune. Elytres noires, comme tout le corps, ornées d'un duvet de pêche bleu-brunâtre ou pourpre, avec une pubescence jaunâtre plus visible à leur base et aux bords basals que sur le disque; finement pointillées, très imperceptiblement striées, ovale-oblong, un peu élargies au milieu, obtusément acuminées par derrière. Pattes rouge-ferrugineux, cuisses postérieures quelquefois brunâtres.

La forme du prothorax distingue le *nigrita* du *tristis*, bien plus rétréci en avant avec la plus grande largeur après le milieu dans l'un que dans l'autre; la massue du *tristis* est courte, épaisse et grosse, tandis que les antennes du *nigrita* sont longues, menues et obsolètement claviformes.

47. CATOPS GRANDICOLLIS Er. Kæf. Brand. 1837. 237*. 7. — Heer Col. Helv. 380. — Kr. Stet. Zeit. xix. 432. 15. — Fairm. Fn. 300. Long. 3,5 mill. — France, Allemagne, Suisse.

Faciès presque du *nigrita*, mais plus grand et surtout plus large.

Brun-noir. Antennes pas tout à fait aussi longues que le prothorax, graduellement épaissies vers l'extrémité, rouge-brun, les derniers articles noirâtres. Tête et prothorax très densément ponctués, densément vêtus de poils gris-jaunâtre serrés. Prothorax beaucoup plus large que les élytres, plus de moitié plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus, bord basal droit de la largeur des élytres. Celles-ci en ovale allongé, un peu convexes, densément et finement ponctuées, à stries indistinctes, pulvérolentes de gris. Pattes rouge-brun.

Ce *Catops* paraît être une espèce bien caractérisée, dont le principal caractère consiste dans la grande lar-

geur du prothorax. Murray n'en fait qu'une variété par les motifs suivants : on le trouve mêlé avec le *tristis*, la plus grande partie des exemplaires du 1^{er} sont ♂, et ceux du 2^e de ♀. Latr. et Erichson a établi son espèce sur un seul exemplaire; il existe, malgré la forme du prothorax, une extrême ressemblance entr'eux, la pubescence, la coloration, la rugosité et la ponctuation sont identiques.

48. CATOPS... Deuts. Ent. Zeits. 1884. 56*. — Long. 2 mill. — Mo...

Corps oblong, d'un brun roux clair, moins luisant, tête et antennes brunes; cornues testacées aux 2 extrémités; antennes filiformes, à 8^e article en massue, 8^e article peu plus étroit que les précédents, transverse; tête à points clair-semés et obsolètes; prothorax densément et très finement ponctué, triangulaire, plus large à la base; angles postérieurs arrondis, bord basal à peine sinué de chaque côté; élytres plus de 3 fois plus longues que le prothorax, à ponctuation serrée très fine et subrugueuse; à 1^{er} article strigieux, sans stries, la suturale légèrement saignée. — c^o tarses antérieurs dilatés.

Elle se distingue de *velox*, *badia* et *Wilkinsoni* de toutes les autres par les angles postérieurs du prothorax fortement arrondis, et par les antennes rembrunies au milieu. Coloration, forme et ponctuation comme dans *badia*, cependant pronotum à peine moins densément ponctué que les élytres, et par suite moins brillant; antennes brunes, avec la base sur une grande étendue et la pointe du dernier article clairs.

49. CATOPS CHRYSOMELOIDES Panz. Fn. Germ. 57. 1. — Latr. Gen. Crust. 29. 4. — Spence Lin. Trans. xi. 146. 7. — Er. Brand. 697. 7^a. — Sturm Deuts. Fn. xiv. 22. 10. pl. 275. fig. B. — Heer Fn. Helv. 380. 9. — Redt. Fn. Austr. 144. 10. — Kr. Stet. Zeit. xii. 432. 16. — Fairm. Fn. 302. — Mur. Mon. Cat. 47*. 17. fig. 22. — Long. 4,6 mill. — Angleterre, France, Allemagne, Suisse. Sous les cadavres de petits mammifères et oiseaux.

Ovale, convexe, brun-foncé ou noir, avec une pubescence assez dense. Antennes plus courtes que la tête et le prothorax, fortement et abruptement renflées en mas-

sue, 1-6 articles rouges, massue noire ou brun-foncé, 4-6 articles pas plus longs qu'épais, pas plus épais que les précédents, bien moins que les suivants, 7^e, 9^e et 10^e un peu plus épais que longs, bruns, 11^e ovale-oblong, 8^e plus étroit que les autres articles de la massue, très court. Prothorax moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, rétréci un peu plus devant que derrière; bord basal un peu plus étroit que la base des élytres; angles postérieurs droits, pointus; bord basal légèrement sinué de chaque côté, couvert d'une pubescence grisâtre-jaunâtre grossière. Elytres comme le pronotum, très finement et densément ponctuées, à stries très indistinctes, avec une purulence gris-cendré, pas de pubescence jaune. Pattes rouge-ferrugineux, avec les cuisses souvent brunes.

Se distingue tout d'un coup à sa grande massue noire. Les seules grandes espèces du groupe *picipes* et *nigricans*, n'ont pas d'aussi épaisse massue; il se distingue vite des autres espèces à massue forte, par sa couleur noir sombre, par la purulence gris-cendré des élytres. La pubescence du pronotum est d'un jaune grisâtre terne, bien plus grossière que celle jaunâtre-brun très abondante du *tristis* et autres espèces claviformes, et la purulence des élytres n'a pas cette couleur pourpre qu'on observe dans ces espèces; il n'y a pas de poils jaunes le long de la base ou bords des élytres, dont la couleur n'est pas plus claire que celle du prothorax. On retrouve dans cette espèce des variétés analogues à celle du *tristis* — a) *grandicollis* à prothorax large plus grand — b) *tristis* à prothorax court et étroit — c) *rotundicollis*, forme du *rotundicollis*, mais plus grand — d) *nigrita*, forme du *nigrita*.

50. CATOPS LONGULUS Kelln. Stet. Zeit. VII. 1846. 176*. 1. — Kr. Stet. Zeit. XIII. 433. 17. — *pilicornis* Thoms. Skand. Col. IV. 61. — Long. 5 mill. — Collines élevées près des montagnes de Thuringe, sous les mousses, sous des cadavres d'oiseaux.

Oblong, reconnaissable à sa forme étroite et allongée. Antennes de la longueur de la tête et du prothorax, assez fortes, moins au milieu, articles de la base rougeâtres, apical jaunâtre, massue peu épaisse. Tête et pronotum

densément ponctués, vêtus d'une pubescence gris-jaunâtre. Prothorax légèrement arrondi sur les côtés, rétréci par devant et par derrière, angles antérieurs arrondis, postérieurs droits, bord basal droit, légèrement sinué de chaque côté près de l'écusson. Elytres en ovale allongé, densément et finement ponctuées, indistinctement striées, légèrement vêtues d'une pubescence gris-jaunâtre et pulvérulente. Pattes brun-noir, tarses rouge-brun.

Ce *Catops*, admis comme espèce par Kraatz, n'est regardée que comme une variété du *tristis*. Les élytres, dans cette espèce, sont plus ou moins allongées et la massue des antennes plus ou moins épaisse.

51. CATOPS TRISTIS Panz. Fn. Germ. 8. 1.—Er. Kæf. Brand. 238*. 8.
 —Kr. Stet. Zeit. xiii. 433. 18.—Mur. Mon. Cat. 36. 14. fig. 14. 15.
 —Leachi Spenc. Trans. xi. —*nigrita* Sturm. Deuts. Ins. xiv. 24.
 11. pl. 275. f. c. — Var. *abdominalis* Rosh. Beitr. Ins. Eur. 1. 22.
 — Long. 3,8 mill. — Angleterre, Allemagne, Tyrol, France, Suisse, Italie, Espagne, Volhynie.

Ovale, noir ; antennes presque aussi longues que la tête et le prothorax, très fortement épaissies à l'extrémité, 1-6 articles étroits, rouge-brun, les suivants bruns, plus larges que longs, 8^e pas beaucoup plus court mais plus étroit que le reste de la massue, dernier peu plus grand que les précédents, avec la pointe conique, également brun. Tête et prothorax noirs, densément ponctués, densément couverts de poils jaunâtres serrés. Prothorax de moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, avec sa plus grande largeur au milieu, à peine plus rétréci devant que derrière, angles postérieurs droits pointus ; bord basal presque droit, légèrement sinué près du milieu. Elytres brunes, légèrement pulvérulentes, densément ponctuées, avec de légers vestiges de stries, un peu dilatées-ventruées au milieu, en ovale pointu par derrière, extrémité arrondie ensemble ou séparément, selon le sexe (suivant Erichson), selon les exemplaires (suivant Murray). Dessous brun-foncé ainsi que les cuisses, jambes brun-rouge, tarses jaune-ferrugineux.

L'*abdominalis* Rosh. se rapporte à des exemplaires immatures présentant les deux premiers segments ventraux d'un rouge ferrugineux.

Var. *montivagus* Heer. Fn. Helv. 381.

Légère variété ou synonyme, comme *abdominalis*. S'en distingue principalement par son prothorax un peu plus long et plus étroit.

52. CATOPS ROTUNDICOLLIS Kelln. Stet. Zeit. vn. 1846. 176*. 2. —
— Kirby's Spence Mon. 148. — Long. 3,3 mill. — Avec *longulus*.

Ovale, brun-noir, pattes et antennes roux de poix. Antennes à peine aussi longues que le prothorax, légèrement épaissies vers l'extrémité, d'un brun rouge, plus clair à la base. Tête et pronotum densément ponctués, densément vêtus de poils gris-jaunâtre. Prothorax fortement arrondi sur les côtés, rétréci devant et derrière, angles antérieurs arrondis, postérieurs droits, bord basal rectiligne, légèrement sinué de chaque côté vers l'écusson. Elytres ovales, peu convexes, densément et finement ponctuées, indistinctement striées, faiblement garnies de poils gris-jaunâtre et pulvérulentes. Pattes rouge-brun ; tarsi plus clairs.

Ressemble au *grandicollis*, mais plus petit. Elytres couvertes d'une pubescence gris-jaunâtre, et angles postérieurs du prothorax plus pointus.

53. CATOPS NEGLECTUS Kr. Stet. Zeit. xiii. 434. 20. — Mur. Mon. Cat. 44*. 15. fig. 20. — Long. 3,3 mill. — Allemagne, France.

Faciès du *tristis*. Antennes en massue obsolète, brun-rougeâtre. Tête noire, à ponctuation profonde, dense et distincte. Prothorax au milieu presque de la largeur des élytres, près de moitié aussi large que long, un peu convexe, côtés assez fortement arrondis (exactement comme dans le *tristis*), plus rétréci derrière que devant, avec la plus grande largeur avant le milieu, angles postérieurs droits, bord basal faiblement sinué de chaque côté au-devant de l'écusson ; couvert d'une dense pubescence jaune, comme dans le *tristis*, non granulé, mais couvert de points peu profonds, et paraît sous un fort grossissement exactement comme des points varioliques, de chacun desquels sort un poil jaune (parfois deux) ; ces points sont rangés dans un ordre irrégulier transverse, qui donne au pronotum à l'œil nu l'apparence de fortes strigosités transverses. Elytres densément et finement

ponctuées, avec des traces obsolètes de semblables dépressions et des vestiges de stries au bout, vêtues de pulvéulence brunâtre-pourpre, semblable à celle du *tristis* et de poils jaunâtres principalement à la base. Pattes rouge-brunâtre, tarsi plus clairs.

En résumé, le seul caractère presque qui distingue cette espèce est la sculpture des élytres ; les poils partent du fond des cicatricules dans le *neglectus*, la concavité est tournée vers le poil, dans le *tristis*, c'est la convexité ; dans le *rotundicollis*, les poils sont placés entre les points.

54. CATOPS ALPINUS Gyl. Ins. Suec. iv. 312. 2. — Heer Fn. Helv. 318. 11. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 435. 21. — Fairm. Fr. Fn. 301. 6. — Mur. Mon. Cat. 55*. 27. pl. fig. 30. — *subfuscus* Koln. Siet. Zeit. viii. 177. 4. — Redt. Faun. Aust. 974. — Long. 3 - 3,8 mill. — Généralement répandu dans toute l'Europe.

Ressemble beaucoup au *fumatus*, mais ordinairement un peu plus grand, avec le prothorax plus étroit, à angles postérieurs obtus, à bord basal pas aussi large que les élytres. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, avec les articles basals rougeâtres et serrés, massue noirâtre, dernier article d'ordinaire noir, mais quelquefois jaunâtre à l'extrémité. Tête noire, densément et finement ponctuée avec une pubescence jaunâtre. Prothorax brun-noirâtre, densément ponctué, densément vêtu de poils jaunes, pas si large à la base que les élytres, coupée droit et légèrement sinuée de chaque côté de l'écusson, angles antérieurs obtus, postérieurs légèrement arrondis. Elytres ovales densément ponctuées, légèrement vêtues d'une pubescence jaune, brun-rougeâtre clair, généralement noirâtres au bout et vers la suture. Pattes rouge-brunâtre.

Se distingue du *fumatus* par sa grande taille et sa forme plus allongée, par son prothorax plus étroit que les élytres, mais les petits exemplaires ne diffèrent pas pour la forme ; la couleur plus claire, la massue fortement obscure avec le 8^e article proportionnellement plus petit, servent à le distinguer. C'est avec hésitation que Murray en fait une espèce plutôt qu'une variété du *fumatus*.

55. CATOPS VENTRICOSUS Weise Led. Cauc. 1878. 145*. — Long. 3,5 mill. — Caucase, Azkhur, Alpes de Transylvanie; juin.

Voisin de l'*alpinus* par ses antennes épaisses, fortement en massue, bien distinct cependant de toutes les autres espèces par la petitesse du prothorax relativement aux élytres. Noir de poix, finement pubescent, luisant. Tête densément, assez fortement, profondément ponctuée. Antennes comme dans *alpinus*, seulement le 3^e article égale le 1^{er}, et le 4^e égale le 2^e, l'un plus long, l'autre plus court. Prothorax plus large que long, environ moitié aussi large que les élytres, bord postérieur droit, côtés assez parallèles ou seulement peu arrondis jusqu'au milieu, de là plus fortement rétréci. Angles postérieurs presque droits, points fins et écartés, percés d'arrière. Elytres dilatées-arrondies aux épaules, graduellement rétrécies après le milieu, arrondies ensemble au sommet, ne couvrant pas le pygidium, convexes, ponctuées un peu plus fortement que le pronotum; points reliés çà et là par de légères strigosités transverses. Cuisses brun de poix; jambes plus claires, tarses rougeâtres.

56. CATOPS FUMATUS Er. Kæf. Brand. 240*. 12. — Sturm. Deuts. Fn. xiv. 31. 15. pl. 186. f. c.—Heer Fn. Helv. 382. 15. — Redt. Fn. Aust. 144. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 436. 22. — Fairm. Fn. 302. 14. — Mur. Mon. Cat. 54*. 26. — *agilis* F. Syst. El. ii. 565. 6. — Gyl. Ins. Suec. i. 277. 2. — Panz. Fn. Germ. 95. 10. — Duft. Fn. Aust. iii. 75. 4. — *Watsoni* Spenc. Lin. Trans. xi. 156. — Long. 3,3 mill.— Très commun. Europe : Grande-Bretagne, Suède, France, Allemagne, sous les détritns, feuilles mortes, etc.

Ovale oblong, brun foncé. Antennes courtes et épaisses, un peu plus longues que le prothorax, brunes; dernier article plus large que long, ferrugineux, ainsi que les 3-premiers. Tête noire, densément ponctuée. Prothorax avec les bords rougeâtres transparents, légèrement arqués, densément et finement ponctués, près de 2 fois aussi large que long, aussi ou presque aussi large à la base que les élytres, rétréci en devant, angles postérieurs droits pointus, bord basal presque droit. Elytres ovales acuminées, densément ponctuées, sans traces de stries, excepté la suturale; brun-rougeâtre, souvent brunâtres à l'extrémité. Dessous brun-noirâtre. Pattes ferrugineuses.

— Se distingue de toutes les espèces de cette division, sauf *alpinus* et *scitulus*, par ses antennes courtes, épaisses et sa massue très forte; *alpinus* de couleur plus claire, est plus long et a le prothorax ordinairement plus étroit que les élytres; *scitulus* a les antennes plus longues que le *fumatus*, les élytres plus larges, les angles postérieurs du prothorax saillants, et la coloration un peu différente, les élytres étant brunes, sous cette teinte rougeâtre, qui caractérise le *fumatus*, surtout à la base, et lui donne une apparence soyeuse.

57. CATOPS AMBIGUUS Heer Fn. Helv. 1842. 382*. 16. — Long. 2,8 mill. — Suisse, Bâle.

Ovale, brun. Tête et prothorax d'un noir brun, très densément pointillés, hérissés de poils gris; antennes plus longues, obsolètement claviformes, 4-3 articles testacés, ainsi que le dernier, tous les autres d'un noir brun, 8^e article beaucoup plus court et plus étroit que le suivant; prothorax court, transverse, un peu plus étroit en avant, subarrondi sur les côtés, angles postérieurs droits; élytres de la largeur du prothorax à la base, obtuses au sommet, très densément pointillées, striées seulement à la suture.

Ressemble beaucoup au *fumatus*, mais pour l'ordinaire de plus petite taille, il se reconnaît à son prothorax plus large, à ses antennes à massue obsolète. Il semble distinct du *scitulus* par la couleur de ses antennes et sa taille plus petite.

58. CATOPS SCITULUS Er. Brand. 241. 13. — Sturm. Deuts. Fn. xiv. 33. 16. — Redt. Fn. Aust. 772. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 437. 24. — Fairm. Fr. Fn. 304. 17. — Mur. Mon. Cat. 57*. 29. — *fumatus* Spence Lin. Trans. xl. 155. 4. — Long. 3,3 mill. — Angleterre, Allemagne, Suisse, France.

Ovale brun. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax, ferrugineuses, un peu plus obscures avant l'extrémité. Tête noir-brunâtre, densément ponctuée. Prothorax grand, brun foncé, densément ponctué, de 1/3 plus large que long, aussi large à la base que les élytres, rétréci en avant à partir du milieu, arrondi sur les côtés; angles postérieurs pointus, un peu saillants en arrière,

ce qui fait paraître le bord basal visiblement sinué de chaque côté. Elytres ovales, légèrement acuminées, densément ponctuées, sans vestiges de stries, excepté la suturale, brun-testacé, extrémité noirâtre. Pattes ferrugineuses. — Diffère du *fumatus*, auquel il ressemble, par ses antennes plus longues, les angles postérieurs du prothorax avancés un peu en arrière, la couleur plus foncée et uniforme ; couvert d'une fine pubescence soyeuse de sorte que, vu d'arrière, une bande soyeuse plus pâle paraît traverser les élytres.

59. CATOPS BREVICOLLIS Kr. Stat. Zeit. xix. 136*. 23. — Mur. Mon. Cat. 56. 28. — Long. 3,3 mill. — Sicile.

Tient à peu près le milieu entre *fumatus* et *scitulus*, il se distingue des deux par la forme du prothorax et la structure des antennes très différentes. Brun de poix, élytres et pattes jaune-brunâtre. Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax, brun-rouge uniforme, massue à peine distinctement épaissie, les 5 derniers articles seulement un peu plus forts que les précédents et d'égale largeur ; 1^{er} article un peu plus long et plus fort que 2, 3 plus court que 2, distinctement plus grand que 4, presque égal à 6, 5 à peine plus grand que les adjacents, 7 moitié aussi long et un peu plus fort que 6, égal à 9, 8 à peine plus étroit et moitié aussi long que les adjacents, 10 un peu plus court que 9, 11 aussi long que 9 et 10 ensemble, acuminé à partir du milieu. Tête noir de poix, très finement et assez densément ponctuée, bouche brun-jaune. Prothorax de la largeur des élytres, ayant sa plus grande largeur à la base, plus de 2 fois aussi large que long, également et assez fortement élargi de la base vers le devant ; angles antérieurs arrondis, un peu rabattus, angles postérieurs obtusément arrondis, se projetant un peu sur le bord antérieur des élytres ; bord basal très légèrement sinué de chaque côté près du milieu ; surface assez densément, finement ponctuée chagrinée, noir de poix, côtés et bord postérieur brunâtres, assez densément et longuement pubescent de gris jaunâtre. Elytres ovales, légèrement rétrécies par derrière, densément et finement ponctuées, légèrement pruveuses,

finement et légèrement pubescentes de jaune-brunâtre. Dessous du corps noir de poix, pattes rouge-jaune.

60. CATOPS NIVICOLA Kiesw. Berl. Zeits. 1858. 36*. — Long. 3,3 mill.
— Grèce : Athènes, Parnasse, sous les pierres, au bord des neiges.

Très légèrement, mais également convexe, ovale allongé, peu rétréci par derrière, assez finement et maigrement pubescent de gris. Tête assez luisante, grande, recourbée, finement ponctuée. Antennes longues et assez grêles, médiocrement élargies et distinctement comprimées vers l'extrémité, rouge-ferrugineux, 8^e article sensiblement plus petit que les autres, dernier ♂ deux fois aussi grand, ♀ de moitié plus long que le précédent. Prothorax beaucoup plus large que long, rétréci par devant, fortement arrondi sur les côtés, bords antérieur et postérieur droits, tous les angles arrondis; noir ou brun foncé, finement ponctué et pubescent. Ecusson triangulaire, noir, ponctué. Elytres à la base de la largeur de prothorax ou plus étroits, côtés moins arrondis et non dilatés ventrus au milieu, densément et assez fortement ponctués, avec des traces de stries longitudinales; finement et assez densément pubescentes de gris. Dessous noir, épipleures et pattes à l'exception des cuisses d'un rouge ferrugineux. ♂ tarsi antérieurs à 1-3 articles dilatés, les autres simples comme tous ceux des ♀.

Ressemble à un *Catopsimorphus*, pour la distribution des couleurs, la forme déprimée, le pourtour ovalaire, ainsi que les antennes comprimées latéralement et la longueur du dernier article. Mais dans ce genre, les antennes grêles en contraste avec leur dilatation en massue, le font rapporter au genre *Catops*, où il est le type d'un groupe à part caractérisé ainsi : mésosternum caréné, tarsi longs et grêles, antérieurs élargis ♂, simples ♀, les autres tarsi simples dans les deux sexes. Ovale, très peu convexe.

61. CATOPS LUCIDUS Kr. Stet. Zeit. xiii. 139*. 30. — Mur. Mon. Cat.
— Long. 3,8 mill. — Dalmatie, Kahr.

Ovale oblong, noir de poix, luisant. Antennes presque de la longueur des élytres, d'un brun rougeâtre intense unicolore, robustes; 1^{er} article distinctement plus long que le 2^e, et comme celui-ci un peu plus étroit que les

autres articles, 3^e un peu plus grand que 2^e, à peu près aussi long que 1, 4, 5, 6 obconiques, chacun toujours un peu plus court que le précédent, 7, 9 et 10 de la longueur du 4^e, mais un peu plus gros, 8 un peu plus court, mais à peine plus étroit que les adjacents, 11 presque de la longueur des deux précédents, devenant peu à peu plus large de sa base à son dernier tiers, où il est en pointe conique. Tête noire, luisante, non ponctuée, bouche rouge-jaunâtre. Prothorax plus de 2 fois aussi large à la base que long, graduellement rétréci de la base en avant, d'où la plus grande longueur est avant le milieu, légèrement arrondi sur les côtés; angles antérieurs obtus, un peu abaissés, postérieurs obtus et arrondis; bord basal distinctement échancré de chaque côté de l'écusson qui est assez densément et finement ponctué près des angles postérieurs et déprimé; d'où les angles postérieurs paraissent légèrement saillants et un peu réfléchis; dessus brun de poix obscur, plus clair sur les côtés et aux angles postérieurs, légèrement convexe, poli luisant. Elytres en ovale allongé, légèrement rétrécies par derrière, d'un jaune pâle luisant, brunâtre dans le voisinage de l'écusson, brun de poix foncé au sommet, ponctuation écartée, obsolète, sériee par places, garnies de quelques poils jaunâtres. Dessous noir luisant, imponctué, dernier segment ventral jaune. Pattes brun-rougeâtre intense.

62. CATOPS PRÆUSTUS Kr. Berl. Zeits. 1858. 33*. — Long. 3,3 mill.
— Mésopotamie.

Ovale allongé, comme *cisteloides* mais beaucoup plus petit et plus déprimé, noir de poix, très reconnaissable à la couleur jaune pâle des élytres, des antennes et des pattes. Densément et finement ponctué, finement pubescent, peu luisant. Antennes grêles, articles distinctement plus longs que larges, 2^e plus court que les adjacents, 3-6 diminuant légèrement de longueur, 7 distinctement plus long que 6, à peine différent en longueur de 9, 8^e moitié aussi long que les adjacents, dernier très allongé, aussi long que les 2 précédents ensemble, légèrement rétréci dès le milieu. Tête presque triangulaire, à peine visiblement ponctuée, luisante, noir de poix, bouche

brun-rouge. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, 2 fois aussi large que long, rétréci en avant à partir du milieu, angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus, bord basal légèrement sinué en dessus de l'écusson; légèrement convexe, légèrement impressionné à la base de chaque côté, non loin du bord latéral, plus fortement ponctué sur les côtés, d'où moins mat au milieu. Ecusson assez grand, noir. Elytres près de 4 fois aussi longues que le prothorax, avec un reflet noirâtre plus ou moins distinct au sommet. Dessous assez densément ponctué, assez luisant, pointe anale rougeâtre. — ♂ Tarses antérieurs légèrement dilatés, intermédiaires simples.

La jonction peu étroite du prothorax est un caractère qui sépare cette espèce du *lucidus*, et devra en faire un genre à part, auquel il faudra joindre le *cryptophagoides*, qui partage la sculpture du *lucidus*.

63. CATOPS VALIDUS Kr. Stet. Zeit. xiii. 441. 32. — Mur. Mon. Cat. 74*. 52. — Long. 5,6 mill. — Hongrie.

Vient près du *sericeus* pour la forme du corps, il n'en diffère que par sa taille plus grande et ses antennes autrement conformées. — Antennes brun-rougeâtre; 1^{er} article au moins 2 fois aussi long et moitié aussi fort que le 2^e, un peu plus grêle à la base, 2^e très petit, presque aussi large au bout que long, un peu plus grêle à la base, 3^e au moins trois fois aussi long que le 2^e, s'élargissant un peu dans son dernier tiers; 5^e égal au 4^e, 6^e un peu plus court et plus large que le 8^e, 7^e un peu plus court, mais juste aussi large que le 9^e, 11^e distinctement plus grêle et moitié aussi long que le 10^e, acuminé du côté de la base à la pointe, qui est un peu plus pâle. Le reste comme dans le *sericeus*.

64. CATOPS PELOPIS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 57*. — Long. 4 mill. — Morée, Hagios-Vlassis.

Ovale, convexe, vêtu d'une pubescence soyeuse, blanchâtre, très courte mais distincte, très densément et très finement pointillé, pattes brunes, antennes plus courtes, ferrugineuses à sa base, 8^e article transverse, linéaire transversalement; prothorax fortement transverse, 2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur près de la

base, fortement rétréci en avant, bord basal sinué de chaque côté, angles postérieurs arrondis un peu en pointe, points obsolètes, indistinctement en lignes transverses. Élytres ovales oblongues, à stries obsolètes, à strigosités très fines, transverses, *listrie suturale* plus profonde. — Espèce très remarquable, très voisine de *validus*, *varicornis* et *sericeus*, de la taille des plus grands exemplaires du dernier; il se distingue de tous par le pointillé strigueux transverse plus fin, à peine visible sur le pronotum, et par la pubescence plus courte, presque pulvérulente, plus grise, au lieu d'être brune, et par le prothorax deux fois aussi large que long, avec la plus grande largeur à la base, d'où les côtés se rétrécissent vers le devant, les angles postérieurs en pointe se projettent en arrière, mais sont un peu obtus ou légèrement arrondis; les antennes brunes, rouges à la base, ont le 7^e article transverse à l'extrémité, en forme de ligne transverse; les élytres sont distinctement et finement strigieuses transversalement. Seul le *depressus* Murr. présente une semblable conformation du prothorax.

65. CATOPS VARICORNIS Rosh. Beit. Fn. Eur. 1. 23. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 442. 33. — Mur. Mon. Cat. 76^e. 54. — Long. 3,3 mill. — Allemagne, Angleterre, Russie.

Très voisin du *sericeus*, il s'en distingue surtout par la forme et la couleur des antennes, qui sont plus courtes et ferrugineuses aux deux bouts; il est en général un peu plus foncé. Tête large, finement ponctuée, noir-luisant, avec une pubescence grise; bouche d'un rouge-ferrugineux. Antennes dépassant à peine le milieu du prothorax, et épaissies en dehors en massue distincte; les articles séparés sont comme dans *sericeus*, mais forment une massue plus ronde-oblongue et plus épaisse; 1-5 articles rouge-ferrugineux, les suivants brunâtres, 8^e plus court, mais pas plus étroit que les autres, dernier transverse, court, et très obtus, beaucoup plus court que dans le *sericeus*, et jaune-rougeâtre. Prothorax grand, noir, luisant, vêtu d'une pubescence soyeuse, presque carré, un peu plus large que long, de la largeur des élytres, un peu rétréci en avant, gentiment arrondi sur les côtés,

angles postérieurs pointus, projetés légèrement en arrière, bord postérieur arrondi. Ecusson grand, en triangle, avec des strigosités transverses. Elytres brun-foncé, à fines strigosités transverses, un peu arquées, un peu arrondies sur les côtés, assez rétrécies vers l'extrémité, qui n'est pas si fortement tronquée que dans le *sericeus* et plus arrondie, avec une fine pubescence brunâtre. Dessous noir, pattes brunes, tarsi plus pâles.

Le dernier article des antennes pâle, joint au faciès général du *sericeus*, fait reconnaître tout d'un coup cette espèce. Il est aussi plus épais et ses côtés approchent davantage de la perpendiculaire.

66. CATOPS SERICEUS F. Syst. El. II. 564. ♀. — Panz. Fn. Germ. 73. 10. — Er. Brand. 243. 16. — Sturm. Deuts. Ins. XIV. 43. 22. pl. 178. f. o. — Heer. Fn. Helv. 384. 21. — Redt. Fn. Aust. 83. 1. — Kr. Stet. Zeit. XIII. 442. 34. — Fairm. Fr. Fn. 305. 21. — Mur. Mon. Cat. 75. 58. fig. 47. — *truncatus* Illig. Mag. I. 42. 4. — Gyl. Ins. Suec. I. 279. 3. — *villosus* Latr. Gen. Crust. II. 29. 5. Spence. Lin. Trans. XI. 152. 12. — *picipes* Kugl. Schnd. Mag. 558. 9. — *silphoides* Marsh. ent. Brit. I. 493. 19. — Var. *sericatus* Chaud. Mosc. Bul. 1845. 3. 199. — Long. 2,3-3,3 mill. — Très commun dans toute l'Europe.

Ovale, subdéprimé en dessus, d'un brun noirâtre très foncé, très soyeux. Antennes à peu près aussi longues que le prothorax, visiblement épaissies vers l'extrémité; 1^{er} article deux fois aussi long que le 2^e, 2^e et 3^e presque égaux en longueur et en épaisseur; 4 et 5 presque d'égale longueur, chacun plus court que le 2^e ou le 3^e; 6^e de même longueur que le 5^e, mais beaucoup plus large, deux fois aussi long que le 8^e, mais moins large; 7^e très peu plus long et beaucoup plus large que le 6^e, 8^e moins de moitié aussi long que le 7^e, et à peine moins large; 9^e et 10^e chacun à peu près de la même longueur que le 7^e, mais plus large; 11^e plus grêle et moitié aussi long que le 10^e, appointi seulement après le milieu, pointe obtuse, brun-rougeâtre, plus clair à la base, plus foncé au bout. Tête noire, grande, finement ponctuée. Prothorax noir-luisant, finement strigieux transversalement, un peu plus large que long, un peu rétréci en avant; angles postérieurs pointus, se projetant en arrière, ce qui rend le

bord basal légèrement arqué. Elytres d'un brun plus ou moins foncé, marquées de fines strigosités transverses, se rétrécissant de la base à l'extrémité, qui est tronquée obliquement. Pattes brunes, cuisses souvent noirâtres. Taille très variable.

Se distingue à première vue de toutes les espèces voisines, excepté *varicornis* et *validus*, par ses élytres tronquées, du *varicornis* par le bout des antennes qui n'est pas de couleur claire, du *validus* par sa taille plus petite et par la proportion différente des articles des antennes.

Var. Le *sericatus* Chaud. est trois fois plus petit, plus rétréci par derrière, à élytres plus étroites, moins strigieuses, presque ferrugineuses à l'extrémité, antennes moins élargies vers l'extrémité, à derniers articles plus allongés, dernier moins obtus, de la couleur du précédent.

67. CATOPS TENUICORNIS Rosh. And. 1856. 61^r. — Long. 2,3; larg. 1,2 mill. — Espagne, Algésiras; mai, très rare.

Ressemble aux *sericeus* de taille moyenne, dessus moins fortement strigieux transversalement, antennes très grêles, dernier article distinctement en pointe, un plus grand nombre d'articles jaune-rouge, angles postérieurs du prothorax très peu saillants.

Ovale-oblong. Tête grande, noire, luisante, très finement ponctuée, pubescente de brunâtre soyeux; bouche et palpes jaune-rougeâtre. Antennes très grêles, de la longueur du prothorax; 1-4 articles jaune-rouge, les autres noirs, 1^{er} un peu épais, obconique, assez long, 2^e un peu plus menu et de moitié plus court, 3^e plus menu et aussi long que 2^e; 4-6 obconiques, de même grandeur, 7, 9 et 10 de même épaisseur, 7^e un peu plus long, 8^e très court et petit, 11^e près de moitié plus long que le 10^e, distinctement acuminé. Prothorax de 1/3 plus large que long, peu rétréci en avant, très peu arrondi sur les côtés, sommet droit, avec les angles abaissés, obtus, base droite avec les angles très peu saillants, un peu pointus, peu convexe, noir, luisant, très finement strigieux transversalement, densément pubescent de brunâtre soyeux. Ecusson grand, triangulaire, densément strigieux et fine-

ment pubescent. Elytres allongées, aussi larges et 2 1/2 fois aussi longues que le prothorax, un peu rétrécies sur les côtés en arrière, tronquées obliquement au sommet, légèrement convexes, noires, un peu luisantes, densément marquées de fines strigosités transverses, et densément pubescentes de brunâtre soyeux. Dessous noir-luisant, à points fins serrés, et à fine pubescence brunâtre. Pattes brun de poix, extrémités des jambes et tarses rougeâtres.

68. CATOPS ANISOTOMOIDES Spence Lin. Trans. xi. 18. 16. — Sturm Deuts. Fn. xiv. 42. 21. pl. 278. f. c. — Heer Fn. Helv. 384. 20. — Redt. Fn. Aust. 145. 16. — Kr. Stet. Zeit. xiii. 429. 29. — Fairm. Fr. Fn. 304. 20. — Mur. Mon. Cat. 64*. 37. fig. 38. — Long. 1,5 mill. — Toute l'Europe; commun, détrit.

Ovale, très convexe, brun-ferrugineux pâle, un peu luisant, couleur plus ou moins foncée, plus foncée sur le disque du pronotum et des élytres, avec une fine pubescence brune. Antennes assez longues, à peine épaissies à l'extrémité. Prothorax transverse, aussi large à la base que les élytres, rétréci un peu en avant, très densément mais finement ponctué, bord basal droit, angles postérieurs obtus. Elytres en ovale allongé, à peine élargies derrière la base, puis graduellement rétrécies; densément ponctuées, mais pas si finement que le prothorax; suture élevée; strie suturale profonde, arrivant presque à l'écusson; nulle trace des autres stries. Pattes et antennes de la couleur du corps.

La petitesse de sa taille, sa forme courte et plus convexe le distinguent du *velox*. Il est plus voisin du *precox* pour la taille, mais la forme plus allongée de ce dernier et son prothorax autrement formé, l'en distinguent; il a une tendance à se rouler sur lui-même comme un *Agathidium*.

69. CATOPS COLONOIDES Kr. Steit. Zett. xii. 169. 35. — Mur Mon. Cat. 77*. 55. — Long. 1,8 mill. — Europe nord et centre.

Ovale oblong, soyeux de brun. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du prothorax, imperceptiblement épaissies vers la pointe, rouge-ferrugineux, 7^e article à peine plus large, mais au moins 2 fois aussi long que le précédent, toujours d'une couleur plus foncée que les autres, 8^e un peu plus petit que le 6^e, 9, 10 et 11 (acu-

miné) assez égaux en taille. Tête brun-noirâtre, finement ponctuée, avec une pubescence grise. Prothorax brun noirâtre, un peu plus clair au bord basal extrême, très densément et finement granulé, environ $1/4$ plus large que long, rétréci en avant, modérément arrondi sur les côtés; angles postérieurs pointus, projetés en arrière. Elytres d'un brunâtre foncé, plus claires vers le sommet, marquées de fines strigosités transverses, couvertes de fine pubescence soyeuse, graduellement rétrécies vers l'extrémité. Dessous brun-noirâtre, bords des segments plus clairs. Pattes brun-ferrugineux.

Espèce très distincte, semblable au *sericeus*, ayant comme lui les élytres strigieuses transversalement, mais plus petit que les plus petits *sericeus*, et facile à distinguer par la forme toute différente des antennes, les élytres graduellement rétrécies et non tronquées, la strigosité transverse plus forte et plus espacée; la massue antennaire est régulièrement un peu plus foncée, le dernier article un peu plus grand que le précédent, conique, acuminé.

70. CATOPS VANDALITIÆ Heyd. Span. 1870. 97*. 78. — Long. 2,5 mill. — Andalousie, Ronda, Sierra della Nieve; assez commun.

Ce petit *Catops* forme, par son mésosternum caréné, les tarsi intermédiaires ♂ dilatés et ses élytres arrondies, un groupe particulier, près du *colonoides* Kr.

Antennes rougeâtres, 1^{er} et dernier articles jaunes, longues, grêles, beaucoup plus longues que la tête et le prothorax, épaissies graduellement vers l'extrémité, 2^e article égal à 3, plus court que 1, 4 égal à 5 et un peu plus court que 2, 6^e un peu plus court que 5, 7 aussi long que 5 et deux fois plus long que 8, 9 un peu plus court que 7 et 10 à peine plus court que 9, dernier pyriforme pointu. Tête brun-rougeâtre, avec la bouche jaunâtre, finement ponctuée et très finement pubescente de gris, comme le reste de la surface. Prothorax jaunâtre, plus foncé au milieu, deux fois aussi large que long, rétréci par devant, bord antérieur peu échancré, avec les angles arrondis; côtés arrondis avec la plus grande largeur au-delà du milieu, bord basal droit, avec les angles obtus; ♂ en somme plus large, plus arrondi sur les côtés, angles

postérieurs un peu avancés sur les épaules, reconnaissable aussi entre toutes les autres espèces par la forme du prothorax si différente dans les deux sexes. Dessus très finement ponctué, ridé-aciculé et non avec des strigosités transverses comme les élytres. Écusson en triangle pointu par derrière. Elytres 2 1/2 fois aussi longues que larges, aux épaules plus étroites que le prothorax, particulièrement ♂, côtés subparallèles jusqu'au delà du milieu, puis brusquement rétrécies, chacune à pointe arrondie, ce qui le rapproche du groupe de l'*angustatus*; strie suturale visible jusque vers l'écusson, plus écartée de la suture au milieu, elle se rapproche en avant, et vers le bout se joint au bord sutural. Pattes grêles, longues, rougeâtres, tarses plus clairs, cuisses plus foncées. ♂ tarses antérieurs et 1-2 articles des intermédiaires fortement dilatés; ♀ simples.

71. CATOPS CRETICUS Heyd. Deuts. Zeits. 1883. 368*. 1. — Long. 3 mill. — Crète, mont Ida.

Mésosternum caréné postérieurement. Ovale-oblong, brun-obscur, angles postérieurs du prothorax roux-translucides; pattes, palpes et 1-6 articles des antennes roux, dernier article brusquement acuminé en pointe, fauve, 7-11 plus grands et plus larges, mais non en massue, d'un noir brun, 8° petit. Prothorax court, alutacé, angles postérieurs obtus, base très peu sinuée près des angles, qui deviennent par là plus aigus. Elytres striées, à fortes strigosités transverses.

♂ Tarses antérieurs et intermédiaires, à articles 1-2 dilatés. Diffère de toutes les espèces par son mésosternum caréné seulement par derrière au devant des hanches, et par ses tarses intermédiaires dilatés. Se place néanmoins près du *Vandalitiæ*, qui a le mésosternum caréné et les tarses antérieurs et intermédiaires dilatés ♂. Voisin pour la forme de l'*alpinus*, qui a le mésosternum dépourvu de carène.

72. CATOPS MARGINICOLLIS Luc. Expl. Alg. II. 224. pl. 21. f. 4. — Mur. Mon. Cat. 65*. 38. fig. 39. — Long. 5,6; larg. 3,3 mill. — Oran; sous les pierres, fin de février.

Tête noire, granulée, et à peine pubescente. Palpes et
Silphides de l'Anc.-M. — 1884.

antennes entièrement ferrugineux. Prothorax pubescent, très légèrement granulé, noir, avec les bords latéraux ferrugineux ; très convexe, arrondi sur les côtés, avec les angles postérieurs moins projetés, et un peu moins aigus que dans le *celer*. Ecusson noir, granulé. Elytres noires, pubescentes, à ponctuation très fine et très dense ; stries assez bien marquées. Tout le dessous du corps brun-foncé et très finement granulé. Pattes entièrement ferrugineuses.

73. CATOPS FUSCIPES Mén. Pet. Ac. Sc. 6^e sér. vi. 1849. 53 — Mur. Mon. Cat. 49^e. 19. — Long. 3,8 ; larg. 1,5 mill. — Novo-Alexandrowsk.

Ovale-oblong, convexe, très rétréci par derrière, d'un roux ferrugineux pâle ; tête, dos du prothorax, poitrine et abdomen d'un noir sombre ; antennes grêles, de la longueur de la moitié du corps ; prothorax rétréci en avant, abaissé sur les côtés, angles postérieurs projetés, aigus ; élytres n'ayant que la strie suturale marquée.

Ressemble au *lateritius*, mais il est beaucoup plus convexe et plus rétréci par derrière, avec les angles postérieurs pointus et prolongés en arrière.

74. CATOPS PUSILLUS Mots. Mosc. Bul. 1840. 175. — Mur. Mon. Cat. 66^e. 41. — Long. 1 ; larg. 0,6 mill. — Géorgie : Ananur, Davial ; sous les pierres.

Ovale, marron, vêtu d'une pubescence dorée, serrée. Antennes un peu poilues, de la longueur de la tête et du prothorax, 8^e article beaucoup plus étroit et plus court que le 7^e. Prothorax transverse, arrondi sur les côtés, et, vu d'avant, il paraît un peu plus large que les élytres ; tronqué droit à la base, avec les angles postérieurs un peu projetés en arrière. Ecusson triangulaire. Elytres ovales, obliquement échancrées à l'extrémité vers la suture, avec l'angle externe projeté en un point ; de chaque côté de la suture on voit une ligne enfoncée qui va un peu au-delà du milieu. Jambes antérieures un peu dilatées.

75. CATOPS DAURICUS Mots. Mosc. Bul. 1845. xviii. 1. 46^e. — Mur. Mon. Cat. 67. 43. — Mongolie : sommet de Hamar-Daban.

Testacé-ferrugineux, remarquable par son prothorax

beaucoup plus étroit que les élytres, qui sont en ovale assez large, et acuminées à l'extrémité. Il a presque le faciès d'un *Pteroloma*, mais son corps l'en éloigne totalement.

76. CATOPS CLATHRATUS Perr. Fr. Soc. ent. 1864. 281. — Rép. 54. Espagne.

XII — CATOPSIMORPHUS (κατοψ, *Catops*; μορφή *forme*),
Aubé Fr. Soc. ent. 1850. 324 pl. 11. f. 1.

Forme des *Catops*, il en diffère surtout par la forme des antennes. Antennes aplaties de 11 articles, 8° pas plus étroit et à peine plus étroit et à peine plus court que 7 et 9. Epistome coupé carrément. Labre largement et profondément échancré, muni d'une membrane mince, échancrée au milieu et ciliée dans l'échancrure. Mandibules cornées, denticulées à l'extrémité et garnies en dedans d'une membrane ciliée. Machoires à lobe interne terminé par un petit crochet, externe mousse et barbu. Palpes maxillaires de 4 articles, 1^{er} très petit, 2° en massue, 3° obconique, dernier conique, moitié plus petit que le 3°. Lèvre membraneuse, fortement échancrée. Palpes labiaux de 3 articles, cylindriques, le dernier le plus petit. Tarses de 5 articles, les 4 antérieurs dilatés légèrement ♂.

1. CATOPSIMORPHUS ORIENTALIS Aubé. Fr. Soc. ent. 1850. 325^e. pl. 11. f. 1. — Long. 3,5 mill. — Constantinople (Turquie).

Ovale, assez convexe, noir, pubescent de gris. Tête noire, un peu brillante, assez large, très finement pointillée et légèrement pubescente; labre, palpes et antennes testacés, 1^{er} article de celles-ci assez long cylindrique, 2° presque globuleux, les suivants transverses, aplaties, allant en s'élargissant jusqu'au dernier, qui se termine en pointe, 8° à peine plus court que ses adjacents. Prothorax plus de 1 1/2 fois aussi large que long, beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière, presque carrément tronqué au sommet et à la base, très largement arrondi sur les côtés, angles antérieurs et postérieurs mousses et arrondis; noir, pubescent, finement pointillé-réticulé. Elytres aussi larges que le prothorax à sa base, une fois 1/2 aussi longues que larges, largement arrondies en ar-

rière, ferrugineuses, ponctuées-réticulées, moins finement que le pronotum, pubescentes, strie suturale bien marquée. Dessous noir, avec l'extrémité de l'abdomen un peu ferrugineuse. Pattes ferrugineuses, cuisses légèrement rembrunies. www.libtool.com.cn

2. CATOPSIMORPHUS DALMATINUS Kr. Stet. Zeit. 1852. 445*. — Dalmatie, Kahr.

Presque 1 1/2 fois aussi grand que l'*orientalis* Aubé, il n'a pas, comme celui-ci, le prothorax noir de poix luisant, et les élytres rouge-ferrugineux, mais les élytres sont d'un brun-foncé et le prothorax brun de poix foncé. Dans l'*orientalis* le prothorax est à peine, dans le *dalmatinus*, distinctement plus large que les élytres.

3. CATOPSIMORPHUS JUDÆUS Saulcy. Fr. Soc. nt. 1864. 423. Rép. 59. — Palestine.

4. CATOPSIMORPHUS SAMARITANUS Saulcy. Fr. Soc. ent. 1864. 424. Rép. 60. — Palestine, Jérusalem, Naplouse.

5. CATOPSIMORPHUS MICHONI Saulcy. Fr. Soc. ent. 1864. 425. Rép. 61. — Palestine, Jérusalem, Naplouse.

6. CATOPSIMORPHUS INCISIPENNIS Saulcy. Fr. Soc. ent. 1864. 426. Rép. 62. — Palestine, Jérusalem, Naplouse.

7. CATOPSIMORPHUS BICOLOR Kr. Span. 1870. 102*. 81. — Long. 2,3-2,7 mill. — Espagne, Jaen, Cordoue ; fourmillières.

Ovale, légèrement convexe, pubescent de gris, noir de poix, un peu luisant, base et extrémité des antennes, ainsi que les tarses, d'un roux testacé, élytres ferrugineuses, une tache scutellaire triangulaire ordinairement brune. Antennes courtes, fortes, légèrement comprimées, 2^e article subtriangulaire, 3-10 fortement transverses, 3-5 sensiblement un peu plus larges; dernier presque aussi long que les trois précédents ensemble, acuminé au bout; prothorax de la largeur des élytres, rétréci en devant, très densément et finement ponctué, tous les angles arrondis; élytres un peu moins densément et finement ponctuées, à peine striées, brièvement ovales. — Forme courte de *orientalis* et *dalmatinus*, mais beaucoup plus petit, avec les antennes encore plus courtes, avec les articles plus fortement transverses.

8. CATOPSIMORPHUS ARENARIUS Hampe. Siebenb. Vers. 1852. 140.

— *pilosus* Muls. Rey. Op. Ent. II. 1853. 12. Fairm. Fr. Fr. 305. 1. — Long. 3 mill. — Allemagne, France, Lyon, Nice.

Ovale, convexe, d'un brun noir, luisant, à pubescence jaunâtre assez longue. Tête inclinée, à ponctuation assez grosse, mais peu serrée, bouche ferrugineuse. Antennes pubescentes, plus longues que la tête et le prothorax réunis; dernier article presque aussi long que les 3 précédents ensemble, cylindrique, puis rétréci brusquement en pointe aiguë. Prothorax transverse, fortement rétréci en avant; côtés et angles antérieurs fortement arrondis, les postérieurs légèrement; finement ponctué d'un brun foncé brillant, avec les côtés quelquefois plus clairs. Elytres un peu élargies vers le milieu, seulement rétrécies en arrière, légèrement arrondies à l'angle sutural; ponctuation rugueuse, d'un ferrugineux brillant, avec la région scutellaire et quelquefois l'extrémité obscurcies; strie suturale obsolète en avant. Pattes d'un ferrugineux assez clair. — ♂ Tarses antérieurs à 1-3 articles dilatés; jambes intermédiaires coudées au milieu.

9. CATOPSIMORPHUS GEORGICUS Weise. Led. Cauc. 1878. 142.

— Long. 3 mill. — Caucase; dans les fourmilières, avril et mai.

Brun-rouge clair, tête foncée; antennes fortement comprimées, plus longues que la tête et le prothorax, articles 2-6 subégaux, 7 un peu plus long et plus épais que 6, 8 de $\frac{2}{3}$ aussi long que 7, 9 et 10 plus épais, à peine aussi longs que 7, 11^e plus long que les 2 précédents réunis, prolongé en une longue pointe aiguë, les articles dilatés, rembrunis à l'exception de la pointe du dernier. Tout le corps est assez densément garni de longs poils jaunes un peu écartés. Tête et prothorax non ponctués entre les poils, celui-ci 2 fois aussi large que long, bord postérieur, comme dans *myrmecobius*, légèrement sinué de chaque côté, et distinctement déprimé au devant de l'écusson, la plus grande largeur tout au devant des angles postérieurs, qui sont arrondis, fortement rétrécis de là vers le bord antérieur, angles antérieurs arrondis. Elytres aussi larges que le prothorax, assez parallèles sur le 1^{er} tiers, puis rétrécies presque en ligne droite par derrière, bord

latéral à partir du rétrécissement fortement rabattu, chaque élytre très étroite et arrondie à la pointe, légèrement convexe, avec une légère strie suturale et des points enfoncés d'arrière, assez écartés, lesquels sont souvent réunis par de légères strigosités transverses. — Rarement brun foncé avec la tête noire, élytres pas plus claires soit à la base soit aux épaules.

10. CATOPSIMORPHUS MARQUETI Fairm. Fr. Soc. ent. 1857. 729^o. 5.
— Long. 2,6. mill. — France mérid. Béziers.

Ovale peu atténué en arrière, assez convexe. D'un brun noir, assez brillant avec les élytres d'un marron un peu roussâtre, enfumées à l'extrémité; couvert d'une pubescence roussâtre, fine, courte, serrée, égale. Tête large, légèrement convexe, unie, à ponctuation très fine, comme le pronotum. Antennes de même couleur que les élytres, et les pattes, plus obscure à la base, comprimées, un peu fusiformes, courtes, à articles larges et serrés. Prothorax deux fois aussi large que long, rétréci en avant, côtés légèrement arrondis, bord postérieur légèrement sinué de chaque côté, embrassant un peu la base des élytres. Ecusson en triangle, allongé, noir et ponctué comme le pronotum. Elytres légèrement rétrécies en arrière, finement rebordées sur les côtés, fortement arrondies à l'extrémité; à ponctuation plus forte que celle du pronotum, très serrée, égale, à vestiges de stries peu distinctes, la suturale assez marquée. Tarses grêles ♀.

Très distinct du *pilosus* par l'épaisseur et la brièveté des antennes, par la pubescence fine et égale, le corps moins allongé, la tête plus grosse, etc. Ressemble davantage au *dalmatinus*, mais la taille est beaucoup plus petite, la forme moins elliptique, les antennes sont plus épaisses, la pubescence est plus fine, plus serrée et plus courte.

11. CATOPSIMORPHUS BEDELI Fairm. Fr. Soc. ent. 1879. 167^o. —
Long. 2,8 mill. — Daya (Oran).

Ovale, atténué postérieurement, convexe, obscur, luisant, élytres d'un marron foncé, vêtu d'une fine pubescence cendrée, antennes, palpes et pattes d'un ferrugineux obscur. Antennes épaisses, plus courtes que le prothorax,

articles très serrés, comprimés, élargis vers l'extrémité presque dès la base, 10^e article plus grand, dernier petit, conique. Prothorax grand, largement arqué à la base, embrassant la base des élytres, fort rétréci en avant, densément et très finement, mais distinctement aciculé, ponctué. Ecusson triangulaire aigu, également ponctué. Élytres atténuées postérieurement à partir de la base, arrondies ensemble au sommet, finement ciliées sur les côtés, densément et faiblement pointillées avec de légères rides transverses, strie suturale enfoncée.

Voisin du *Marqueti*, mais encore un peu plus convexe et plus atténué en arrière, ayant la faciès d'un *Colon*; il est, comme le *Marqueti*, remarquable par ses antennes courtes et épaisses, la massue large et comprimée, plus longue que la partie basale, le 10^e article aussi long que 8-9 ensemble, 8^e plus court mais aussi large que 7 et 9. Il en diffère par ses élytres à stries tout à fait nulles, sauf la suturale, et par l'écusson plus grand.

12. CATOPSIMORPHUS JOSEPHINÆ Sauc. Fr. Soc. ent. 1862. 286.
Pl. 8 f. 4. — Long. 3 mill. — Col de Las Portas, près Port-Vendres (Pyr.-Or.). Sous une pierre avec des Atta.

♀ Ovale-oblong, noir, brillant; antennes d'un brun noir, filiforme, plus longues que la tête et le prothorax, insensiblement épaissies au sommet, non comprimées, à articles non serrés, les premiers allongés, les pénultièmes presque carrés; 8^e carré, plus étroit et un peu plus court que les contigus, 11^e de la longueur des 2 précédents, obliquement acuminé. Ces antennes rappellent celles du *Catops fuscus*. — Tête grande, noire, lisse, une faible impression au milieu du front. Prothorax noir, court, 2 fois plus large que long, bien plus rétréci en avant qu'en arrière; la plus grande longueur aux 2/3 postérieurs; bord antérieur droit, angles antérieurs très obtus et arrondis; côtés droits jusqu'à la plus grande largeur et de là fortement arrondis jusqu'aux angles postérieurs, qui sont obtus; base bisinuée; surface luisante, à ponctuation rare et fine, devenant forte et dense aux angles postérieurs, vers lesquels se trouve une grande impression assez marquée; pubescence fauve et peu serrée. Ecusson

en triangle allongé, noir, densément ponctué. Eytres testacées, luisantes, presque parallèles, à stries obsolètes, assez senties; extrémité noire; chaque élytre arrondie séparément au sommet; ponctuation très forte et peu serrée; pubescence fauve, peu serrée et couchée; çà et là de grands poils jaunes droits. Dessous et cuisses noirs, jambes et tarses bruns. ♀ Tarses simples, jambes intermédiaires droites.

13. CATOPSIMORPHUS ROUGETI Saucy. Fr. Soc. ent. 1853. 653. Ab. 1. 71'. — France.

14. CATOPS RUFIPENNIS Luc. Exp. Alg. II. 224, pl. 21, f. 3. — Mur. Mon. Cat. 65', 39, fig. 40. — Long. 5; larg. 2,3 mill. — Près d'Oran, ravin du Djebel; janvier. Sous les pierres.

Plus petit que le *celer*, il ne peut se confondre avec lui à cause de ses élytres entièrement ferrugineuses. Tête noire, granulée. Palpes rougeâtres; antennes ferrugineuses, avec les derniers articles un peu brunâtres. Prothorax légèrement pubescent, très finement granulé, et assez convexe, noir, bordé de ferrugineux sur les côtés et à la base, côtés arrondis, ainsi que les angles postérieurs. Ecusson noir, pubescent et très finement granuleux. Elytres très pubescentes, ferrugineuses, finement granulées, striées, strie suturale assez profonde. Tout le dessous du corps noir. Pattes de la couleur des élytres, avec les cuisses tachées de brun, et les jambes finement denticulées.

15. CATOPSIMORPHUS FORMICETORUM Peyr. Fr. Soc. ent. 1857. 716'. 2. — ♀ *Fairmairei*. Delar. Fr. Soc. ent. 1860. Bull. 32. — Long. 3; larg. 1,8 mill. — Marseille, avec des fourmis.

♂ Ovale oblong, assez court, à pubescence roussâtre assez longue et assez épaisse; brun foncé, palpes plus clairs; antennes testacées, avec les articles intermédiaires plus obscurs, pattes testacées, avec les 4 cuisses postérieures brunâtres, bords latéraux et base du prothorax assez étroitement ferrugineux; élytres de cette couleur, sauf le disque qui est plus foncé. Tête très finement ponctué; antennes graduellement en massue, à peine plus longues que la tête et le prothorax, à 8^e article plus court, mais peu plus étroit que le 7^e et le 9^e, dernier

acuminé à l'extrémité, presque aussi long que les 3 précédents réunis. Prothorax court, à angles antérieurs obtus; côtés arrondis; angles postérieurs obtus, émoussés; base faiblement sinuée de chaque côté; ponctuation assez fine et peu serrée. Élytres pas plus larges et 2 fois plus longues que le prothorax, à stries fines mais bien marquées, la suturale fortement enfoncée, un peu raccourcie en avant; interstries un peu élevés et très rugueusement ponctués. Mésosternum dépourvu de carène. Tarses antérieurs et intermédiaires simples, ainsi que les hanches postérieures.

16. CATOPSIMORPHUS MYRMECOBIUS Rottb. Berl. Zeits. 1870. 39. Rép. 62. — Sicile.

17. CATOPSIMORPHUS CURTICORNIS Fairm. Fr. Soc. ent. 1877. Bul. LXV. — Long. 2 mill. — Constantinople (Turquie).

Ovale, assez convexe, non sensiblement atténué par derrière, marron, tête et prothorax rembrunis, pubescent de cendré, bouche testacée; antennes courtes, atteignant à peine le milieu du prothorax, brun-roux, base et surtout l'extrémité testacées, 1^{er} article allongé, 2-3 plus courts, 4-5 encore un peu plus courts que les précédents, 6^e très court, plus large, 7^e grand et large, 8^e très court, à peine plus étroit, 9 et 10 à peine transverses, dernier pyriforme; prothorax transverse, légèrement rétréci, seulement en devant, densément et finement ponctué, bord postérieur presque droit; écusson oblong, aigu, densément pointillé; élytres pas plus larges que le prothorax à la base, légèrement dilatées au milieu, très finement et densément ruguleuses, strie suturale marquée; pattes médiocres.

Voisin de l'*orientalis*, plus petit, plus étroit, plus elliptique; prothorax moins ample, un peu plus étroit que les élytres; antennes plus courtes, ce qui les fait paraître plus épaisses, le 8^e article plus court et plus étroit.

XIII — COLON Herbst. Käf. VII. 1797. p. 224. (Kolon).

Mylæchus Latr. Gen. Crust. Ins. II. 30.

Très voisin du genre *Catops*, il ne s'en distingue principalement que par ses antennes assez courtes, en massue, dont le 8^e article est plus grand que le précédent. Man-

dibules munies derrière la pointe d'une dent obtuse. Pénultième article des palpes maxillaires long et épais, le dernier petit, obtus. Menton presque aussi long que large par derrière, fortement rétréci par devant, languette légèrement échancrée. Corps ovale-oblong, très finement ponctué et pubescent. Mésosternum toujours caréné. Tarses antérieurs dans les deux sexes, ou simples, ou élargis plus fortement ♂; les mâles ont souvent avant l'extrémité des cuisses postérieures un appendice en forme de dent ou d'épine.

On trouve la plupart des espèces en fauchant les herbes au coucher du soleil.

1. COLON BIDENTATUS Sahl. Ins. Fen. 95,7. Gyl. Ins Suec. iv. 317. 4-5. Er. Brand. 247. 6. Sturm. Deuts. Fn. xiv. 60. 6. pl. 281. f. c. Kr. Stet. Zeit. 1850. 166*. 2. Fr. Soc. ent. 1863. 137. 2. pl. 4. f. 2. — Long. 1,3-2,3 mill. — Finlande, Suède, Allemagne, Suisse, Volhynie.

Voisin du *viennensis*, s'en distingue par la conformation des cuisses ♂, la massue des antennes foncée, les stries longitudinales des élytres moins distinctes, la forme plus parallèle, et la couleur d'un brun noir, pubescence gris-jaunâtre soyeux.

Antennes rouge-brun, massue foncée ou brun-noir, pointe du dernier article rougeâtre. Tête petite, densément et finement ponctué. Prothorax, comme dans *viennensis*, à ponctuation dense, fine et assez légère, un peu convexe, presque aussi long que large, avec sa plus grande largeur derrière le milieu, rétréci par devant, angles postérieurs très obtus, bord basal légèrement sinué de chaque côté. Elytres densément et finement ponctué, avec de légères traces de stries longitudinales, pas très régulières. Pattes rouge-brun, jambes antérieures étroites, tarses antérieurs simples dans les deux sexes. — ♂ Cuisses postérieures un peu épaissies, munies au-delà du milieu d'un denticule un peu saillant, finement dentelées en dessous en dedans du denticule; jambes postérieures non dentelées, munies d'un denticule obtus tuberculiforme. — ♀ Pattes postérieures simples.

2. COLON VIENNENSIS Herbst. Käf. vn. 225. 1. pl. 109. f. 10. — Er. Käf. Brand. 245. 2. Sturm. Deuts. Ins. xiv. 52. 2. pl. 282.

f. d. Redt. Fn. Aust. 146. 8. Kr. Stet. Zeit. 1850. 165*. 1. Tourn. Fr. Soc. ent. 1863. 135. pl. 4. f. 1. — ♀ *languidus* Er. Brand. 251. 11 (*pars*). Sturm. Deuts. Ins. xiv. 70. 12. pl. 283. f. B. — Long. 2,3-3 mill. — Suède, France, Allemagne, Suisse, Russie méridionale, Anatolie.

Allongé, légèrement convexe, brun-foncé, assez densément vêtu de poils serrés, brunâtres, brillants d'or. Antennes toujours rouge-jaune foncé, massue assez forte, également rouge-jaune. Tête petite, brun-foncé, densément et finement ponctuée, bouche rougeâtre. Prothorax un peu plus large que long, graduellement rétréci en avant, très légèrement arrondi sur les côtés, légèrement convexe, à points serrés, fins et un peu légers; bord basal légèrement sinué de chaque côté, angles postérieurs tronqués obliquement, à pointe obtuse. Elytres de moitié plus longues que le prothorax, légèrement rétrécies par derrière, à pointe obtuse, légèrement convexes, finement et densément ponctuées, stries longitudinales régulières distinctes. Pattes brun-rouge, jambes antérieures assez longues, un peu épaissies au milieu, aussi menues à la pointe qu'à l'origine, la pointe elle-même un peu élargie au bord interne, où les denticules sont implantés; tarsi simples dans les deux sexes. — ♂ Cuisses postérieures largement comprimées, s'élargissant fortement vers l'extrémité, tronquées au bout en angle droit, avec une dent obtuse derrière le milieu, finement dentelées le long du bord inférieur de la base jusqu'à la dent; jambes postérieures un peu courbées, finement dentelées en dessous. — ♀ Cuisses postérieures un peu comprimées, jambes postérieures simples.

3. COLON PUNCTICOLLIS Kr. Stet. Zeit. 1850. 167*, 3. Fr. Soc. ent. 1863. 138. 3. pl. 4. f. 3. — Fairm. Fr. Fn. 306. 2. — *dentipes* Er. Brand. 247. 5. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 58. 5. pl. 281. f. A. Heer. Fn. Helv. 385. 2. Redt. Fn. Aust. 145. 2. — Long. 1,8-2,5 mill. — France, Allemagne.

Plus court et plus ramassé que *bidentatus*, ovale, assez fortement convexe, brun-noir, garni de poils jaune-brunâtre, serrés, luisants, reconnaissable surtout à son prothorax grand et fortement ponctué. Antennes brun-rouge, massue assez forte, peu séparée, brun-foncé jusque sur

la pointe. Tête petite, fortement ponctuée, bouche rougeâtre. Prothorax grand, convexe, aussi long que large, rétréci par devant, légèrement arrondi sur les côtés, plus large que les élytres derrière le milieu, densément et fortement ponctué, bord postérieur légèrement sinué de chaque côté, angles postérieurs arrondis, obtus. Elytres ovales, assez convexes, un peu acuminées postérieurement, densément et assez finement ponctuées, outre la strie suturale il y a toujours des vestiges de stries longitudinales. Pattes rouge-brun, jambes antérieures et tarses simples dans les deux sexes. — ♂ Cuisses postérieures un peu comprimées, finement crénelées au bord inférieur, armées derrière le milieu d'une forte dent pointue, un peu arquée, crénelée aussi en dessous; jambes postérieures très légèrement sinuées à leur bord inférieur au-delà du milieu, et finement crénelées; ♀ simples.

4. COLON SERRIPES Sahl. Ins. Fen. 95. 8. Gyl. Suec. iv. 318. 4-5. Er. Brand. 248. 7. Sturm. Deuts. Ins. xiv. 62. 7. pl. 281. f. e. Heer. Fn. Helv. 385. 3. Redt. Fn. Aust. 146. 7. — Kr. Stet. Zeit. 1850. 168*. 4. Fr. Soc. ent. 1863. 139. 4. pl. 4. f. 4. — Fairm. Fr. Fn. 307. — ♂ *simplex* Thoms. Skand. Col. 1862. 71. Kr. Berl. Zeits. 1864. 48. — ♀ *fuscus* Er. Brand. 250. 10. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 69. 11. pl. 283. f. c. — Heer Fn. Helv. 385. 6. Redt. Fn. Aust. 146. 10. — Var. *Kraatzii* Tourn. Fr. Soc. ent. 1863. 140*. — Long. 2 mill. — Angleterre, Finlande, Allemagne, France, Suisse, Volhynie.

Ovale, assez convexe, noir-brun, vêtu de poils jaune-brunâtre, serrés, luisants, très voisin pour le faciès du *puncticollis*, cependant plus petit, distinct par son prothorax grand, assez finement ponctué, et par ses élytres très densément et finement ponctuées, avec de très légères traces de stries longitudinales. Antennes brun-rouge, massue assez forte, peu séparée, plus ou moins d'un brun-noirâtre. Tête assez densément et distinctement ponctuée. Prothorax densément et moins finement ponctué sur les côtés, convexe un peu arrondi sur les côtés, rétréci par devant, plus large au devant du bord postérieur que les élytres; bord basal légèrement sinué près du milieu, angles postérieurs obtus, arrondis. Elytres très densément et finement ponctuées, en pointe obtuse,

régulièrement avec de très légères traces de stries longitudinales, surtout sur la partie antérieure. Pattes rouge-brun, tarsi antérieurs simples dans les deux sexes. — ♂ Cuisses postérieures comprimées, peu épaissies, finement crénelées au bord inférieur, munies avant l'extrémité d'un denticule peu saillant; jambes postérieures très légèrement arquées au-dessus du milieu, finement crénelées au bord inférieur.

Var. *Kraatzi*. Cuisses postérieures fortement grossies, armées d'une dent proéminente tronquée à son extrémité. Prothorax ponctué également sur toute sa surface. Elytres sans traces de stries longitudinales.

5. COLON MYOPS Czwal. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 308*. — Long. 2-2,3 mill. — Caucase, mont Meskische.

Brun-rouge avec pubescence pas très épaisse, d'un éclat jaunâtre, pattes et antennes jaune-rouge, massue encore plus claire. Tête assez grande, très finement et densément ponctuée; yeux tout à fait contigus au prothorax, peu convexes, près de deux fois aussi larges de haut en bas que d'avant en arrière, au devant une fossette arrondie profonde, au bord antérieur de laquelle les antennes sont insérées. Celles-ci assez courtes, les articles s'élargissent à partir du 4^e, et la massue est peu séparée, des 4 derniers articles, d'égale longueur, le 1^{er} est plus étroit, le dernier tronqué droit est aussi large et quelquefois bien plus large que l'avant-dernier, et dans ce dernier cas, la massue entière paraît distinctement élargie vers la pointe. Prothorax grand, plus large que long, ayant sa plus grande largeur tout près des angles postérieurs, rétréci en courbe vers le sommet, d'abord légèrement, puis plus fortement; bord basal largement échancré en arc, les petites sinuosités ordinaires près de l'écusson à peine sensibles; la ligne latérale se courbe au dernier quart sous un angle très obtus très peu en dedans, et les angles postérieurs sont en angle droit pointu, saillants en arrière; les flancs sont entièrement ponctués au devant des hanches antérieures; ponctuation forte et profonde, les intervalles lisses, plus étroits que les points sur le pronotum, aussi larges sur les élytres. Elytres à peine aussi

Silphides de l'Enc.-M. — 1884.

7

larges et deux fois aussi longues que le prothorax, un peu obtusément arrondies par derrière, strie suturale visible jusqu'en devant, un peu plus écartée de la suture dans la première moitié. Jambes et tarsi antérieurs très peu élargis ♀, un peu plus fortement ♂; cuisses postérieures ♂ un peu élargies, munies au premier quart du bord interne d'une dent un peu dirigée en arrière du quart de la longueur de la cuisse qui, un peu étroite, de même diamètre jusque près de l'extrémité, est recourbée en crochet par en dedans; jambes postérieures droites.

Voisin de *angularis*, s'en distingue par ses petits yeux, la massue antennaire tronquée, les angles postérieurs du prothorax projetés en arrière en angle droit pointu, et les épisternes entièrement ponctués.

6. COLON MICROPS Czwal. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 318°. — Long. 2,4 mill. — Angleterre.

Brun-rouge, antennes et pattes à peine plus claires, forme allongée du *claviger*, mais avec le prothorax plus étroit et les élytres arrondies un peu plus en pointe par derrière, également moins parallèles, très densément et finement ponctuées, densément pubescentes de gris jaunâtre. Tête densément et finement ponctuée; yeux peu convexes, gris, de deux fois plus larges que hauts, au-devant desquels une fossette, pas tout à fait aussi large que leur petit diamètre, avec l'insertion antennaire à son bord antérieur. Antennes déliées, massue assez forte, bien séparée, les 4 derniers articles d'égale largeur, le dernier de la largeur du pénultième, largement arrondi au bout. Prothorax peu plus large que long, distinctement plus étroit que les élytres, ayant sa plus grande largeur au devant des angles postérieurs, rétréci en ligne droite très peu par derrière, plus fortement par devant, vu de côté la ligne marginale se courbe au dernier tiers, très peu en dedans et en haut, de sorte que les angles postérieurs sont un peu plus grands que droits. Elytres 2 1/2 fois aussi longues que le prothorax, en ovale allongé, ayant leur plus grande largeur au milieu du corps. Episternes très finement ponctués, un peu luisants, épipleures densément et fortement ponctuées. ♂ inconnu.

Fait le passage entre *myops* et *claviger* par ses yeux

déprimés, oblongs, et les angles du prothorax presque droits.

7. COLON ANGULARIS Er. Brand. 249. 8. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 64. 8. pl. 282. f. A. — Heer Fn. Helv. 385. 4. — Redt. Fn. Aust. 146. 6. — Kr. Stet. Zeit. 1850. 190*. 15. — Fr. Soc. ent. 1863. 152. 18. pl. 6. f. 16. — Fairm. Fn. 309. 10. — Var. *rectangulus* Chaud. Mosc. Bul. 1845. III. 201. — Long. 2,5 mill. — France; Allèmgagne, Berlin, Hesse, Saxe, Thuringe; Suisse: Bâle; Volhynie.

Brun-foncé, vêtu d'une pubescence serrée, brun-clair, brillante, reconnaissable à ses antennes, pattes rouge-brun, son prothorax grand, densément et fortement ponctué, avec les angles postérieurs droits, et les élytres assez fortement ponctuées sans trace de stries longitudinales. Antennes rouge-brun clair, massue jaune-ferrugineux, assez forte, peu séparée, tronquée à l'extrémité. Tête profondément et fortement ponctuée. Prothorax presque plus long que les élytres, à peu près aussi long que large, ayant sa plus grande largeur au milieu, fortement arrondi sur les côtés, assez fortement convexe, à points serrés, forts et profonds; bord basal assez tronqué droit, angles postérieurs droits. Elytres ovales, pointues, légèrement convexes, assez fortement et densément ponctuées; hors la strie suturale, pas trace d'autres stries longitudinales. Pattes rouge-brun, jambes antérieures moins élargies vers l'extrémité, angle externe de la pointe un peu avancé. — ♂ tarsi antérieurs plus dilatés que ♀; cuisses postérieures un peu comprimées, le bord inférieur forme derrière le milieu un petit angle saillant, à pointe obtuse, qui sur l'autre côté est limité par une pointe saillante. ♀ pattes postérieures simples.

8. COLON CLAVIGER Herbst. Käf. VII. 226. 2. pl. 109. p. 11. — Erich. Käf. Brand. 244. 1. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 50. 1. p. 279. f. A. — Heer Fn. Helv. 384. 1. — Redt. Fn. Aust. 146. 6. — Kr. Stet. Zeit. 1850. 170*. 5. — Fr. Soc. ent. 1863. 140. 5. pl. 4. f. 5. — Fairm. Fr. Fn. 309. 9. — Long. 2,8 mill. — France, Allemagne, Suisse.

Allongé, presque cylindrique, en pointe obtuse devant et derrière, noir-brunâtre, pubescent de jaune-gris, distinct par sa massue très forte et par son pronotum très densément et assez finement ponctué, strigieux longitu-

dinalement, avec les angles postérieurs aigus. Antennes rouge-brunâtre, les 3 avant-derniers articles de la massue, qui est d'un noir luisant, très grands et forts, une fois aussi larges que longs, article apical à peine moitié aussi grand que le précédent, très court, l'extrémité obtuse, rougeâtre. Tête densément ponctuée, bouche rougeâtre. Prothorax presque aussi long que large, graduellement rétréci en avant à partir du milieu, assez finement et très densément ponctué, de sorte que les points se réunissent plusieurs fois en petite strie longitudinale; les angles pour l'ordinaire s'avancent en angle droit pointu; bord basal presque imperceptiblement sinué de chaque côté. Elytres un peu plus de deux fois aussi longues que le prothorax, en ovale allongé, sans stries longitudinales sauf la suturale et celle de bord externe; ponctuation assez fine, très serrée et régulière, de sorte que, vus de l'avant, les points forment des rangées longitudinales très serrées, vues d'un autre point, elles paraissent très finement granulées. Pattes rouge-brun, jambes antérieures élargies en triangle de la base au bout dans les deux sexes, l'angle externe de l'extrémité un peu saillant. — ♂ tarsi antérieurs bien plus fortement élargis que ♀; cuisses postérieures grandes, largement épaissies, élargies au milieu en une large dent triangulaire, peu saillante, en pointe obtuse. Jambes postérieures incurvées au milieu, grêles à la base, un peu élargies du milieu au bout, finement crénelées au bord inférieur; simples ♀.

9. COLON AFFINIS Sturm Deuts. Ins. xiv. 669. pl. 282. f. d. — Kr. Stet. Zeit. 1850. 189*. 14. — Fr. Soc. ent. 1863. 151. 17. pl. 6. f. 15. — *confusus* Fairm. Fr. Soc. ent. 1857. 730. 6. — Fairm. Fn. 308. 6. — Long. 2 mill. — France: Pyrénées; Suisse, Genève, Saxe, Autriche, Volhynie.

Ovale allongé, brun, densément vêtu d'une pubescence gris-jaunâtre, brillante, d'une forme assez déprimée, parallèle, les exemplaires moyens de la taille de l'*angularis*, s'en distinguent par sa massue très forte, foncée, et le pronotum assez densément et fortement ponctué. Antennes brun-rouge, massue très forte, brun noir, la pointe du dernier article distinctement obtus, jaune-rouge. Tête distinctement, assez densément ponctuée. Prothorax

étroit, presque aussi long que large, assez fortement rétréci par devant, légèrement convexe, de la longueur des élytres au bord postérieur, assez densément et fortement ponctué, bord basal distinctement sinué de chaque côté, angles postérieurs obtus. Elytres allongées, assez parallèles, légèrement convexes, obtusément arrondies par derrière, finement et assez densément ponctuées, sans traces de stries longitudinales. Pattes rouge-brûn, jambes antérieures élargies vers l'extrémité. ♂ Tarses antérieurs plus fortement élargis que ♀ ; cuisses postérieures armées, derrière le milieu, d'une petite dent pointue saillante, dirigée en bas ; jambes postérieures incurbées derrière le milieu. ♀ Pattes postérieures simples.

confusus ne diffère que par ses cuisses postérieures non dentées ♂. De telles différences arrivent souvent dans le genre.

10. COLON PUBESCENS Luc. Expl. Alg. 1842. p. 226*. 585. pl. 21. f. 5
— Long. 2,2 ; larg. 1 mill. — Alger ; en février, sous les pierres.

Vient près du *brumeus*. D'un brun roussâtre, revêtu d'une pubescence jaunâtre, courte et serrée. Tête noire, très finement chagrinée, bouche roussâtre. Antennes hérissées de longs poils fauves, peu serrés, roussâtres, avec les derniers articles d'un brun foncé. Pronotum presque plan, chagriné et très légèrement rebordé sur les côtés, angles postérieurs assez saillants. Elytres allongées, finement chagrinées, légèrement roussâtres postérieurement. Dessous de la couleur du dessus. Pattes grêles, allongées, ferrugineuses.

11. COLON GRISEUS Czwal. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 310*. — Long. 2,6-2,8 mill. — France méridionale, Hyères, Dalmatie, Spalato.

Oblong, subdéprimé, brun-noir, antennes et pattes brun-rouge, massue noire, très densément et finement ponctué. Tête assez large, yeux peu saillants, arrondis. Antennes insérées tout près, un peu courtes et épaisses, massue forte, les articles presque de même longueur et de même épaisseur, le dernier obtus ; dans *armipes*, le dernier article distinctement plus long et plus large que le précédent, arrondi, dans *fuscicornis* distinctement plus

long, en pointe obtuse ; massue cylindrique dans *griseus*, s'élargissant dans *armipes*, fusiforme dans *fuscicornis*. Prothorax un peu plus large que long, à partir du 1^{er} quart rétréci presque en droite ligne, très peu par derrière, un peu plus fortement par devant ; angles postérieurs obtus ; bord latéral assez fortement rabattu, comme dans *fuscicornis*, plus légèrement dans *armipes*, épisternes densément ponctués jusqu'aux hanches. Elytres à peine plus longues que le prothorax et près de 3 fois aussi longues, presque d'égale largeur jusqu'au dessus du milieu, puis légèrement rétrécies, assez obtusément arrondies ; stries suturales affaiblies en avant, dans les autres espèces, assez profondes jusqu'à l'écusson, l'intervalle distinctement enfoncé sur le 1^{er} tiers, plus profond vers l'écusson. Tarses et jambes antérieurs assez fortement élargis dans les deux sexes, les dernières ♂ prolongées à l'extrémité externe en une dent obtuse, qui, presque aussi longue que la moitié de la jambe, est large à la pointe ; cuisses postérieures larges, armées derrière le milieu du côté interne, d'une grande dent légèrement courbée en dedans, qui s'étend jusqu'à l'extrémité des cuisses ; jambes postérieures arquées en dedans, s'élargissant un peu vers l'extrémité.

Voisin d'*armipes*, plus déprimé sur le dos, distinct par la pubescence grise très serrée, la massue des antennes presque cylindrique, et les stries suturales profondes.

12. COLON ARMIPES Kr. Stet. Zeit. 1854. 376*. — Fr. Soc. ent. 1863. 147. 12 pl. 5 f. 11. — Long. 2,3 mill. — Silésie, Saxe.

Couleur et forme des plus petits *bidentatus* Sahlb., ovale-allongé, noir-brunâtre, pubescence d'un gris jaunâtre. Antennes rouge-brun, massue assez forte, légèrement séparée, brun-noir, pointe du dernier article brun-rouge. Tête densément et distinctement ponctuée. Prothorax distinctement plus large que long, à ponctuation dense et visiblement assez profonde, ayant sa plus grande largeur avant la base, distinctement rétréci par devant, angles postérieurs obtus, bord basal sinué de chaque côté près du milieu. Elytres densément et assez finement ponctuées, sans traces de stries longitudinales. Pattes brun-rouge. Cuisses postérieures ♂ armées d'une dent

aiguë distinctement saillante; jambes fortement incurbées derrière le milieu et élargies; pattes postérieures ♀ simples.

♂ Se distingue aisément du *fuscicornis* par les cuisses postérieures armées d'une dent aiguë; au contraire, les ♀ très semblables, par la massue des antennes plus foncée et plus forte et sa couleur plus vert-noirâtre; — du *denticulatus*, ♂ par les jambes postérieures fortement incurbées, ♀ par sa forme plus allongée, plus étroite, son prothorax plus distinctement ponctué, ses élytres moins densément ponctuées, sans nulle trace de stries longitudinales; — l'*affinis* enfin a la massue beaucoup plus forte, les jambes postérieures ♂ moins fortement incurbées. Ne se peut confondre avec aucune des autres espèces.

13. COLON APPENDICULATUS Sahlb. Ins. Fen. 94. 6. — Zett. Holm. 1824. 152. 45. — Gyl. Ins. Suec. iv. 317. 4-5. — Er. Brand. 246. 3. — Sturm. Ins. Deuts. xiv. 54. 3. pl. 280. f. A. — Redt. Fn. Aust. 145. 3. — Kr. Stet. Zeit, 1850. 474. 9. — Fr. Soc. ent. 1863. 148. 13. pl. 5. f. 12. — Fairm. Fn. 307. 4. — Long. 2,2 mill. — Angleterre, Finlande, Suède; France, Pyrénées; Allemagne.

Elliptique allongé, assez-convexe, vêtu d'une pubescence gris-jaunâtre, brillante, distinct par la massue des antennes luisante, d'un brun noirâtre, la ponctuation très fine et dense, et les traces de stries longitudinales sur les élytres. Antennes brun-rouge, les 3 pénultièmes articles de la massue, qui est assez forte, toujours d'un brun noirâtre, le dernier ferrugineux. Tête brun-noir, avec la bouche brun-rouge, densément ponctuée. Prothorax sensiblement plus court que large, près du bord postérieur de la largeur de la base des élytres, rétréci en avant, faiblement arrondi sur les côtés, peu convexe, très densément et finement ponctué; bord basal profondément échancré de chaque côté. Elytres en ovale, peu à peu rétrécies de la base jusqu'au bout, peu convexes, très densément et finement ponctuées, outre la strie suturale, toujours des vestiges de stries longitudinales particulièrement sur la partie antérieure. Pattes rouge-brun; jambes antérieures dans les deux sexes élargies presque en

triangle. Tarses antérieurs ♂ plus fortement dilatés que ♀, cuisses postérieures un peu claviformes, armées sur leur bord interne au-delà du milieu, d'une assez longue épine dirigée obliquement en dessous, dont l'extrémité n'est pas pointue, mais échancrée en arc et garnie de poils dans l'échancrure; jambes postérieures incurbées au-delà du milieu; jambes postérieures ♀ simples.

14. COLON CALCARATUS Er. Brand. 264. 4. — Sturm. Ins. Deuts. xiv. 56. 4. pl. 280. f. c. — Redt. Fn. Aust. 145. 3. — Kr. Stet. Zeit. 1850, 175*. 10. — Fr. Soc. ent. 1863. 149. 14. pl. 6. f. 13. — Fairm. Fn. 308. 7. → ♀ *pygmæus* Er. Brand. 251. 12. — Sturm. Deuts. Ins. xiv. 12. 13. — Redt. Fn. Aust. 172. — Var. *nanus*. Er. Brand. 251. 13. — Sturm. xiv. 73. 14. pl. 283. f. c. Redt. Fn. Aust. 146. 10. — Kr. Stet. Zeit. — Fr. Soc. ent. 1863. 156. 15. — Fairm. Fn. 308. 8. — Long. 1,5-2 mill. — Allemagne, Autriche, France.

Légèrement convexe, brun-rougeâtre, vêtu d'une pubescence gris-jaunâtre, brillante, du faciès de l'*appendiculatus*, mais moitié aussi grand, très distinct par sa couleur plus claire, ses élytres densément mais moins finement ponctuées, sans trace de stries longitudinales. Antennes brun-rouge, 3 pénultièmes articles, ainsi que la base du dernier, brun-noir. Tête brun-noir avec la bouche rougeâtre, densément et finement ponctuée. Prothorax près de 1/3 plus large que long, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, assez fortement rétréci par devant, légèrement convexe, très densément et finement ponctué; bord basal légèrement échancré près du milieu, angles postérieurs peu obtus. Elytres à ponctuation régulière, dense et fine, sans trace de stries longitudinales. Pattes rouge-brun, jambes antérieures élargies en triangle dans les 2 sexes. Tarses antérieurs ♂ plus fortement élargis que ♀, cuisses et jambes postérieures tout comme dans l'*appendiculatus*.

nanus n'est qu'une variété de taille plus petite, de couleur plus foncée, de forme moins parallèle, à antennes plus foncées et à élytres plus fortement ponctuées.

15. COLON DENTIPES Sahl. Ins. Fen. 1. 93. 5. — Gyl. Ins. Suec. iv. 316. 4-5. — Kr. Stet. Zeit. 1850. 173* 8. — Fr. Soc. ent. 1863. 145. 9. pl. 5. f. 8. — Fairm. Fr. Fn. 308. 5. — *spinipes* Halid.

Newm. Ent. 190. 4. — ♀ *brevicornis* Sahl. Newm. ent. 93. 4. — Long. 2,3 mill. — Finlande, Angleterre, France, Allemagne, Volhynie.

En ellipse allongée, légèrement convexe, brun, vêtu d'une pubescence gris-jaunâtre, brillante; très reconnaissable et très facile à distinguer en particulier de l'*appendiculatus*, par sa forme large, déprimée, la ponctuation distincte du prothorax, la massue antennaire brun-rouge, peu séparée, et l'absence de stries longitudinales sur les élytres. Antennes brun-rouge, un peu plus fortes que dans les autres espèces, d'où la massue médiocrement forte, à peine plus foncée, moins séparée, les antennes elles-mêmes paraissent un peu plus courtes. Tête brun-noir, proportionnellement petite, densément et assez distinctement ponctuée. Prothorax visiblement plus court que large, près du bord postérieur de la largeur de la base des élytres, légèrement rétréci par devant, doucement arrondi sur les côtés, très légèrement convexe, moins densément et à cause de cela plus distinctement ponctué que dans *appendiculatus*; bord basal légèrement sinué de chaque côté. Elytres en ovale allongé, obtusément arrondies par derrière, à ponctuation régulière, assez serrée et fine, strie suturale profonde, pas traces d'autres stries longitudinales. Pattes rouge-ferrugineux, jambes antérieures, dans les deux sexes, assez courtes, droites, faiblement élargies. — ♂ Tarses antérieurs plus dilatés que ♀; cuisses postérieures assez fortes, un peu comprimées, non crénelées au bord inférieur, armées près de l'extrémité d'une longue dent obliquement courbée en dessous; ♀ simples.

15^a. COLON ZEBEI Kr. Stet. Zeit. 1854. 377*. — Fr. Soc. ent. 1863. 146. 10. pl. 5. f. 9. — Var. *Barnevillei* Kr. Fr. Soc. ent. Bul. 192. et 1863. 147. pl. 5. f. 10. — Long. 2,7-3,2 mill. — Allemagne, France.

Cette espèce ressemble extraordinairement au *dentipes* Sahl. par la forme générale et par la conformation de la dent crurale ♂, toutefois, elle s'en distingue bien par son prothorax un peu moins densément et beaucoup plus profondément et plus distinctement ponctué, ainsi que par les élytres tout autrement ponctuées. Antennes conformées tout comme dans le *dentipes*, massue d'un brun

foncé dans l'un et dans l'autre. Tête densément et profondément ponctuée, tandis qu'elle l'est densément et distinctement dans le *dentipes*. Prothorax en général semblable pour la forme, d'ordinaire un peu plus rétréci par derrière, au contraire, la ponctuation est tout autre ; elle est dense et profonde, de sorte que, vue d'arrière, on peut y reconnaître distinctement chaque point enfoncé, sans qu'ils se réunissent ; dans le *dentipes*, la ponctuation, quoique plus distincte et plus forte que dans *appendiculatus*, est cependant presque grossièrement chagrinée, mais ne peut s'appeler profonde. La ponctuation des élytres diffère encore davantage : assez dense dans le *Zebei* (à peu près comme dans *brunneus*), elle est, au contraire, dans le *dentipes*, extrêmement serrée et fine, ce qui rend les élytres mates, tandis qu'elles sont plus luisantes dans le *Zebei*. Pattes brun-rouge dans les deux, cuisses ♂ du *Zebei* armées d'une longue dent, conformée comme dans le *dentipes* ; cependant elle est ici encore un peu plus longue et se détache plus brusquement du bord de la cuisse, ce qui la fait paraître un peu plus étroite que dans celui-là.

La var. *Barnevillei* se distingue par une taille constamment plus petite, ses antennes toujours et entièrement testacées, son prothorax plus foncé que les élytres et leur ponctuation plus forte.

16. COLON RUFIPES Czwal. Deuts. Ent. Zeits. 1881. 314*. — Long. 2-2,8 mill. — Sierra de Cordoue, Asturies.

Brun-rouge foncé et même noir, pattes très claires, jaune-rougeâtre clair, jaune-rougeâtre dans les exemplaires foncés, antennes jaune-rougeâtre, les 4 derniers articles noirs, une pubescence gris-jaunâtre assez ou très épaisse tantôt laisse voir la couleur foncière, tantôt la cache complètement. Tête assez petite, large, yeux médiocres, convexes ; antennes peu épaisses, 1^{er} article à peine plus épais que les 2 suivants, les 3 d'égale longueur, les suivants devenant peu à peu plus courts et plus larges, 7^e bien plus étroit que le 8^e, les 4 derniers formant une massue nettement séparée, entre eux presque de même largeur, les 3 1^{ers} d'égale longueur, le dernier plus long, aussi long que large, en pointe arrondie ; dans quelques

individus, les 2 intermédiaires étant un peu plus larges, la massue n'est plus aussi cylindrique. Prothorax plus large que long, présente sa plus grande largeur tout près des angles postérieurs, se rétrécit légèrement en courbe vers le sommet, bord latéral s'abaisse en courbe (un peu plus que dans *dentipes*) et se réfléchit en dedans tout près des angles postérieurs, qui sont obtus, mais en pointe. Elytres un peu plus larges que le prothorax, plus ou moins allongées, se rétrécissant au 1^{er} tiers ou un peu après, et se terminant en pointe arrondie; strie suturale très superficielle en avant; ponctuation rugueuse, les points serrés sont piqués d'arrière, et confluent par de fines rides transverses, plus serrés sur le pronotum que sur les élytres; leur forme varie et par suite l'éclat; quelques-uns sont presque encore plus ternes que le *claviger*, d'autres très brillants, mais la plupart ont un éclat soyeux. Tarses antérieurs élargis dans les 2 sexes, plus fortement ♂, les jambes antérieures le sont légèrement; pattes postérieures conformées comme dans *dentipes*, la dent moins longue, plus courbée; jambes postérieures droites.

Dans les petits exemplaires la dent est plus courte, droite, dirigée obliquement en arrière; les jambes postérieures sont un peu arquées, 1-3 articles des antennes plus courts, 1^{er} plus fort.

Voisin du *dentipes* par la structure des pattes postérieures, plus ovale, avec le prothorax plus petit, distinct par la massue presque cylindrique et par la ponctuation rugueuse.

17. COLON FUSCICORNIS Kr. Stet. Zeit. 1852. 445. — *pubescens* Kr. Stet. Zeit. 1850. 171*. 6. — Fr. Soc. ent. 1863. 141. 6. pl. 4. f. 6. — Long. 2,3-3 mill. — France, Suisse, Allemagne.

Allongé, subcylindrique, noir-brunâtre, pubescence gris-foncé, brillante. Très voisin du *claviger*, il s'en distingue très bien par ses antennes autrement conformées, son pronotum moins densément et plus fortement ponctué et ses élytres plus finement ponctuées. Antennes brun-rouge, massue plus brun-foncé, parfois noirâtre, ayant sa plus grande largeur vers l'extrémité, dernier article au moins aussi large et presque moitié aussi long

que le précédent, en pointe très obtuse, rougeâtre. Tête noirâtre, densément et finement ponctuée. Prothorax pas tout à fait aussi long que large, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, légèrement convexe, rétréci par devant, densément et assez fortement ponctué, mais non marquées de strigosités longitudinales; angles postérieurs assez obtus, bord basal légèrement sinué de chaque côté. Elytres en ovale allongé, densément et finement ponctuées, sauf la strie suturale, sans traces de stries longitudinales. Pattes rouge-brun, jambes antérieures, dans les 2 sexes, élargies en triangle vers l'extrémité. — ♂ Jambes antérieures et tarses plus fortement élargis que ♀; cuisses postérieures grandes, aplaties, élargies au milieu en une large dent triangulaire, assez saillante, formant au bout un angle droit, jambes postérieures comme dans le *claviger*; pattes postérieures simples ♀.

18. COLON EMARGINATUS Rosh. And. 1856. 59*. — Long. 2,5; larg. 1 mill. — Yuquera; un seul ♂.

Ovale-oblong, assez convexe, brun, peu luisant, couvert d'une ponctuation très serrée et extraordinairement fine, et d'une pubescence serrée jaune d'or, soyeuse. Tête petite, noire, luisante, aussi densément et un peu plus finement que le reste du corps; bouche et palpes rougeâtres. Antennes courtes, aussi longues que le prothorax, 1-6 articles rougeâtres ainsi que le dernier à la pointe, les autres brun de poix, 1^{er} article obconique; un peu épaissi, 2^e et 3^e plus menus, de même grandeur, un peu plus courts que le 1^{er}, 4-6 de plus en plus courts et larges, 7^e distinctement plus large, mais à peine plus long que le précédent, les 4 autres égaux, fort épais, formant une massue oblongue, dernier un peu plus long et plus étroit que le pénultième, terminé en pointe obtuse. Prothorax presque aussi long que large, très légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci par devant, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, droit au sommet, avec les angles antérieurs obtus et abaissés, profondément échancré de chaque côté à la base, lobe médian fortement avancé, arrondi, angles postérieurs presque

droits, un peu convexe, à points très serrés et très fins, densément pubescent. Écusson triangulaire, arrondi au bout, ponctué de même. Elytres en ovale oblong, aussi larges et 1/2 fois aussi longues que le prothorax, droites sur les côtés, également rétrécies par derrière, arrondies ensemble au sommet, légèrement convexes, brunes, ponctuées et pubescentes comme le prothorax, sans traces de stries longitudinales. Dessous rouge-ferrugineux, luisant, densément pubescent de jaune d'or, poitrine densément et finement, abdomen plus densément et très finement ponctué. Pattes rouge-ferrugineux, cuisses postérieures larges comprimées, munies derrière le milieu d'une petite dent obtuse; jambes un peu arquées, très peu épaisses vers l'extrémité.

Voisin de *pubescens* et *murinus*, le pronotum n'est ni densément et fortement ponctué, ni chagriné, mais également et très finement ponctué comme les élytres, et les antennes sont plus épaisses; ressemble au *pubescens* par les angles postérieurs du prothorax presque droits, mais il en diffère, comme du 2^e, par la base du prothorax bi-échancrée profondément.

19. COLON MURINUS Kr. Stet. Zeit. 1850. 172*. 7. — Fr. Soc. ent. 1863. 144. 8. pl. 4. f. 7. — Fairm. Fr. Fn. 307. 3. — Long. 3 mill. — France, Autriche, Hongrie, Italie, Sicile.

Ovale allongé, noir-brunâtre, légèrement convexe, vêtu d'une pubescence brillante, plus épaisse, gris-jaunâtre, distinct du *fuscicornis* et du *claviger*, par sa forme plus déprimée, plus large, sa massue antennaire plus légère, et son pronotum très finement et densément ponctué-chagriné. Antennes brun-rouge, massue assez forte, 1^{er} article plus long que chacun des deux suivants, dernier un peu plus étroit, mais considérablement plus long que le précédent, régulièrement en pointe obtuse, rougeâtre. Tête noirâtre, densément ponctué. Prothorax presque aussi long que large, avec sa plus grande largeur derrière le milieu, rétréci par devant, très finement et densément ponctué-chagriné; angles postérieurs obtus, bord basal légèrement sinué de chaque côté. Elytres près de deux fois aussi longues que le

prothorax, en ovale allongé, sans traces de stries longitudinales, à ponctuation régulière assez fine et dense, de sorte que sous un certain jour elle forme de fines rangées longitudinales, mais la surface ne paraît pas granulée. Pattes rouge-brun, jambes antérieures, dans les deux sexes, fortement, élargies en triangle spécialement en bout. Tarses antérieurs-♂ plus fortement dilatés que ♀, cuisses postérieures grandes, larges, comprimées, armées au milieu d'une dent saillante, pointue, un peu courbée en dessous, qui varie suivant la grandeur des exemplaires. Jambes postérieures incurbées au milieu, élargies peu à peu du milieu à l'extrémité, non crénelés; pattes postérieures ♀ simples.

20. COLON DENTICULATUS Kr. Stat. Zeit. 1850. 189. 13. — Fr. Soc. ent. 1863. 151. 16. pl. 5. f. 14. — Long. 1,7-2,3 mill. — France, Paris; Allemagne, Berlin.

Ovale obtus, un peu rétréci par derrière, brun-noirâtre, densément vêtu d'une pubescence gris-jaunâtre brillante, très voisin d'*appendiculatus*, mais considérablement plus petit, il s'en distingue par sa forme un peu plus convexe, la massue des antennes plus légère, et des traces à peine visibles de stries longitudinales sur les élytres. Antennes brun-rouge, massue faiblement séparée, brun foncé ou noirâtre, dernier article très court, ce qui fait paraître la massue tronquée. Prothorax de $\frac{1}{4}$ plus large que long, modérément arrondi sur les côtés, rétréci par devant, de la largeur des élytres au devant du bord postérieur, très densément et finement ponctué, angles postérieurs obtus, bord basal à peine visiblement sinué. Elytres légèrement convexes, obtusément arrondies, très densément et finement ponctuées, en dehors des stries suturale et marginale, marquées de très faibles traces de stries longitudinales surtout sur la moitié antérieure. Pattes brun-rouge, jambes antérieures médiocrement élargies en triangle. Tarses antérieurs ♂ plus dilatés que ♀. Cuisses postérieures armées, derrière le milieu, d'une petite dent pointue, saillante, dirigée droit en bas; jambes postérieures un peu courbées derrière le milieu ♂. Pattes postérieures simples ♀.

21. COLON BRUNNEUS Spence Lin. Trans. xi. 158. 18. — Er. Brand. 250. 9. — Sturm. Ins. Deuts. xiv. 67. 10. pl. 282. f. e. — Heer. Fn. Helv. 385. — Redt. Fn. Aust. 145. 5. — Latr. Gen. Crust. Ins. n. 30. 1. pl. 8. f. 11. — Kr. Stat. Zeit. 1850. 192. 16. — Fr. Soc. ent. 1863. 153. 19. pl. 6. f. 17. — Fairm. Fn. 309. 11. — Long. 1,5 mill. — France, Paris, commun; Allemagne, Suisse.

Ovale court, assez convexe, brun, avec une pubescence jaune d'or, soyeuse, brillante; reconnaissable à sa forme courte, son pronotum assez finement ponctué, avec les angles postérieurs un peu saillants et ses élytres pas trop densément ponctuées. Antennes rouge-ferrugineux; massue plus ou moins foncée à l'exception du dernier article. Tête assez petite, noirâtre, finement ponctuée. Prothorax environ de $1 \frac{1}{4}$ plus large que long, rétréci par devant, un peu rétréci vers la base, derrière le milieu, de sorte que les angles postérieurs, légèrement obtus, sont un peu projetés en arrière, passablement finement et assez densément ponctué; bord basal large, quelquefois légèrement échancré au milieu, légèrement découpé de chaque côté. Elytres se rétrécissant un peu vers l'extrémité, sans traces de stries longitudinales, ponctuées assez densément et plus finement que le prothorax; vues d'en haut, elles paraissent quelquefois rugueuses transversalement. Pattes rouge-brun, jambes antérieures faiblement élargies vers l'extrémité. — ♂ tarses antérieurs moins fortement élargis que ♀; cuisses postérieures un peu comprimées, assez élargies, munies au milieu d'un denticule peu saillant, l'angle inférieur de la pointe arrondi. ♀ Pattes postérieures simples.

22. COLON EPISTERNALIS Czwal. Deuts. Ins. Zeits. 1881. 315. — Long. 2 mill. — Cassel en Thuringe.

Brun-noir, avec une pubescence fine, assez épaisse, jaunâtre, pattes et base des antennes d'un jaune rougeâtre, massue foncée, assez épaisse, 1-4 articles presque d'égale largeur, le dernier aussi long que large, arrondi, les 5 derniers, très serrés, font partie de la massue. Tête assez grande, très finement, pas densément ponctuée. Prothorax court, ayant sa plus grande largeur au dernier tiers, côtés arrondis peu par derrière où les angles postérieurs deviennent très obtus, plus fortement par devant;

le bord latéral qui, vu de côté, forme presque toujours une ligne droite, est légèrement courbé, un peu replié en dessous au milieu; épipleures non impressionnées, mais un peu convexes particulièrement en devant, non ponctuées, luisantes. Elytres un peu plus larges que le prothorax, légèrement arrondies sur les côtés, ovales, un peu en pointe arrondie, stries suturales un peu plus visibles que d'habitude, jusqu'à l'écusson, ponctuées finement et densément, un peu granulées, cette granulation est visible jusqu'à l'extrémité quoique affaiblie; prothorax ponctué de même, un peu plus densément, granulation disparaissant vers le bord antérieur. — ♂ jambes et tarses antérieurs assez élargis, 1-3 articles des tarses aussi larges que longs, l'épine terminale courbée, cuisses postérieures un peu élargies, avec une petite dent aiguë dirigée en arrière, implantée sur le bord interne; cette dent n'est pas visible en dehors, l'angle externe est fortement arrondi, les jambes postérieures sont droites.

Forme ovale du *brunneus*, il s'en distingue par ses tarses antérieurs légèrement dilatés, la massue des antennes cylindrique, et les épisternes non impressionnés, luisants.

23. COLON RUFESCENS Kr. Stet. Zeit. 1850. 188*. 12. — Fr. Soc. ent. 1863. 155. 21. pl. 6. f. 19. — Long. 1,5 mill. — Berlin, Cassel, Paris, Genève.

Ressemble beaucoup, pour le faciès et la taille, au *calcaratus*, mais plus convexe; il s'en distingue très bien, ainsi que de toutes les autres espèces, par sa couleur rougeâtre et par sa massue antennaire, par son pronotum assez fortement et presque éparsement ponctué. Antennes rougeâtres, massue assez forte, dernier article plus étroit que le précédent. Tête rougeâtre, assez densément et finement ponctuée. Prothorax de 1/3 plus large que long, faiblement élargi au milieu, convexe, assez fortement et presque éparsement ponctué; bord basal légèrement échancré près du milieu, angles postérieurs subobtus. Elytres ovales, à ponctuation régulière, fine, mais non dense, sans traces de stries longitudinales. Pattes rougeâtres, jambes antérieures élargies en triangle. Pattes postérieures simples dans les deux sexes. ♂ Tarses anté-

rieurs fortement dilatés, jambes antérieures légèrement courbées, fortement épaissies et dentelées au côté externe.
 ♀ Tarses et jambes antérieurs très peu dilatés.

24. COLON LATUS Kr. Stet. Zeit. 1850. 194*. 19. — Long. 3,3 mill.
 — Allemagne, Hesse, Silésie, Thuringe, Styrie, Autriche.

Ovale court, très large, brun plus ou moins noirâtre, très densément vêtu d'une pubescence jaune d'or, brillante. Antennes rouge-jaune, massue à peine séparée, dernier article un peu plus long que le pénultième, tronqué ou en pointe obtuse. Tête brun noir, densément et finement ponctuée. Prothorax grand, presque encore une fois aussi large que long, ayant sa plus grande largeur derrière le milieu, plus large que la base des élytres, peu à peu rétréci de là vers le devant, très densément et assez finement ponctué; bord basal presque droit, à peine un peu sinué, angles postérieurs droits. Elytres à peine de moitié plus longues que larges, graduellement rétrécies par derrière, sans traces de stries longitudinales, très densément et finement ponctuées, strigieuses transversalement. Jambes antérieures fortement arquées à la base, un peu élargies vers l'extrémité. Pattes postérieures simples.

25. COLON DELAROUZEEI Tourn. Soc. ent. Fr. 1863. 154*. 20. pl. 6. f. 18. — Long. 2,3 mill. — Allemagne, Berlin.

Variant du brun ferrugineux au brun foncé, à pubescence jaunâtre; antennes testacées, massue légèrement brunâtre, assez courte. Tête noirâtre, densément et fortement ponctuée. Prothorax grand, transverse, presque plus large que les élytres, ayant sa plus grande largeur après le milieu, à ponctuation fine et serrée, angles postérieurs obtus. Elytres en ovale allongé, fortement et régulièrement rétrécies d'avant en arrière, à ponctuation dense, plus forte que celle du pronotum, sans traces de stries, sauf la suturale. Pattes d'un testacé rougeâtre; jambes antérieures droites. — Tarses antérieurs plus fortement dilatés ♂ que ♀; cuisses postérieures ♂ armées en dessous vers le milieu d'une dent très courte, triangulaire; jambes droites.

Voisin du *latus*, avec lequel il a été confondu, mais

très distinct par sa taille plus petite, sa forme plus étroite, la massue des antennes plus forte, un peu plus courte, sa ponctuation plus fine, et la dent triangulaire des cuisses postérieures ♂.

26. COLON SINUATUS Chaud. Bull. Mosc. 1845 III, p. 203*. 13. — Russie méridionale.

Taille des petits exemplaires du *brunneus*, plus allongé, parallèle. Tête large, yeux proéminents; antennes plus longues, plus fortes, s'épaississant davantage vers le bout; 1^{er} article fort, 2^e plutôt cylindrique que conique, 3^e plus court, cylindrique, 7^e plus large, les 3 suivants encore plus larges, plus épais, plus forts, légèrement velus, passablement brillants, 11^e plus court et plus large que les 3 précédents, faiblement arrondi, pubescent. Prothorax plus large que les élytres, côtés fortement arrondis avant la base, bords postérieur et antérieur coupés droit, angles antérieurs assez anguleux, postérieurs obtus, assez arrondis. Elytres allongées, un peu plus arrondies postérieurement que dans le *brunneus*, nullement élargies après les angles huméraux; ponctuation un peu plus fine et serrée; pubescence plus serrée, plus longue et plus dorée. Cuisses antérieures moins courbées, plus larges à la base; postérieures ♂ simples, minces à la base, s'élargissant jusqu'à l'extrémité où elles se terminent carrément. Pattes comme dans le *brunneus*; tarses antérieurs plus dilatés ♂ que ♀. — Tête et prothorax d'un noir brunâtre, poitrine foncée, abdomen de la couleur des élytres; bouche, palpes et 4-5 articles des antennes moins jaunes que dans le *brunneus*; 6 et 7 plus foncés, 3 suivants d'un noir brillant, 11^e foncé avec la pointe claire; tarses rouge-brun.

27. COLON SUBDEPRESSUS Chaud. Mosc. Bull. 1845 III, p. 204*. — Russie méridionale.

Voisin du *brunneus*, plus petit que les plus petits exemplaires de celui-ci, plus court, moins rétréci par derrière, moins convexe. Antennes plus courtes; massue plus forte, plus foncée, les 3 pénultièmes articles plus courts et plus larges; le dernier obtus, très court, foncé, rougeâtre vers le bout. Prothorax plus court, moins

arrondi sur les côtés, à ponctuation plus serrée et plus fine, à pubescence longue, d'un jaune grisâtre. Pattes plus courtes; cuisses postérieures à dent un peu plus faible que dans le *brunneus*.

www.libtool.com.cn

SILPHIDÆ

XIV — PTEROLOMA (πτερόν, *aile*; λῶμα, *bordure*)

Gyl. Ins. Suec. iv. 1827. 418.

Antennes plus longues que la moitié du corps, subfiliformes, poilues, les 5 derniers articles à peine épaissis. Tête dégagée, munie de deux ocelles sur le front. Prothorax subcordiforme, bordé et tronqué à la base, avec les angles postérieurs droits pointus, côtés largement réfléchis, deux fois plus étroit que les élytres. Celles-ci avec toutes leurs stries atteignant librement l'extrémité. Pattes allongées, cuisses rétrécies vers l'extrémité, postérieures dépassant le bout des élytres; jambes poilues, munies d'éperons.

Ce genre établi par Gyllenhal. Ins. Suec. iv. 1827, p. 418, sur un rare et curieux insecte a été regardé par lui comme un carabique, qu'il range près des *Nebria*, manière de voir adoptée par Dejean dans son *Species*. Fischer a décrit le même insecte sous le nom d'*Adolus brunneus*.

1. PTEROLOMA FORSTRÆMI Gyl. Ins. Suec. ii. 1810. 111. 27. — iv. p. 418. 1. (*Harpalus*). — Dej. Spec. v. 510. Icon. ii. pl. 83. f. 4. — Zetterst. Ins. Lap. 31. 1. — Esch. Zool. Atl. 1829. i. 7. pl. 4. f. 3. — Mots. Mosc. Bul. 1845. 47. — Gebl. Mosc. Bul. 1847. 442 (152). — Mén. Middend. 1851. 47. — Thoms. Skand. iv. 21. 1. — *brunneum* Fisch. Ent. Ross. iii. 243. pl. 14. f. 1 (*Adolus*). — *Gravenhorsti* Schilling. Schles. Beit. 93. pl. B. — Long. 7; larg. 3,5 mill. — Europe, Suède, Laponie, Russie, Carinthie, Sibérie, Kamtschatka.

Allongé, rétréci et subdéprimé en devant, ovale ventru et convexe postérieurement, noir-luisant, antennes, palpes, jambes et tarses roux. Antennes longues, grêles, ciliées, dépassant le milieu du corps; articles longs, filiformes, 3-6 subégaux, 2° moins long, 7-8 un peu plus courts et plus épais, 3 derniers oblongs, subégaux, peu épaissis. Tête rétrécie derrière les yeux, qui sont saillants; front inégal, séparé de l'épistome; labre bilobé; palpes longs et

très grêles. Prothorax (1,5/2 mill.) largement échancré en devant avec les angles arrondis; côtés largement rebordés réfléchis, rétrécis sinués par derrière, tronqué à la base avec les angles aigus et divariqués, dos parsemé de forts points, réunis par places, creusé d'une large fovéole au devant de l'écusson. Celui-ci en triangle allongé étroit. Elytres (5/3 mill.) ovales élargies postérieurement, beaucoup plus larges à la base que le prothorax, épaules saillantes quoique arrondies, entourées d'un étroit et mince repli; épipleures inégales, larges, n'atteignant pas le sommet qui est prolongé en pointe; dos déprimé le long de la suture jusqu'au milieu; lignes striales de gros points serrés, 5 en dedans de l'épaule et 4 en dehors; interstries lisses. Pattes très grêles et longues, hanches subcontiguës.

2. PTEROLOMA PALLIDUM Esch. Zool. Atl. i. 1829. 7^e. pl. viii. f. 8.
— Manh. Mosc. Bul. 1853. 175'. — Long. 5 mill. — Kamschatka
sous les pierres ou les troncs d'arbres.

Brun-pâle; prothorax étroitement rebordé, avec un enfoncement de chaque côté le long du bord latéral, qui est densément ponctué. Élytres marquées de stries distinctes, ponctuées. Articles des 4 tarses antérieurs plus courts que dans le *Forstroemi*.

XV — NECROPHILUS (νεκρός, *mort*; φίλος, *ami*)

Latr. Règn. anim. 1829. iv. p. 500.

Corps large, ovale. Mandibules simples; mâchoires à lobe interne mutique. Antennes de 11 articles, 3^e aussi long que le 1^{er} et deux fois plus long que le 2^e, les 5 derniers formant une massue séparée, médiocre, à articles peu serrés, transverses, le dernier arrondi. Labre échancré. Dernier article des palpes maxillaires cylindrique. Prothorax transverse, échancré en devant, avec les angles arrondis. Elytres entourées d'un large et mince rebord réfléchi, arrondies, étroitement tronquées au bout, avec une petite dent suturale. Hanches intermédiaires contiguës; trochanters postérieurs échancrés à la pointe, pattes longues, jambes arquées ♂, droites ♀, les quatre tarses antérieurs faiblement élargis et garnis de brosses de poils ♂.

Présente le faciès d'un petit *Silpha atrata*, mais une foule de caractères, spécialement la texture des élytres, l'éloignent.

La seule espèce du genre vit dans les champignons; les escargots surtout, dans les montagnes, les lieux humides; on le rencontre sous les pierres ou dans les coquilles d'*Helix* mortes.

1. NECROPHILUS SUBTERRANEUS Dahl. Illig. Mag. vi. 1807. 362. (*Silpha*) Sturm. Deuts. Ins. XIII. 118. pl. 270. Fairm. Fn. fr. 298. Redt. Aust. 317. Duft. Fn. Aust. III. 122. 15. — Long. 5-9; larg. 4-5 mill. — France, Vosges; mont Salève, près Genève; Autriche, Tyrol, Harz, Schneeberg et autres monts.

Ovale, convexe, noir, luisant, côtés du prothorax bruns translucides, base des antennes et hanches ferrugineuses. Tête assez petite, enfoncée, déprimée, non rétrécie en col, ponctuée, légèrement bifovéolée entre les antennes; labre échancré. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax, grêles à la base, 3^e article bien plus long que le 2^e et le 4^e, 5-6 petits granulés, les 5 derniers formant une massue lâche, médiocre, d'articles minces transverses, dernier court, arrondi, testacé. Prothorax (4,5/2,5 mill.) finement rebordé tout autour; base largement échancrée, presque droite, avec les angles obtus; côtés arqués, largement explanés, bord apical rétréci, échancré, angles arrondis; disque médiocrement convexe, lisse; largement ponctué latéralement. Ecusson petit, à peine distinct. Elytres (5/5 mill.) bombées sur le dos, bordées d'un mince repli assez large, séparé par une gouttière ponctuée; épipleures très larges, lisses, complètes, arrondies ensemble au sommet qui est étroitement tronqué et muni d'une petite dent suturale; 8 sillons de points serrés, bien marqués, réguliers. Hanches contiguës, pattes longues peu épaisses; jambes fortement arquées avec les 4 tarses antérieurs un peu dilatés patelliformes ♂; jambes droites et tarses simples ♀.

2. NECROPHILUS PICIPES Mots. Bul. Mosc. 1845. 52. 139. — Daourie.

Ressemble extrêmement par sa taille, sa forme et sa couleur, à l'*Hydrobius fuscipes*; il se place près du *hydrophiloides* Esch. Manh., de Sitka.

XVI — SILPHA (ζιλαφη, blatte) Lin. Syst. Nat. II. 1758. 569.

Corps allongé ou ovale. Tête enfoncée dans le prothorax, s'inclinant sur les hanches, sans ocelles. Antennes de 11 articles graduellement épaissis, ou les derniers articles formant une massue plus ou moins épaisse et abrupte de 4 articles, dont les 3 derniers seuls sont pubescents. Mandibules terminées par une pointe simple. Lobe interne des mâchoires terminé par un crochet corné, languette faiblement bifide au bout. Dernier article des palpes maxillaires ovale ou cylindrique. Prothorax large, en demi-cercle, rarement arrondi, à bords larges et tranchants, avec les angles arrondis. Ecusson cordiforme, acuminé. Elytres bordées sur les côtés d'un repli mince, séparé par une gouttière; ordinairement 3 carènes, qui disparaissent rarement. Hanches antérieures coniques et contiguës, intermédiaires rapprochées ou écartées. Tarses de 5 articles, les 4 premiers des antérieurs élargis ♂ et garnis en dessous de semelles de poils jaunes, dernier article long, armé de 2 forts crochets.

Ces insectes vivent presque tous dans les matières animales en décomposition et quelques-uns de proies vivantes, et font la chasse aux limaces et aux insectes; d'autres paraissent phytophages. Lorsqu'on les saisit, ils font sortir par la bouche et par l'anus un liquide brunâtre et infect.

Les larves sont bien connues : plusieurs ont été publiées : *polita* Girard, *atrata* Perris, p. 1876. 232 et beaucoup d'autres : *opaca* Fairm., Guér. Fr. 1846. 52. feuilles de betteraves; *reticulata* Novicki Wien. Zool. Bot. 1874. 359; *thoracica* Schæffer, *rugosa* Schicædte, *obscura* Blis-son, Fr. 1846. 69. pl. 2. f. 9; Guérin, *nigrita* Heer, *orientalis* Brullé.

La classification des espèces composant ce genre, a été le sujet de grandes divergences entre les entomologistes qui s'en sont occupés. A la suite de Leach, divers auteurs et tout récemment les éditeurs du nouveau catalogue des Coléoptères d'Europe et du Caucase, les ont réparties en plusieurs genres. Les caractères sur lesquels ils s'appuient ne nous paraissent ni importants ni précis; d'ail-

leurs le nombre des espèces étant fort restreint, nous ne reconnaissons pas l'utilité d'un pareil démembrement, cependant nous les conservons comme sous-genres ou groupes propres à diviser le genre.

Tableau synoptique des sous-genres et des espèces
de *Silpha*.

- A. Beaucoup plus court et moins allongé. Pattes moins longues. Antennes moins longues et moins grêles, ordinairement épaissies vers l'extrémité, les derniers articles formant une massue tantôt brusque, tantôt graduelle.
- B. Noir, élytres d'un jaune testacé avec 4 taches noires, ainsi que les côtés du prothorax. — I. *DENDROXENA* Mots. (*Xylodrepa* Thoms.) 1. *4-punctata* F. Eur. Sib.
- B'. Noir uniforme.
- C. Antennes épaissies graduellement vers l'extrémité.
- D. Prothorax formant un demi-cercle complet. — II. *PHOSPHUGA* Leach.
- E. Elytres sans carènes, noires, peu luisantes, pointillées.
- F. Elytres couvertes de points serrés réguliers. Pronotum ponctué également sur toute sa surface; plus large et moins convexe. 2. *lævigata* F. Eur.
- F'. Elytres couvertes de points fins écartés, mêlés de points carrés formant des lignes peu régulières. Pronotum plus étroit et plus convexe, ponctuation faible, presque nulle sur le dos.
3. *cribrata* Mén. G. Cauc.
- E'. Elytres tricarénées, rugueuses-ponctuées; noir luisant.
4. *atrata* L. Eur. Sib.
- D'. Prothorax tronqué ou échancré au sommet.
- E. Labre long, profondément incisé. Tête large, non rétrécie en col derrière les yeux. — III. *OICEOPTOMA* Leach.
- F. Dessus couvert d'une pubescence jaune soyeuse couchée; intercôtes sans reliefs.
- G. Tête surmontée d'une crête transverse entre les yeux; bord antérieur de l'épistome non renflé en bourrelet. Un tubercule postérieur saillant aux élytres.
5. *opaca* L. Eur. Sib.

- G'. Tête large, uniformément convexe, sans crête entre les yeux. Bord antérieur de l'épistome renflé en bourrelet. Tubercule postérieur des élytres insensible. 6. *Souverbii* Fairm. Pyr.
- F'. Dessus glabre. Intercôtes marqués de reliefs. 7. *reticulata*, F. Eur. Sib.
- E'. Labre court, largement et peu profondément sinué. Tête peu large et rétrécie en col derrière les yeux. — IV. SILPHA L.
- F. 3 carènes élevées, minces, lisses et luisantes sur les élytres.
- G. Ponctuation des intervalles très fine, râpeuse; gouttière marginale ponctuée comme le reste de la surface, sans rangées de fovéoles au fond.
- H. Rebord marginal fort élargi à l'épaule; carène intermédiaire bien moins élevée que les deux autres.
- I. Plus large; ponctuation plus fine et plus serrée, carène externe moins forte et plus raccourcie. 8. *carinata* Illig. Eur. Sib.
- I'. Plus allongé; ponctuation plus forte et moins serrée; carène externe plus élevée et plus prolongée. 9. *perforata* Gebl. R Sib.
- H'. Rebord marginal étroit jusqu'à la base; carène intermédiaire aussi élevée que les 2 autres.
- I. Fovéoles du prothorax bien marquées; gouttières sans fovéoles. 10. *tristis* Illig. Eur. Sib.
- I'. Pas de fovéoles au prothorax; gouttières avec de petites fovéoles. 11. *costata* Mén. Cauc.
- G' Ponctuation des intervalles plus grosse et moins serrée que celle des côtés; gouttière marginale ponctuée au fond d'une ligne de fovéoles.
- H. Points gros, carrés, non râpeux; pas de tubercule postérieur. 12. *orientalis* Brul. TG.
- H'. Points assez gros, râpeux; un tubercule postérieur. 13. *puncticollis* Luc. Alg. E^oTF^o.
- F'. Une seule carène élevée (externe), les deux internes peu élevées, flanquées de lignes de points un peu plus forts que la ponctuation foncière; surface un peu luisante.

- G. Large. Tubercule postérieur des élytres bien accusé, la carène externe le dépassant à peine.
14. *granulata* Ol. Médit.
- G'. Plus petit et plus étroit. Tubercule postérieur insensible, la carène externe prolongée.
15. *nigrita* Creutz. Alp.
- F". Pas de carène élevée sur les élytres; surface d'un noir très mat.
- G. Prothorax tronqué droit et plus large au bord apical. Ecusson lancéolé pointu. Points des élytres un peu plus forts, la ligne de petits points qui flanquent les carènes plus rapprochée et contrastant avec les autres. 16. *obscura* L. Eur. Sib.
- G'. Prothorax échancré en arc et plus étroit au bord apical. Ecusson plus court, cordiforme. Points des élytres plus petits, moins disparates avec ceux qui accompagnent les carènes. 17. *striola* Mén. Cauc.
- C'. Massue des antennes subitement élargie à partir du 7^e article. Hanches intermédiaires écartées. Pronotum vêtu d'une pubescence couchée soyeuse. Tubercule postérieur saillant.
- D. Large, noir, prothorax rouge, couvert d'un velouté jaune chatoyant. — V. *THANATOPHILUS* Leach.
18. *thoracica* L. Eur. Sib.
- D'. Plus petit, noir, prothorax tout au plus ferrugineux translucide sur ses côtés postérieurs, vêtu d'une fine pubescence grise couchée, peu fournie.
- E. Elytres parsemées de tubercules assez gros dans l'intervalle des côtes.
- F. Tête et pronotum couverts d'une pubescence courte; élytres dénudées, lignes juxta-carénales nulles; tubercules irréguliers, transverses.
19. *rugosa* L. Eur. Sib.
- F'. Tête et pronotum couverts d'une longue pubescence fournie; élytres parsemées de petits poils couchés; lignes juxta-carénales bien régulières; tubercules ronds, réguliers, bien alignés.
20. *laponica* F. Eur. Sib.
- E'. Elytres munies de 3 fines carènes simples, intervalles sans tubercules.

F. Elytres sans poils gris couchés clairsemés.

G. Large, rouge-brun à l'extrémité. Ecusson acuminé. Points indistincts; carènes non sinuées postérieurement, externe raccourcie.

21. *terminata* Hum. R^eSib.

G'. Etroit, Ecusson en cœur, non acuminé à la pointe. Elytres concolores, carènes sinuées au bout.

H. Prothorax ferrugineux sur les côtés postérieurs.

Elytres insensiblement pointillées; carène externe aussi longue que l'intermédiaire, interne raccourcie.

22. *latericarinata* Mots. Sib.

H'. Prothorax concolore. Elytres visiblement ponctuées; carène externe raccourcie, les deux autres entières.

23. *sinuata* F. Eur. Sib.

F'. Elytres parsemées de poils gris couchés clairsemés.

G. Elytres indistinctement ponctuées; carènes bien marquées même en dedans, prolongées au delà du tubercule postérieur.

24. *dispar* Herbst. FA.

G'. Elytres plus distinctement ponctuées; carènes internes très faibles, raccourcies, externe terminée brusquement au tubercule postérieur.

25. *baicalica* Mots. Sib.

A'. Corps très allongé, terminé postérieurement par une pointe arrondie plus ou moins allongée; pattes grêles et allongées, ainsi que les antennes, dont le 8^e article, en tranche conique, est beaucoup plus long que le 7^e et le 9^e; prothorax transverse, aplati, échancré au sommet. — VI. HETEROTEMNA Woll.

B. Lisse, luisant, finement pointillé; carénules obsolètes, sauf l'externe.

26. *simplicicornis* Brul. Tén.

B'. Terne, points des élytres assez forts, râpeux; carénules bien marquées..

27. *figurata* Brul. Tén.

I — Dendroxena (δένδρον, *arbre*; ξένος, *hôte*) Mots. — **Xylo-drepa** (ξύλον, *bois*; δρέπω, *recueillir*) Thms. Skand. iv. 1862. 17.

Ovale; tête rétrécie en col derrière les yeux, avec une impression transverse; labre échancré, un peu dépassé par les mandibules; antennes à massue de 4 articles, 8^e court un peu plus étroit que le 9^e, 2^e plus long que le 3^e. Elytres non tronquées, avec trois faibles carènes obsolètes.

Hanches intermédiaires un peu écartées; 1-4 articles des tarsi garnis de brosses, antérieurs ♂ dilatés, avec les jambes postérieures arquées.

1. SILPHA 4-PUNCTATA Lin. Syst. Nat. II, 571. 14. Fn. Suec. 453. — F. Syst. Ent. 75. Ent. S. I. 253. 19. S. El. I. 341. 21. — Gyl. Ins. Suec. I. 271. 10. — Payk. Fn. Suec. I. 335. 11. — Ol. Ent. II. 11. p. 10. pl. 1. f. 7 a, b. — Herbst. Käf. v. 192. 19. pl. 51. f. 8. — Marsh. Ent. Brit. 118. 9. — Er. Brand. 230. 7. — Heer. Fn. Helv. 389. 2. — Fairm. Fn. Fr. 295. 7. — Gebl. Mosc. Bul. 1830. 96. 1847. id. 441 (151). — *4-maculata* Samouelle Comp. 167. pl. 2. f. 7. — *4-punctulata* Muir. Zool. Prod. p. 63. — Long. 12; larg. 7 mill. — Europe, France : Le Mans, bois de Funay; Angleterre, Suède, Allemagne, Suisse; Sméinogorsk (Sibérie), Amur, commun dans les forêts, au printemps, sur les jeunes chênes, où ils font la chasse aux chenilles processionnaires.

Ovale-oblong, légèrement convexe, lisse, luisant, glabre en dessus, légèrement pubescent en dessous, noir, prothorax jaune testacé largement sur les bords latéraux et étroitement sur les autres bords, élytres entièrement de cette couleur, mais ornées chacune de 2 taches noires arrondies, l'une sur la bosse humérale, l'autre sur la postérieure qui est plus faible. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax, 1^{er} article moins long que les 2 suivants ensemble, 3^e plus court que le 2^e et égal au 4^e, 5-7 petits, presque aussi larges que longs, 8^e plus large, transverse, les 3 derniers pubescents, en massue peu épaisse, dernier ovoïde. Tête médiocre, en triangle, rétrécie en col derrière les yeux qui sont gros et saillants, convexe et assez fortement ponctuée; labre largement échancré. Prothorax (4/6,5 mill.) à bord basal large, en arc, à peine sinué de chaque côté, épaissi; côtés fortement arrondis avec les angles rebordés; bord apical échancré droit et peu profond; disque un peu élevé, ponctué plus fortement, mais moins densément que sur les côtés qui sont explanés et séparés par un sillon coudé, bien enfoncé. Ecusson large lancéolé, ponctué dans sa moitié antérieure. Elytres (9/7 mill.) arquées sur les côtés avec le repli mince, égal, entre une gouttière ponctuée au fond et l'épipleure cannelée et pointillée, arrondies à l'extrémité, suture élevée; carènes marquées seulement par les 2 lignes de petits points qui les limitent,

l'externe seule un peu saillante, raccourcie au niveau de la tache postérieure; surface densément et ruguleusement ponctuée. Tarses antérieurs un peu dilatés et jambes postérieures courbées ♂, droites ♀.

Var. *6-carinata* Mots. Etud. ix. 1860. 40* (*Dendroxena*). — Long. 12,5; larg. 7,5 mill. — Amur.

Forme et couleur du *4-punctata*, il diffère par ses élytres plus distinctement tricarénées, et les intervalles plus profondément ponctués. Ovale, allongé, atténué par derrière, très ponctué, luisant noir, bords du prothorax et élytres testacés, celles-ci avec 4 points noirs, les postérieurs transverses.

II — Phosphuga (φῶς, lumière; φεύγω, fuir) Leach. Zool. Misc. III. 1817. p. 75.

Tête étroite, allongée, non rétrécie en col derrière les yeux; labre profondément échancré, dépassé par les mandibules très saillantes; antennes allongées, massue de 3 articles oblongs, lâches, 2 et 3 subégaux. Prothorax en demi-cercle; hanches intermédiaires contiguës; tarses antérieurs ♂ légèrement dilatés.

2. SILPHA LÆVIGATA F. Syst. Ent. 1775. p. 74. Ent. Syst. I. 252. 14. Syst. El. II. 340. 16. — Payk. Fn. Suec. I. 331. 6. — Fairm. Fn. Fr. 297. — Ol. Ent. II. 11. 14. 13. pl. 1. f. 1. — Gyl. Ins. Suec. I. 265. — *polita* Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776. p. 28. pl. 2. f. 16. — Heer Fn. Helv. 392. — Long. 11-14; larg. 6-8 mill. — Suède, France, Alpes, Suisse, Allemagne, Illyrie, Dalmatie, Grèce. Var. *gibba* Brul. Exp. Mor. 1832. 162. pl. 37. f. 1.

Ovale oblong, convexe, noir, luisant. Antennes assez longues, n'atteignant pas la base du prothorax; 1^{er} article aussi long que 2-3; 4^e oblong, les suivants de plus en plus courts et élargis, pointillés, poilus, 9-10 transverses, pubescents, égaux chacun au 8^e, dernier subarrondi, court; massue non séparée. Tête densément ponctuée, convexe, avec 3 petites fovéoles à peine sensibles, entre les antennes et les yeux qui sont oblongs, col faiblement rétréci; épistome incisé. Prothorax (5/8 mill.) convexe, densément et également ponctué, presque en demi-cercle rétréci en devant, sans angles apparents, entouré d'un rebord peu élevé, très fin antérieurement, bord basal presque droit, relevé, avec les angles arrondis. Ecusson

lancéolé ponctué. Elytres (10/8) mill.) couvertes de points serrés, égaux, sans apparence de carènes, bordées d'une gouttière étroite, avec une série d'assez gros points au fond, rebord élevé tranchant; épipleures creusées; extrémité des élytres arrondies. ♂ Tarses antérieurs dilatés, intermédiaires plus longs et moins larges.

Les larves se nourrissent d'*Helix*. On a constaté qu'elles sont quelquefois nuisibles aux betteraves.

3. SILPHA CRIBRATA Mén. Cat. rais. 1832. 168. — Fald. Fn. Transc. 1. 231. pl. 7. f. 7. — Long. 12; larg. 7 mill. — Grèce, Caucase.

Ovale oblong, convexe, noir, plus ou moins luisant. Antennes menues, n'atteignant pas la base du prothorax, un peu épaissies vers le bout, sans massue bien séparée, 2-3 articles allongés, subégaux, les suivants petits, courts, les 3 derniers pubescents, 9-10 transverses, égaux, dernier pyriforme. Tête ponctué, convexe entre les yeux qui sont ovales, impressionnée sur le col, creusée de 3 fovéoles, placées en ligne transverse entre les yeux et les antennes; épistome échancré. Prothorax (5/6 mill.) convexe, élevé et finement pointillé sur le disque; dos limité par une impression inégale, pourtour plus distinctement pointillé et parsemé de rares points plus forts; bord basal largement arqué sinué, avec les angles arrondis; tout le devant formant un demi-cercle, sans angles antérieurs marqués, entouré d'un rebord peu élevé, devenant très fin en avant. Ecusson ogival, à points épars. Elytres (9/8 mill.) bombées, parallèles sur les côtés, arrondies à l'extrémité, entourées d'un rebord réfléchi, mince, séparé par une gouttière à gros points au fond; épipleures creusées, ponctuées; bossette humérale sail-lante; surface avec de très petits points faibles peu serrés, entre lesquels on voit de gros points carrés formant des séries irrégulières; les 2 carènes internes sont représentées par des lignes lisses nullement élevées. Tarses antérieurs élargis ♂.

Se distingue de *lævigata* par ses antennes plus grêles, à articles plus longs à la base, par sa tête à fovéoles frontales et à impression du col plus fortes, mais surtout à la ponctuation plus fine, moins serrée, mêlée de grands points carrés, et aux lignes lisses dorsales des élytres.

4. *SILPHA ATRATA* L. Fn. Suec. n° 451. Syst. Nat. i. 2. 571. 12. — F. Ent. Syst. i. 251. 11. Syst. El. i. 339. 12. — Payk. Fn. Suec. i. 330. — Gyl. Ins. Suec. i. 266. 6. — Mén. Ins. Lehm. Pet. Ac. Mém. 1849. VIII. 36. — Fairm. Fn. Fr. 1854. p. 297. 16. — Herbst. Natur. Käf. v. 1793. p. 183. 11. pl. 51. f. 1. 3 Schæf. Abhand. 1799. 111. pl. 71 — *punctata* Herbst. Natur. Käf. v. 1793. p. 199. 24. pl. 51. f. 13.
- Var. *brunnea* Herbst. Nat. Käf. v. 1793. 202. 26. pl. 51. f. 15. — *fusca* Herbst. Nat. Käf. v. 1793. 200. 25. pl. 51. f. 14. — Gebl. Ledeb. Reise. 1830. II. 95. Bull. Mosc. 1847. 440. 150. — Sméinogorsk, Barnaul (Sibérie occidentale).
- Var. *cassidea* Dahl. Kr. Deuts. Ent. Zeits. 1876. 362.
- Var. *subrotundata* Steph. Ill. Brit. III. 29. pl. 16. f. 3.
- Var. *pedemontana* F. Syst. El. i. 339. 13. — Long. 9-13; larg. 6-7 mill. — Europe; Sibérie.

Ovale oblong, légèrement convexe, noir luisant. Antennes grêles, allongées, dépassant la base du prothorax, 1^{er} article épaissi légèrement au bout, droit, plus long que les deux suivants ensemble, 2-5 obconiques subégaux, oblongs, 6-7 plus courts, plus petits, 8^e un peu élargi, 9 et 11 subovales, peu serrés, un peu plus gros, et formant une massue assez distincte. Tête étroite, allongée, ponctuée, avec les yeux arrondis, assez convexe; milieu convexe, élevé en bosse au sommet, impressionnée et un peu rétrécie en col; épistome profondément incisé. Prothorax (4/7 mill.), formant un demi-cercle régulier, entouré d'un bourrelet uniforme, lisse, bord basal presque droit, avec les angles obtus, milieu du disque à peine élevé, entouré d'impressions peu régulières, peu ponctué, mais les points du pourtour sont serrés et rugueux. Ecusson lancéolé, ponctué. Elytres (9/7 mill.), dilatées-arrondies, légèrement convexes, entourées d'un large rebord tranchant, séparé par une profonde gouttière, élargie vers la base, angle huméral arrondi; 3 carènes lisses, assez élevées, rapprochées à la base, raccourcies postérieurement, externe sans calus basal, ni tubercule postérieur, fond des élytres couvert de forts points serrés rugueux. Pattes grêles et allongées.

La taille varie beaucoup, le prothorax présente parfois une légère troncation au sommet, les élytres sont plus parallèles ou plus ovalaires, déprimées ou un peu convexes sur le dos, enfin la couleur, ordinairement d'un

noir brillant, tourne parfois au brun et au marron. Les anciens auteurs ont établi une nombreuse série d'espèces. La variété marron mérite seule d'être retenue. La *nitida* de Faldermann du Caucase ne peut se séparer de l'*atrata*, malgré sa grande taille, sa forme plus allongée, et même le sommet de son prothorax tronqué et un peu sinué.

III — *Oleceoptoma* (οἰκέω, habiter; πτώμα, cadavre)

Leach. Zool. Misc. III. 1817. p. 75.

Ovale, subdéprimé. Tête nou rétrécie derrière les yeux, qui sont petits. Labre grand, couvrant presque les mandibules, profondément incisé et bilobé. Antennes à 2^e article plus long que le 3^e, 8^e égal au 9^e, massue médiocre. Prothorax tronqué au sommet. Elytres à 3 carènes distinctes, plus ou moins élevées. Hanches antérieures subcontiguës. 1-4 articles des 4 tarsi antérieurs dilatés ♂, garnis de brosses en dessous.

5. SILPHA OPACA Lin. Fn. Suec. 453. — Syst. Nat. II. 571. F. Syst. EL. I. 341. 10. — Schmidt Dissert. 1841 p. 28. — Gyl. Ins. Suec. 1. 268. — Duft. Fn. Aust. III. 114. 3. — Er. Mark. Brand. I. 230. 6. — Sturm. Deuts. Ins. XIII. 96. 5. — Heer. Fn. Helv. 390. 9. — Kust. Kæf. Eur. IV. 55. — Fairm. Fr. Soc. Ent. 1852. pl. 11. f. 3. — } Guér. Fr. Soc. ent. 1846. Bull. 72. — *hirta* L. Gmel. IV. 1. p. 1622. — *tomentosa* Hbst. Kæf. V. p. 203. pl. 51. f. 15. — *villosa* Naezen. Holm. 1792. p. 168. f. 7. — Gebl. Ledeb. Reise. 1830. 96. — Mosc. Bul. 1847. p. 141 (151). — Fald. Pet. Ac. Mém. 1835. 340 (4). — Mots. Mosc. Bul. 1859. 491. — Peterb. Ac. Mel. Biol. 231. — Schrenk. Reise. 1860. 124. — Long. 10; larg. 5,5 mill. — France, Abbeville, Vosges; Allemagne, Suède, Helvétie, Jakutsk, Altaï, Amur.

Elliptique, allongé, parallèle, subdéprimé, noir luisant, en dessous, garni de cils gris, rougeâtres à l'extrémité, dessous vêtu d'une pubescence couchée, d'un jaune roux soyeux. Antennes assez longues, dépassant la base du prothorax, menues, 2^e article plus long que le 3^e, assez courts et peu larges de 4-7, les 4 derniers en massue, 2 pénultièmes pubescents, subégaux, un peu plus grands que le 8^e, dernier pyriforme. Tête densément pointillée, élevée en carène transverse entre les yeux, déprimée sur le front, col faiblement déprimé transversalement; labre profon-

dément incisé. Prothorax (3,5/6 mill.) pointillé, peu convexe sur le disque, qui est entouré d'une large impression sinueuse, faiblement sillonné au milieu et chargé au milieu, de chaque côté, de 2 élévations lisses, dénudées, disposées sur une ligne transverse, et en devant de l'écusson de 2 autres oblongues, irrégulières, rapprochées; bord basal avancé au milieu, largement bisinué avec les angles arrondis, débordant les élytres; côtés arrondis avec les angles antérieurs non accusés, bord apical droit; rebord très peu élevé, mince, surtout en devant. Ecusson lancéolé, pointillé. Elytres (7/5,5 mill.) parallèles sur les côtés, arrondies chacune au bout; rebord égal, étroit, épipléures en gouttière, ponctuées granuleuses; carènes fines, indistinctement flanquées de lignes de très petits points, intervalles égaux, marqués de petits points pilifères, égaux; carène externe plus tranchante, droite, se terminant à la bossette, qui est très marquée, interne droite, plus faible, raccourcie par derrière, intermédiaire à peine marquée si ce n'est par derrière. 1-4 articles des tarsi antérieurs ♂ élargis, ceux des intermédiaires un peu moins, plus longs, tous garnis en dessous de brosses de poils.

5^a. SILPHA ALTAICA Gebl. Ledeb. Reis. II. 1830. 94. 1^a. — 1847. Gebl. Mosc. Bul. 440 (150). — Long. 10,3; larg. 5,6 mill. — mont Altaï, fleuve Tschuja.

Densément pointillé, assez luisant en dessous, opaque en dessus. Tête large, peu tomenteuse, impressionnée entre les yeux. Antennes de la longueur du prothorax, noires, peu à peu épaissies en dehors, dernier article acuminé. Structure du prothorax comme dans l'*opaca*; côtés tomenteux de gris, toute la marge étroitement ferrugineuse. Ecusson triangulaire. Elytres à peine plus larges que le prothorax, linéaires, largement arrondies au bout; tomenteuses de gris en dessus, disque déprimé, tricaréné avec le tubercule obsolète, marge et bout étroitement ferrugineux. Tête et pattes noires, tomenteuses de pâle. — Très voisin de l'*opaca*, mais moins tomenteux, tête sans rides; élytres à tubercule obsolète.

5^b. SILPHA NUDA Mots. Mosc. Bul. 1845. 52. 140^a. — Lac Inderskoie. Remarquable par le manque de carènes sur le milieu

des élytres, qui sont lisses comme dans le *4-punctata*. Il est noir, un peu plus petit et plus allongé que *l'opaca*.

6. SILPHA SOUVERBII Fairm. Fr. Soc. ent. 1848, 168. Fn. Fr. 1854. 295,6. — Var. *alpicola* Kust. Käf. Eur. 1869 xvii 27. — Long. 10; larg. 6 mill. — France, Pyrénées, Caunterets, Bagnères, Esquierry, Transylvanie.

Elliptique, allongé, peu convexe, noir, terne et couvert en dessus d'une courte pubescence couchée, soyeuse, bronzée, luisant, peu pubescent en dessous. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax, article 2° oblong, à peine plus long que le 3°, 4-7 décroissant en longueur, devenant transverses, 8° élargi vers les 9-10, qui sont plus larges, courts, subégaux, ne formant pas une massue tranchée, pubescents ainsi que le dernier, qui est pyriforme. Tête grosse, large, convexe, sans étranglement derrière les yeux, très densément pointillée aciculée; front déprimé en devant avec le bord élevé; épistome incisé très profondément. Prothorax (3/5,5 mill.) très densément ponctué, peu convexe sur le milieu du disque, limité latéralement par une profonde dépression sinuée; côtés arrondis avec les angles, à rebord élevé, bord antérieur large et presque droit, sans rebord élevé, bord basal droit au milieu, un peu sinué près des angles. Ecusson large, cordiforme. Elytres (7/5,5 mill.) plus étroites que le prothorax, presque parallèles, arrondies au bout, densément ponctuées, rugueuses, 3 faibles carènes lisses, luisantes, presque droites, un peu raccourcies postérieurement, l'externe mieux marquée, tubercule postérieur à peine perceptible, rebord externe tranchant, séparé par une gouttière profonde; épipleures cannelées, peu ponctuées, se terminant à l'extrémité de l'abdomen. ♂ 1-4 articles des tarsi antérieurs et intermédiaires également dilatés et garnis de longues brosses de poils.

Ressemble beaucoup pour le faciès à *l'opaca*, mais les 4 derniers articles des antennes ne forment pas une massue bien séparée, sa tête large et convexe n'est pas munie d'une élévation transverse, son prothorax n'est pas inégal sur le disque et sinué au bord basal, le tubercule postérieur des élytres n'est pas saillant.

La var. *alpicola* Kust. est plus grande, plus large, et

élytres sont plus rugueuses et moins pubescentes. — Elle se trouve près des neiges, sur les montagnes de Transylvanie, près d'Hermanstadt.

6^a. SILPHA SERICEA Zoubk. Mosc. Bul. 1833. 320. Léf. 306. 19^e.
— Mots. Bul. Mosc. 1845. 52. 141. — Long. 12 ; larg. 7 mill. —
Lac Inderskoie.

Tout noir, couvert de soies jaunâtres, courtes et serrées. Antennes et yeux noirs. Milieu du prothorax étant un peu moins soyeux que les côtés, on voit qu'il est tout couvert de petits points enfoncés ; son bord postérieur est bisinué. Chaque élytre a une carène dénudée, et, entre cette carène et la suture, deux lignes dénudées, couvertes de points enfoncés, irréguliers. Dessous du corps et pattes noirs, brillants, ponctués, couverts de soies grises, noires.

6^a. SILPHA HEXASTIGMA Solsk. Ross. Hor. 1875. xi. 274 .39^e. —
Long. 12,5 ; larg. 6,8 mill. — Fleuve Souyfoua et Léfou (Amur).

Ressemble beaucoup au *sericea*. Oblong, ovale, quadrangulaire, un peu convexe, noir ; couvert en dessus d'une fine ponctuation très serrée, presque terne, et d'une fine pubescence couchée, cendrée, un peu soyeuse ; dessous luisant, presque glabre, finement ponctué-ruguleux. Tête assez forte, large, anguleusement dilatée derrière les yeux, qui sont petits, presque plats ; labre très profondément échancré ; antennes n'atteignant pas la base du prothorax, grossissant graduellement, mais peu, vers le bout, derniers articles transverses, 11^e ovoïde acuminé. Prothorax transverse, peu arrondi sur les côtés, assez faiblement rétréci vers le devant, largement bisinué à la base, obsolètement bisinué au bord antérieur, milieu convexe, bords latéraux largement explanés, limités en dedans par une impression oblique ; sur le disque se trouvent 6 petites callosités lisses, luisantes, 4 en rangée transversale entre le milieu et le bord postérieur, 2 autres sur le milieu même, faisant face aux externes de la rangée. Elytres oblongues, à peine plus larges que le prothorax, assez parallèles, obtusément arrondies au bout, avec les bords latéraux largement explanés et fortement relevés ; 3 fines côtes saillantes, externe la plus forte, se continuant au delà de la callosité antéapicale, située sur le

3^e intervalle, l'intermédiaire assez peu marquée en avant, interrompue à la hauteur de la callosité, mais plus avancée que les autres vers l'extrémité et plus fortement élevée au bout; de chaque côté des carènes et tout près d'elles se trouvent de petites fovéoles, à bords un peu élevés et lisses, assez distinctes, irrégulièrement disposées; des fossettes semblables se voient aussi sur le bord latéral.

7. SILPHA RETICULATA F. Ent. Syst. i. 252. Syst. El. i. 341. 18. — Gyl. Ins. Suec. i. 263. 2. — Duft. Fn. Aust. III. 120. 12. — Er. Käf. Brand. i. 231. 11. — Sturm. Deuts. Fn. III. 110. 12. — Heer. Fn. Helv. 391. 13. — Kust. Käf. Eur. IV. 58. — Novicki. Vien. Zool. Bot. 1874. 359. — Gebl. Ledeb. Reis. 1830. 96. — 1847. Mosc. Bul. 441. (151). — *cancellata* L. Gmel. IV. i. 1622. — *undata* Mulr. Zool. Prodr. 64. — *granulata* Marsh. Brit. 119. *rugosa* Panz. Fn. Germ. v. 9. — Long. 13; larg., 7 mill. — Europe, France, Angleterre, Danemark, Suède, Allemagne, Pologne, Gallitzie, Irtysh.

Elliptique oblong, subdéprimé, noir, assez luisant. Antennes assez épaisses, peu allongées, n'atteignant pas la base du prothorax, 2^e article plus long que le 3^e, de là devenant graduellement plus larges et plus courts, les 3 derniers pubescents, 2 pénultièmes pas plus larges que le précédent, transverses et courts, dernier obconique obtus. Tête densément pointillée ruguleuse, vertex élevé en crête transverse entre les yeux, col largement déprimé; front convexe, épistome élevé en bourrelet étroit, lisse et luisant; labre profondément incisé. Prothorax (4/7 mill.) peu convexe, égal, couvert de points très serrés, petits, rugueux; bord basal droit au milieu, sinué près des angles qui sont arrondis et débordant les élytres, côtés arqués, à rebord peu élevé et peu large, rétrécis en avant, angles antérieurs non marqués, bord apical droit, à rebord étroit, à peine saillant. Ecusson large, lancéolé, densément ponctué strigieux. Elytres (8/8 mill.) déprimées sur le dos, subparallèles sur les côtés, avec les épaules largement arrondies, rebord latéral élevé, également étroit, séparé par une gouttière ponctuée granulée, épipleures canaliculées, ponctuées granulées; extrémité large et arrondie; carénules tranchantes peu élevées, externe plus droite et plus nette, se terminant après la

bossette qui est peu marquée, les 2 autres plus fines, sinueuses, surface couverte de points enfoncés, et entre les côtes de reliefs irréguliers. ♂ 1-4 articles des tarses antérieurs dilatés, garnis en dessous de brosses de poils roux ; ceux des intermédiaires un peu plus longs et moins dilatés.

Var. *verrucosa* Mén. Cat. 168. Fald. Transc. 1. 222. — Küst. Kæf. Eur. iv. 59. — Mer Caspienne, Asie-Mineure.

Un peu plus large. Elytres plus courtes et un peu plus convexes, carènes fines, les internes à peine saillantes, subinterrompues par les reliefs plus larges et plus étendus, les articles des antennes à partir du 4^e plus transverses et plus serrés.

Se trouve sur les feuilles de blé de Turquie, de seigle, d'orge et de froment.

7^a SILPHA TURKESTANICA Ball. Mosc. Bul. 1870. 329. — Solsk. Turk. Fedenk. 1874. 216. 3^a. — Long. 17 ; larg. 8 mill. — Fleuve Naryn. Gulscha, dans le Cokand (Turkestan).

Voisin de *reticulata* et *verrucosa*, mais plus grand et surtout plus allongé. Noir, un peu luisant, subconvexe, très finement, moins profondément et assez densément ponctué ruguleux en dessous, à peine pubescent. Tête et prothorax densément et profondément ponctués, comme dans *reticulata* ; celui-ci plus transverse, un peu plus fortement rétréci en avant, plus profondément impressionné et plus largement explané sur les côtés ; antennes un peu plus longues et plus grêles. Elytres oblongues, subparallèles, largement aplaties et réfléchies, plus étroites que le prothorax ♂ ; densément couvertes de granulations subponctuées ; côte externe élevée aigüe, entre elle et la suture finement, moins densément, irrégulièrement verruqueuses, les 2 côtes internes sont remplacées par 2 séries de verrues luisantes plus élevées. ♂ Tarses antérieurs médiocrement dilatés.

IV — Silpha Lin.

Ovale, glabre en dessus, labre profondément échancré, débordé par les mandibules. Antennes épaissies graduellement vers l'extrémité, 2^e article un peu plus long que le 3^e. Elytres munies de 3 carènes, sans tubercules dans

les intervalles, non tronquées. Hanches intermédiaires peu distantes; tarses antérieurs dilatés ♂.

8. SILPHA CARINATA Illig. Kæf. Prus. i. 1798. 365. 11. — Gyl. Ins. Succ. 269. 8. — Er. Kæf. Brand. i. 230. 8. — Gebl. Ledeb. Reis. 1830. 95. — Mosc. Bul. 1847. 440 (150). — Mosc. Bul. 1859. 460. — Mots. Pet. Ac. Mel. Biol. 1860. 295. — Heer Fn. Helv. 390. — Fairm. Fn. 295. — Küst. Kæf. Eur. iv. 56. — *opaca* Payk. Fn. Succ. i. 336. 12. — Herbst. Col. v. 100. 17. pl. 51. f. 6. — *marginalis* Kugl. Schnd. Mag. p. 505. 3. — *tyrolensis* Leicht. Tyr. Ins. i. ii. p. 98. 12. — *recta* Marsh. Brit. 117. 7. — *trilineata* L. Gmel. i. 4. p. 1627. 85. — *griesbachiana* Steph. Ill. nr. 26. — Long. 16-18; larg. 9-10 mill. — Europe, Suède, Grande-Bretagne, France septentrionale et orientale : Lille, Paris, Saumur. — Kolywan, Karkaraly, Tarbagataï, Issik-Kul,

Var. *armeniaca* Koln. Melet. v. 1846. 50.

Var. *italica* Küst. Kæf. Eur. xx. 15.

Ovale oblong, médiocrement convexe, noir de poix, luisant en dessous, terne en dessus. Tête densément ponctuée. Antennes ne dépassant pas la base du prothorax, menues, article 2 à peine plus long que 3, massue peu épaisse, de 4 articles, 8^e obconique plus long que 7 et 9, glabre, 9-10 courts, transverses, 11^e pyriforme. Prothorax (6/11 mill.), très densément pointillé, disque déprimé, marqué postérieurement d'une impression oblique de chaque côté; base droite subsinuée, de la largeur des élytres avec les angles arrondis, côtés atténués en courbe, à bord relevé, sommet rebordé de même, légèrement échancré en arc, avec les angles arrondis. Écusson pointillé-rugueux, ogival, relevé postérieurement. Élytres (12/9 mill.) également et très densément pointillées granuleuses, sans rangées de points plus petits le long des carènes lisses et sans fovéoles dans la gouttière latérale; 3^e carène plus forte à la base, plus courte, sans tubercule postérieur; rebord latéral très large, surtout en devant, relevé en gouttière; épipleures faiblement pointillées, légèrement sillonnées. ♂ Tarses antérieurs dilatés, garnis de brosses en-dessous.

La variété *italica* a les carènes des élytres assez fortes, le rebord plus large, en particulier par devant.

Du temps même de Fabricius, Illiger (Mag. i. 391) a discuté, d'une manière approfondie, l'identité du *Silpha*

lunata et a conclu de son examen que l'espèce de *Fabricius* devait être rayée. La description de l'*Entomologia systematica* (t. p. 251) s'applique tout autant au *Peltis grossa*, qu'au *S. carinata*, si toutefois elle s'applique à une espèce quelconque de ce groupe. Néanmoins les catalogues allemands, dans ces derniers temps, tranchent la question, comme ils ont l'habitude de le faire; celui de Munich fait timidement une variété du *carinata* Illig. et on s'aperçoit qu'il n'a pas approfondi la question, puisqu'en citant le *Systema Eleutheratorum*, il indique la page de l'*Entomologia systematica*. Le catalogue d'Europe et du Caucase adopte le nom de *Fabricius* et met celui de *carinata* Illiger en synonymie. Voilà donc un nom admis par tout le monde et sans conteste, depuis plus de cent ans, qu'il faudrait remplacer par un nom douteux!

Var. *Silpha atropurpurea* Sturm. Cat. 1843. 37. — Küst. Kaef. Eur. xxii. 14. — Long. 15; larg. 8 mill. — Russie mérid. Sarepta.

Elliptique, allongé, subdéprimé, noir brun, peu luisant en-dessous, terne en-dessus, élytres et côtés du prothorax d'un brun rougeâtre. Antennes menues, un peu épaissies à l'extrémité, dépassant la base du prothorax, 1^{er} article long, 2 et 3 d'égale longueur, les suivants obconiques diminuant de longueur, 8^e plus long et un peu plus grand, paraissant commencer la massue, mais glabre comme les précédents, les 3 derniers pubescents, 9-10 courts transverses, dernier pyriforme. Tête densément ponctuée rugueuse, avec les yeux assez saillants entiers, séparés par une crête obtuse transverse, limitée en devant par un sillon transverse et derrière par une dépression; épistome court, profondément échancré en arc. Prothorax (5/8 mill.) transverse, très densément pointillé, disque peu élevé, limité de chaque côté par une impression sinuée, base droite, angles arrondis; bord apical légèrement sinué, côtés explanés, rebordés d'un bourrelet étroit, élevé, égal, se continuant en devant, rétrécis en courbe par devant, avec les angles arrondis. Ecusson grand, lancéolé, densément ponctué-aciculé, piligère. Elytres (11/8 mill.) déprimées, marquées de 3 carènes lisses élevées, subparallèles, externe plus forte,

atteignant la base et raccourcie avant l'extrémité, 2 et 3 n'atteignant pas tout à fait la base ; surface densément ponctuée, chaque point avec un petit tubercule piligère ; côtés subparallèles, longés d'une profonde gouttière, avec le rebord large, avec l'angle huméral arrondi, un peu rétréci postérieurement ; sommet des élytres arrondi ; épipleures creusées, granuleuses. Tarses antérieurs ♂ dilatés, les intermédiaires plus longs et moins larges.

Diffère de *carinata* par son corps plus déprimé et plus parallèle, la couleur de ses élytres, le sommet de la tête élevé entre les yeux, entre un sillon transverse antérieur et une dépression postérieure ; — de *perforata*, outre sa couleur, par le pointillé des élytres beaucoup plus fin et plus serré.

9. SILPHA PERFORATA Gebl. Mosc. Mém. 1832. p. 94. — Küst. Käf. Eur. xxii. 16. — Mots. Mosc. Bul. 1859. 491. Pétersb. Schrenk. 1860. 124. — Long. 15; larg. 9 mill. — Russie méridionale; Sibérie : lac Baïcal, Nertschinsk.

Var. *mongolica* Fald. Pet. Ac. Mém. 1835. 365. (29). — Mongolie, Amur.

Ovale, élargi postérieurement, peu convexe, noir peu luisant. Antennes allongées, menues, atteignant la base du prothorax, 2^e article un peu plus long que le 3^e, les 4 derniers peu épais, 2 et 3 pénultièmes, courts, transverses, précédent non pubescent, pas plus long, dernier arrondi court. Tête densément ponctuée ruguleuse, dépression du col peu abrupte. Prothorax (5/9 mill.) peu élevé sur le disque, avec les impressions postérieures obliques, comme composées d'une double fovéole, très densément pointillé, striguleux sur les côtés, bord basal presque droit mais bisinué de chaque côté, plus large que les élytres, avec les angles arrondis ; côtés formant une courbe avec les angles antérieurs, bordés d'un bourrelet lisse, peu élevé, bord antérieur légèrement échancré, à repli un peu plus mince et plus élevé. Ecusson lanciforme, creusé, pointillé rugueux, pubescent. Elytres (10/9 mill.) obovales, côtés en gouttière à bord élevé tranchant, pointillés au fond, épipleures creusées, pointillées, angle apical séparément arrondi, 3 carènes lisses, assez larges et fortes, ainsi que la suture, surtout l'externe raccourcie postérieurement, sans tubercule, surface

à points assez densément ronds, très finement granulés pilifères, les points des lignes suivant les carènes peu ou pas plus fins que les autres. 4-4 articles des 4 tarsi antérieurs garnis en dessous de brosses de poils jaunes, les antérieurs plus larges et plus courts que les intermédiaires. www.libtool.com.cn

9°. SILPHA SCULPTIPENNIS Fald. Pet. Ac. Mém. II. 1835. 366. — Sépar. 30. 18°. — Long. 14,6; larg. 7,6 mill. — Mongolie.

Taille du *mongolica*, mais ordinairement plus étroit, diffère beaucoup par ses élytres plus étroites que le prothorax et parallèles. Noir opaque, oblong, parallèle. Tête inclinée, finement mais densément ponctuée, avec une carène transverse profonde sur le vertex; labre largement et moins profondément échancré, cilié de roux. Antennes plus courtes que le prothorax, comme dans celui-ci. Prothorax près de 2 fois plus court que large, très densément pointillé, obtusément arrondi à la base, sinuée de chaque côté avec le lobe médian tronqué, arrondi sur les côtés, rétréci en devant, réfléchi rebordé, tronqué au bord apical, qui est élevé, convexe en dessus, disque égal, faiblement déprimé transversalement près de la base, explané vers les côtés. Ecusson triangulaire, plan, inégal, densément strigieux ponctué. Elytres plus étroites que le prothorax, oblongues, parallèles, obtusément arrondies au bout, entières, médiocrement convexes en dessus, tricarénées, profondément marquées de grands points entremêlés de rides, déclives sur les côtés, fortement réfléchies, rebordées, les trois lignes élevées aiguës, 1^{re} et 2^e, à partir de la suture, atteignant presque le sommet, plus courtes que la 3^e, une rangée de petits points suit les lignes élevées de chaque côté, en outre il y a des fovéoles serrées, placées en lignes au fond des côtés près de la marge. Dessous renflé, obsolètement mais densément pointillé, assez luisant, garni d'une pubescence couchée, peu fournie, anus ferrugineux. Pattes fortes, luisantes, très obsolètement pointillées; jambes garnies de soies rousses; tarsi densément pubescents de gris.

10. SILPHA TRISTIS Illig. Käf. Prus. I. 366. — Gebl. Ledeb. Reis. 1830. 96. — Mosc. Biol. 1847. 441. (151).

Var. *dalmatina* Küst. Käf. Eur. XXII. 17. — Long. 13; larg. 7 mill. — France; Irtysh.

Elliptique, oblong, légèrement convexe, noir peu luisant. Antennes allongées, atteignant la base du prothorax, 2^e et 3^e articles d'égale longueur, les 4 derniers faiblement élargis en massue parallèle, 2 pénultièmes transverses, égaux, à peine plus longs que le précédent, dernier ovale, court. Tête pointillée, élevée sur le vertex, avec une impression transverse derrière les yeux. Prothorax ($\frac{4}{7}$ mill.) très densément pointillé, ruguleux latéralement, disque un peu convexe, déprimé obliquement par derrière de chaque côté, avec une bossette entourée par l'impression; bord basal légèrement arqué, relevé, sinué de chaque côté, près des angles, qui sont arrondis; côtés faiblement arqués, rentrés en avant, avec un étroit rebord élevé, continué au bord apical qui est droit. Ecusson lancéolé pointillé. Elytres ($\frac{9}{8}$ mill.) subparallèles sur les côtés avec le rebord étroit élevé, séparé par une gouttière, ponctuée, sans fossettes, épipleures creusées, pointillées, obtuses arrondies au bout; 3 carènes étroites lisses, élevées ainsi que la suture, chacune accostée d'une ligne de très petits points serrés; externe un peu raccourcie postérieurement, élevée au tiers postérieur par un large tubercule superficiel; intercôtes densément et finement ponctués granulés; 1-4 articles des tarses antérieurs ♂ garnis de brosses en dessous, dilatés, ainsi que les intermédiaires, mais moins fortement.

10^a. SILPHA BICARINATA Gebl. Ledeb. Reis. II. 1830. 95. 2^e. 1859. Mosc. Bul. 489. — Long. 11,6; larg. 6 mill. — Sibérie, Ajagus. mont Arka-Ul.

Noir, luisant. Tête densément pointillée, pubescente de gris, avec une ride transverse entre les yeux. Antennes presque de la longueur du prothorax, peu à peu épaissies en dehors, dernier article acuminé. Prothorax transverse, trônqué en avant, arrondi sur les côtés; plus large et trisinué par derrière, finement tomenteux en dessus, densément ponctué, disque convexe, bord et base déprimés. Ecusson triangulaire, pointillé. Elytres linéaires sur les côtés, arrondies au bout, densément ponctuées, déprimées déhiscentes aux côtés et au bout, à bord réfléchi, avec une carène élevée à la marge, aiguë, terminée par

un tubercule, et 2 lignes élevées très obsolètes sur le disque. Dessous pointillé, luisant, pubescent de gris, pattes noires ou d'un noir de poix.

Diffère de *obscura* et *tristis* par ses élytres plus déprimées, sa carène plus élevée et ses lignes obsolètes.

11. SILPHA COSTATA Mén. Cat. 1832. 167. — Fald. Trans. i. 218. — Solsky. Turk. 1874. 217. — Long. 18; larg. 10 mill. — Lenkoran.

Elliptique oblong, subdéprimé, noir mat en dessus, un peu luisant en dessous. Antennes allongées dépassant le milieu du prothorax, menues, les premiers articles obconiques, 2 et 3 subégaux, plus larges que 4, 6-7 courts, plus étroits que les derniers, qui sont transverses, apical ovoïde obtus. Tête courte, densément ponctuée, convexe, creusée derrière les yeux par une forte impression transverse; labre fortement échancré en arc. Prothorax (5/9 mill.) peu convexe sur le disque, densément pointillé, rugueux sur les côtés; bord basal droit au milieu, sinué sur les côtés avec les angles arrondis; arqué sur les côtés qui sont largement explanés, rebord sensible un peu plus fort qu'au bord apical, qui est rétréci, subtronqué avec les angles largement arrondis. Ecusson en cœur, plan, très densément aciculé ponctué. Elytres (12/10 mill.) subparallèles, avec un mince rebord égal, entre les épipleures cannelées ponctuées râpeuses et la gouttière marginale marquée au fond d'une ligne de gros points, arrondies au bout, carènes lisses atténuées et obsolètes postérieurement, externe plus élevée, partant d'un calus basal intermédiaire peu sensible, surtout en devant, internes un peu plus marquées; intercôtes peu densément marqués de points un peu carrés, ceux des côtés plus fins; tubercule postérieur représenté par une petite bosse luisante. ♂ 4 tarsi antérieurs un peu dilatés et garnis de brosses.

Plus grand et plus large que l'*obscura*, il s'en distingue par le bord apical du prothorax tronqué, les carènes des élytres plus lisses et plus élevées, surtout l'externe.

12. SILPHA ORIENTALIS Brul. Exp. Morée. 1832. III. 161. pl. 37. f. 19. 3 pl. 29. f. 1. — Kust. Käf. Eur. IV. 64. — *multipunctata* Friv. Mag. 1845. 182. pl. n. f. 1. — *turcica* Kust. Käf. Eur. 1851. XXIII. 16. — Long. 15; larg. 8 mill. — Turquie: Constantinople; Grèce, Asie-Mineure.

Elliptique, médiocrement convexe, subparallèle, noir, peu luisant. Antennes menues, à articles allongés, n'atteignant pas la base du prothorax, 2^e et 3^e articles de même longueur, massue peu épaisse, 2-3 pénultièmes courts transverses, précédent pas plus long, rétréci à la base, dernier arrondi. Tête densément ponctuée rugueuse, peu convexe, marquée derrière les yeux d'une profonde impression transverse. Prothorax (5/8 mill.) couvert d'une ponctuation très serrée, petite, rugueuse, à peine convexe sur le disque, impressions obliques postérieures à peine sensibles; base plus large que les élytres, subsinuée de chaque côté près des angles arrondis; côtés rétrécis en courbe de la base au sommet, qui est droit au milieu, rebord mince, peu élevé, égal devant et sur les côtés. Écusson lancéolé, ponctué strigieux. Elytres (11/9 mill.) assez convexes, arrondies à l'extrémité, avec l'angle sutural de chacune pointu, rebord latéral assez égal, fortement relevé, séparé au fond de la gouttière par une série de fossettes; épipleures creusées, ponctuées granuleuses en dedans; 3 côtes minces, assez droites, lisses, assez élevées ainsi que la suture, bordées de chaque côté d'une ligne régulière de très petits points serrés, pas de tubercule au tiers postérieur de la carène externe; points oblongs carrés, profonds, peu serrés, sans granules pili-fères; ceux du dehors beaucoup plus petits et plus nombreux. Tarses antérieurs ♂ à articles 1-4 dilatés, garnis en dessous de brosses jaunes, les intermédiaires moins élargis et plus longs.

12^a. SILPHA FLUCTUOSA Schauf. Numq. Otios. 1871. p. 204. — Long. 13-15; larg. 7-8 mill. — Espagne, Sainte-Ildephonse.

Noir opaque, oblong; tête densément ponctuée, impressionnée en devant, élevée transversalement au milieu; antennes grêles peu épaissies vers l'extrémité; prothorax transverse, peu atténué en avant, avec les angles arrondis, base échancrée de chaque côté, disque couvert de points serrés, plus petits de chaque côté à la partie antérieure et très opaques; écusson densément pointillé; élytres un peu plus étroites que le prothorax à la base, peu arrondies au milieu, arrondies ensemble au bout, suture élevée, munies de 3 côtes interrompues, 3^e caréniforme,

les 3 intervalles dorsaux lisses, ponctués alutacés, densément pointillés à la base et au bout, intervalle marginal subalutacé ponctué; dessous densément et très finement pointillé granulé, obscurément pubescent.

13. SILPHA PUNCTICOLLIS Luc. Expl. Alg. n. 1847. 213. pl. 21. f. 1.
— *hispanica* Küst. Käf. Eur. 1849. xvii. 26. — Long. 17; larg. 9 mill. — France mérid. : Espagne mérid. : Cordoue; Algérie.

Oblong, subelliptique, parallèle au milieu, à peine convexe, noir, peu luisant. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax, élargies peu à peu vers l'extrémité, 2^e et 3^e articles de même largeur, les 3 pénultièmes articles subégaux, transverses, dernier ovale. Tête densément ponctuée, légèrement convexe, renflée sur vertex, limité par une forte dépression transverse; labre profondément échancré en arc. Prothorax (5/9 mill.) très densément ponctué rugueux latéralement, dépressions obliques postérieures peu marquées; bord basal arqué, trisinué avec les angles arrondis, côtés arqués, rétrécis en avant, bord antérieur droit, angles ronds et peu marqués; rebord élevé assez fort, égal en avant et sur les côtés. Ecusson grand, lancolé, très densément et finement strigieux. Elytres (11/9 mill.) à peine de la largeur du prothorax, subdéprimées, arrondies au bout, entourées d'un rebord élevé, non élargi à la base, séparé au fond de la gouttière par une série de grosses fovéoles; épipleures convexes, ponctuées granulées; carènes minces, subparallèles, complètes, intermédiaire plus faible à la base, accostées chacune d'une rangée de très petits points fort serrés; externe présentant aux 2/3 un tubercule; intervalles avec des points profonds, assez rapprochés, munis d'un petit granule sétigère luisant, points des bords latéraux plus petits et plus nombreux, présentant l'apparence de petits granules. Les 4 tarsi antérieurs ♂ élargis et garnis de brosses en dessous, les antérieurs plus courts et plus larges que les intermédiaires.

14. SILPHA GRANULATA Ol. Ent. II. 11. p. 13. pl. II f. 10. — Küst. Käf. Eur. iv. 60. — Fairm. Fn. Fr. 296. 13. — *variolosa* Herbst. Käf. VIII. p. 194. pl. 129. f. 1. — Long. 15-18; larg. 9-12 mill. — France méridionale : Nice, Montpellier, Amélie-les-Bains; Sardaigne, Espagne; Algérie : Biskra, Alger, Oran.

Elipitique oblong, peu convexe, noir, un peu luisant ou mat. Antennes n'atteignant pas les élytres, menues, articles allongés, 2^e aussi long que 3^e, les 4 derniers un peu plus épais, en massue parallèle, pénultième court transverse, les deux précédents à peu près égaux, mais rétrécis à la base, dernier obovale obtus. Tête densément pointillée, peu convexe, faiblement trifovéolée entre les yeux, col brusquement enfoncé par une impression transverse. Prothorax (5/9 mill.) à dos un peu élevé, limité par une dépression sinuée latéralement; ponctuation serrée, fine sur le milieu, plus forte sur les côtés, parsemée de points rares un peu plus forts; base un peu redressée et arquée au milieu, sinuée près des angles, qui sont arrondis, plus large que les élytres; côtés rentrés, en courbe, avec les angles antérieurs, sommet presque droit; repli latéral plus fort que l'antérieur. Écusson densément et finement pointillé, grand, lancéolé. Elytres (12/9 mill.) à côtés subparallèles, bord réfléchi très élevé, élargi vers la base, séparé par une gouttière, à fovéoles sériees, épipleures creusées, pointillées, granulées; extrémité arrondie ensemble; 3 carènes dorsales fines lisses, peu élevées, surtout les 2 internes, flanquées d'une fine série de petits points obsolètes et de gros points écartés, externe partant d'une élévation basale, et soulevée au tiers postérieur par une bossette peu saillante, surface finement pointillée granulée. Tarses antérieurs et intermédiaires ♂ élargis et garnis de brosses de poils; les premiers plus courts et plus larges.

15. *SILPHA NIGRITA* Creutz. Ent. Vers. 1799. p. 116. 8. pl. 2. f. 20.

— Heer Fn. Helv. 391. — Küst. Käf. Eur. xxii. 20. — Long. 12-16; larg. 7-8 mill. — Styrie, Autriche.

Var. *alpina* Germ. Spec. nov. 82. 141. — 3 Heer Obs. Ent. 1836. p. 24. pl. 4. — Küst. Käf. Eur. xxii. 21. — Italie, Espagne.

? *tyrolensis* Laich. Tyr. Ins. 1781. p. 98. 10.

Var. *ambigua* Graël. Mém. Map. Zool. 1858. p. 57. pl. 2. f. 11.

Elliptique allongé, assez étroit, peu convexe, assez luisant, assez souvent les élytres sont rougeâtres, tirant un peu sur le brun. Antennes n'atteignant pas la base des élytres, articles peu allongés, peu serrés, 3^e un peu moins

long que le 2^e, plus larges que longs à partir du 7^e, les 4 derniers formant une massue un peu plus épaisse que dans les espèces de ce groupe, les 3 pénultièmes transverses, dernier obovale court. Tête densément pointillée, convexe, avec une légère fovéole de chaque côté en dedans des yeux; vertex élevé, mais non rendu très abrupte par l'impression transverse du col. Prothorax (4/7 mill.) légèrement convexe sur le disque, avec une impression oblique postérieure de chaque côté, on remarque aussi quelquefois une ligne très légère au milieu et une série de fovéoles très superficielles le long du bord postérieur qui est redressé; pointillé très serré, très fin au milieu, rugueux latéralement; bord basal presque droit, à peine sinué près des angles postérieurs qui sont arrondis, un peu plus large que les élytres; côtés arqués, légèrement rentrés en avant, avec le rebord bien marqué et beaucoup plus fort que l'antérieur; sommet droit. Ecusson lancéolé, très densément pointillé. Elytres (10/8 mill.) à côtés sub-parallèles, rebord élevé mince, guère plus large en avant, séparé par une série de fovéoles, épipleures creusées en gouttière, ponctuées granulées; extrémité arrondie ensemble; carènes dorsales luisantes, à peine élevées, l'externe assez marquée partant d'une éminence basale, les deux internes parfois tout-à-fait obsolètes; elles sont limitées de chaque côté par une ligne de points, pas plus petits que ceux des intervalles, qui sont carrés sur le dos, mais sériés-rugueux dans le pourtour; on remarque en outre quelques points plus gros, très espacés, leur formant une bordure, dans le genre de ceux du *granulata*. 1-4 articles des 4 tarses antérieurs ♂ dilatés, garnis en dessous des brosses de poils.

La variété *alpina* a toujours les élytres d'un roux tirant sur le brun, les carènes dorsales sont mieux marquées, la ponctuation est plus nette. On la trouve dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées.

L'ambigua plus grand, plus élargi, présente les carènes dorsales des élytres plus élevées et tranchantes, les points beaucoup plus forts, mais disposés du reste comme dans le type; la bossette de la carène est bien visible; on la rencontre en Espagne: la Granja, l'Estramadure, etc.

16. SILPHA OBSCURA Lin. Fn. Suec. n° 457. — Syst. Nat. i. ii. 572. 18. — F. Ent. Syst. i. 252. 15. — Syst. El. i. 340. 17. — Payk. Fn. Suec. i. 328. 3. — Gyl. Ins. Suec. i. 264. 3. — Schmidt Dissert. 1841. 29. — Fairm. Fn. 296. 10. — Schiøedt. Nat. Tidschrif. 1863. p. 227. pl. ix. f. 15-19. — Bliss. Fr. Soc. ent. 1846. p. 69. — Gebl. Ledeb. Reise. 1830. 95. — Mosc. Bul. 1847. 441 (151). 1859. 460. — Mén. Lehm. 1848. 36. — Mots. Mosc. Bul. 1859. 491. — Schrenck 1860. 124. 295; Péterb. Mém. Biol. 304. — Solsky Turk. 1874. 218. — Bal. Bul. Mosc. 1878. 277. — *atrata* Herbst. Kæf. v. p. 183. pl. 51. f. 1. — *littoralis* Bergst. Nomencl. i. 24. p. 3. f. 6. — Long. 14; larg. 8 mill. — Europe, Suède, France; Kirghises, Karkaraly, Kolywan, Tarbagataï, Issik-Kul, Wjernoje, Kuldsha, Samarkand, Taschkent, Sarafschan-Thal, Amur.

Elliptique oblong, peu convexe, noir, mat en dessus. Antennes allongées, n'atteignant pas les élytres, menues, 3^e article aussi long que le 2^e, les 4 derniers élargis en massue égale, 2 pénultièmes en tranches transverses égales, précédent pas plus long, dernier obovale court. Tête convexe, densément et rugueusement ponctuée, vertex saillant, impression du col derrière les yeux peu abrupte. Prothorax (5/8 mill.) couvert d'une très fine et très dense ponctuation, égale, rugueuse latéralement, disque peu convexe, impressions latérales très faibles; bord basal un peu relevé, presque droit, à peine sinué, angles postérieurs arrondis, débordant fortement les élytres; côtés arqués, avec le rebord élevé, plus fort que celui du sommet, qui est droit et assez rétréci. Ecusson lancéolé, densément ponctué aciculé. Elytres (10/8 mill.) subparallèles sur les côtés, avec le rebord tranchant, également étroit, élevé, séparé par une étroite gouttière, au fond de laquelle se trouve une série de petites fovéoles; épipleures creusées, luisantes, ponctuées, granuleuses; extrémité obtuse arrondie; carènes très fines, les deux internes marquées seulement par les deux lignes de petits points serrés qui les accompagnent, externe un peu plus marquée, bosse basale faible, postérieure nulle; points fonciers oblongs, uniformes, plus fins et plus serrés en dehors. 1-4 articles des tarses antérieurs ♂ assez fortement dilatés, garnis en dessous de brosses de poils; intermédiaires un peu moins larges et plus allongés.

17. SILPHA STRIOLA Mén. Cat. 1832. 168. — Fald. Transc. 1. 219.
— Long. 15; larg. 8 mill. — Caucase.

Elliptique allongé, subparallèle, déprimé, noir, très mat en dessus, un peu luisant en dessous. Antennes dépassant le milieu du prothorax, à articles serrés, oblongs jusqu'au 6^e, 2 et 3 de même longueur, pas plus longs ensemble que le 1^{er}, 7^e court, un peu plus étroit que le 8^e, qui est transverse et égal à 9 et 10, dernier arrondi. Tête densément et rugueusement ponctuée, déprimée en col derrière les yeux; labre profondément échancré en arc. Prothorax (5/8 mill.) légèrement convexe sur le disque, très densément ponctué ruguleux; base presque droite, plus large que les élytres, faiblement trisinuée, avec les angles arrondis, côtés largement explanés, arqués et nettement rebordés ainsi que le devant, sommet rétréci, sinué au milieu, avec les angles fort arrondis. Ecusson en cœur, ponctué. Elytres (10/8 mill.) marquées de points quadrangulaires, plus fins et plus serrés latéralement; côtés à rebord tranchant, élargi en avant, entre les épipleures cannelées, ponctuées râpeuses, et la gouttière présentant au fond une ligne irrégulière de points plus forts, extrémité arrondie; carènes à peine sensibles, seulement l'externe est un tant soit peu marquée et courte.

Distinct de l'*obscura* par sa forme plus allongée et plus étroite, le prothorax distinctement sinué au bord apical, les points de la gouttière moins forts, et les carènes moins visibles.

V — Thanatophilus (θάνατος, *mort*; φίλος, *ami*)

Leach. Zool. Misc. III. 1817. p. 75.

Corps ovale, subdéprimé; labre étroit, largement échancré, à peine dépassé par les mandibules. Antennes courtes, article 2 un peu plus court que 3, 4-7 égaux, les 4 derniers en massue abrupte et forte. Prothorax échancré en devant, pubescent, sinué de chaque côté à la base; élytres munies de 3 carènes élevées, prolongées en queue à l'angle sutural ♀. Hanches intermédiaires écartées; 1-4 articles des tarsi antérieurs ♂ dilatés légèrement, garnis de brosses en dessous.

18. SILPHA THORACICA L. Syst. Nat. n. 571. F. Ent. Syst. i. 250. 7. Syst. Èl. i. 337. 7. — Payk. Fn. Suec. i. 334. 10. — Gyl. Fn. Suec. i. 270. 9. — Fourc. Par. 31. 6. — Gebl. Ledeb. Reis. 1830. 96. — Mosc. Bul. 1847. 441 (151). — Fald. Pet. Ac. 1835. 340 (4). — Mén. Pet. Middend. 1851. 53. — Westw. Intr. 1839. i. p. 139. pl. 10. f. 10. 14. — Fairm. Fn. 292. 1. — *Golovatschovi* Lind. Mosc. Bul. 1865. 148. pl. 4. f. 1-2. — Long. 15; larg. 9 mill. — France, Vosges, Pyrénées; Piémont; Allemagne; Sibérie, Altaï, Udsky-Ostrog.

Var. *collaris* Mots. Mosc. Bul. 1859. 491 et Pet. Ac. Mèl. biol. 231. — Pet. Schrk. 1860. 124. — Kamtschatka, Nikolajevsk, Jakutsk, Amur.

Elliptique oblong, aplati, noir, velouté sur les élytres, prothorax rouge, vêtu d'une courte pubescence jaunedoré, émaillée, versicolore. Antennes courtes, n'atteignant pas le bord postérieur du prothorax, 1^{er} article courbé, peu allongé, 2 et 3 obconiques, l'un à peine plus court que l'autre, 4-7 moniliformes petits, 8 court mais brusquement élargi et formant avec les 3 derniers une assez forte massue, serrée, dernier pyriforme. Tête légèrement ponctuée, élevée sur le vertex et séparée des yeux saillants par un enfoncement, déprimée en col sur la nuque, garnie sur toute la partie postérieure d'une pubescence rouge; épistome profondément échancré en arc. Prothorax (8/5 mill.) déprimé, inégal sur le disque, séparé par une profonde rigole sinueuse des côtés qui sont largement explanés; côtés faiblement rebordés, en arc rentrant par devant, avec les angles arrondis quoique saillants, milieu du bord antérieur élevé, séparé de chaque côté par une échancrure angulaire; bord basal avancé et presque droit au milieu, avec une large sinuosité de chaque côté, angles obtus. Ecusson lancéolé, concave. Elytres (11/9 mill.) un peu plus larges que le prothorax, entourées d'un mince rebord, séparé par une large gouttière, plissée, angle huméral denté, tronquées arrondies au bout ♂, allongées en queue ♀, disque imperceptiblement ponctué, varié de plaques noires moirées; carène externe tranchante, s'étendant droite du tubercule basal au tubercule postérieur qui est très élevé, carènes internes très faibles jusqu'à ce point, puis saillantes et atteignant le bord apical, celle du milieu est contournée en S; épipleures creusées, mais peu profondes, ruguleuses. Tarses antérieurs ♂ à peine plus larges que ♀.

19. SILPHA RUGOSA L. Fn. Suec. 455. Syst. Nat. n. 571. 16. — F. Ent. Ssyt. 1. 251. 10. Syst. El. 1. 338. 10. — Payk. Fn. Suec. 1. 333. 9. — Gyl. Ins. Suec. 1. 272. 11. — Schied. Nat. Tidschr. 1863. 227. pl. 9. f. 1-14. — Gebl. Mosc. Bul. 1859. 460. — Mots. Mosc. Bul. 1859. 491; — Schrenck 1860. 124. — Fairm. Fn. Fr. 294. 2. — Küst. Käf. Eur. 1. *intricata* Mén. Cat. Rais. 169. 692. — Fald. Transc. 1. 223. 206. — *complicata* Fourc. Ent. Par. 1. p. 30. — *scabra* Scop. Ent. Carn. 1763. 21. 59. — *paramaribo* Herbst. Nat. Käf. v. 1793. 205. 29. pl. 52. f. 2. — Long. 10; larg. 6 mill. — Europe, France, Allemagne, Sardaigne, Andalousie, Autriche, Algérie; Sibérie; Ajagus.
- Var. *vestita* Küt. Käf. Eur. 1851. xxii. 12. — Sardaigne.
- Var. *ruficornis* Küt. Käf. Eur. 1851. xxii. 11. — *tuberculata* Luc. Expl. Alg. 214. pl. 21. f. 2. — Algérie, Espagne, Sardaigne.

Elliptique oblong, déprimé, noir, luisant en dessous, terne en dessus. Antennes courtes, n'atteignant pas la base du prothorax, 1^{er} article assez épais, de la longueur de 2-3 ensemble, 3^e plus long que le 2^e, 4-7 petits, courts, 8^e étroit, bien plus large, mais sans l'être autant que les 3 autres qui sont pubescents et forment une grosse massue; le dernier arrondi. Tête courte, assez large, pointillée rugueuse, garnie d'une longue pubescence dressée, épaisse, limitée par une dépression transverse, derrière les yeux, qui sont ronds et assez gros; labre largement échancré. Prothorax (3/5 mill.), peu convexe, densément pointillé chagriné, rendu inégal par des élévations formant des séries transverses, dénudées, glabres au milieu de la surface, vêtue d'une courte pubescence grise, soyeuse; bord basal large, trisinué, angles arrondis; côtés étroitement rebordés, arqués et rétrécis en avant; bord apical largement échancré, avec les angles obtus. Ecusson lancéolé, creusé et aciculé strigieux entre deux taches pubescentes de noir un peu élevées. Elytres (6,5/6 mill.) subparallèles, un peu élargies postérieurement, tronquées au bout ♂, prolongées sinueusement en queue arrondie ♀; rebord externe mince, peu large et peu élevé et gouttière régulière peu profonde; surface marquée de très petits points, à peine visibles; suture élevée, ainsi que 3 carènes, à peine raccourcies vers l'extrémité, l'externe bien arrêtée, cependant décomposée après le tubercule postérieur, les 2 internes très

faibles et sinueuses ; ces carènes sont flanquées de tubercules alignés, lisses, luisants, irréguliers. Tarses antérieurs ♂ à peine dilatés.

Le *ruficornis* Küst., (*tuberculatus* Luc.), est une variété un peu plus grande, remarquable par les antennes ferrugineuses avec la massue noire. Le *vestita* de Küster présenterait sur les élytres une rare et fine pubescence grise.

20. SILPHA LAPPONICA Herbst. Kæf. v. 209. pl. 52. f. 4. — Gyl. Ins. Suec. I. 273. 12. — Kirby Fn. bor. Am. p. 100. — Le C. Synon. 278. — Gebl. Mosc. Bul. 1847. 441 (151). — Mén. Pet. Middend. 1851. 53. — Mots. Pet. Ac. Mel. biol. 1859. 231. — ♀ *caudata* Say Phil. Ac. Journ. in. 192. — Leq. 155. — *granigera* Chev. Col. Mex. 1834. I. 1. — *tuberculata* Germ. Spec. 1824. p. 81. 140. — *californica* Manh. Mosc. Bul. 1843. 253. — Long. 11 ; larg. 6 mill. — Europe, boréale, Suède ; Sibérie, Sibérie septentrionale, Ochotsk, Amur, Jakutsk, fleuve Kan, Turuchansk ; Canada, Etats-Unis, Californie, Mexique.

Elliptique oblong, déprimé, noir luisant en dessous, opaque en dessus. Antennes courtes, dépassant peu le milieu du prothorax, garnies de fins poils gris, 1^{er} article à peine plus long que le 3^e, 2^e plus court, 4-7 petits, moniliformes, 8^e brusquement plus large, mince, formant avec les trois derniers une massue large et tranchée, 9-10 transverses, 11 arrondi. Tête large et courte, densément ponctuée rugueuse, garnie de longs poils gris serrés, redressés ; labre échancré en arc ; yeux grands. Prothorax (4/6 mill.) garni de très longs poils gris serrés couchés, sous lesquels on aperçoit un fond ponctué rugueux, et de légères élévations ; bord basal large et fortement trisinué ; côtés explanés, à rebord fin peu élevé, en arc, rétréci en devant, avec les 4 angles arrondis ; bord apical largement et peu fortement échancré. Ecusson hastiforme, creusé, densément ponctué aciculé. Elytres (7/6 mill.) subparallèles, bordées sur les côtés d'une mince carène et d'une gouttière profonde, tronquées à l'extrémité ♂, prolongées sinuusement ♀ ; suture élevée, ainsi que 3 minces carènes ; externe forte, droite, commençant à un tubercule basal et se terminant au tubercule postérieur, les deux internes à peine élevées, surtout l'intermédiaire, bordées

d'une ligne de très petits points serrés, l'intermédiaire raccourcie peu après le tubercule, l'interne entière ; intervalles avec de très petits points à peine visibles et des poils gris écartés ; 4 séries assez régulières de tubercules ronds, placés dans les 4 intervalles. Jambes intermédiaires sinuées à la base.

On le distingue du *rugosa* par la vestiture longue et serrée de la tête et du prothorax, les lignes de tubercules ronds et réguliers, et la légère pubescence des élytres.

21. SILPHA TERMINATA Hum. Ess. iv. 1825. 59. — *sibirica* Gebl. Ledeb. Reise 1830. 96. 11. — Mosc. Bul. 1847. 441. — Küst. Kæf. Eur. xxii. 10. — *Levaillantii* Muls. God. Lyon Soc. Lin. 1855. p. 270; Op. vi. 170. — Long. 9-13; larg. 6-8 mill. — Russie méridionale : Crimée, Sarepta ; Sibérie, Loktewsk, Irtysh, Altaï.

Ovale-oblong, subparallèle, un peu rétréci postérieurement, déprimé, noir luisant en dessous, mat en dessus, avec les côtés du prothorax, l'extrémité des élytres et de l'abdomen brun-roux. Antennes n'atteignant pas le milieu du prothorax, 1^{er} article allongé, légèrement obconique, aussi ou plus long que 2 et 3 ensemble, l'un subarrondi un peu plus gros et plus court que l'autre, 4-8 transverses, devenant de plus en plus minces et larges, le 8^e presque de la largeur de la massue, qui est forte pubescente, dernier article arrondi. Tête large et courte, avec les yeux grands, convexes, surface entièrement garnie d'une pubescence épaisse, gris soyeux, longue, formant postérieurement une crête ; épistome finement et densément ponctué ; labre échancré en arc. Prothorax ($\frac{4}{6}$ mill.) peu convexe, couvert d'un pointillé fin serré et d'une pubescence couchée fine, gris soyeux, disque inégal, paraissant marqueté de taches noires ; base largement trisinuée ; côtés faiblement rebordés, arqués et rétrécis en avant, angles antérieurs arrondis, comme les postérieurs, peu avancés ; bord apical droit, sinué près des angles. Ecusson lancéolé, finement chagriné, concave. Elytres ($\frac{8}{7}$ mill.) à rebord mince, égal, élevé, séparé par une gouttière, pointillée très fin, comme le reste de la surface, épipleures légèrement creusées, finement granulées, bord apical tronqué droit ♂, sinué et prolongé en queue ♀, suture élevée ; carènes fines, externe partant d'une bosse basale et se terminant au tu-

bercule postérieur, lequel est croisé par l'intermédiaire qui ainsi que l'interne, est moins élevée, mais atteint presque l'extrémité. Cuisses garnies au bout d'une couronne de cils jaunes, jambes intermédiaires contournées à la base. Tarses antérieurs à peine élargis ♂.

22. SILPHA LATERICARINATA Mots. Schrenk. 1860. 121. 210. pl. 8. f. 21. Ab. 16. 88. 165. — Long. 9,3; larg. 6 mill. — Sibérie : Jakutsk, Amur.

Ovale-oblong, déprimé, noir luisant en dessous, terne en dessus, prothorax bordé de rouge ferrugineux, largement sur les côtés et à la base; antennes courtes, allant jusqu'au milieu du prothorax, 1^{er} article de la longueur des 2-3 ensemble, celui-ci le plus long des deux, 4-7 petits, serrés, arrondis, 8 plus large que le précédent très mince, les trois autres formant une assez forte massue, 9-10 transverses, dernier arrondi. Tête courte, en triangle, peu convexe, densément pointillée chagrinée, rétrécie en col derrière les yeux, qui sont assez saillants; labre étroit, largement échancré. Prothorax (3/4,5 mill.) peu convexe, finement pointillé chagriné, disque peu inégal, séparé par une impression en S des côtés, qui sont légèrement explanés, mais finement rebordés; vêtu d'une fine et courte pubescence couchée, d'un gris soyeux, visible surtout dans les enfoncements; bord basal avancé au milieu, largement trisinué, angles arrondis; côtés en arc, rentrant en devant, avec les angles arrondis obtus; bord apical légèrement échancré en arc. Ecusson cordiforme, large, pointillé chagriné. Elytres (6/5,5 mill.) marquées de points fins, émettant un poil noir comme collé à la surface; repli latéral mince, un peu élargi au milieu, entre une large gouttière et une épipleure cannelée, suture peu élevée; carènes bien marquées, atteignant presque l'extrémité, externe plus tranchante, légèrement coudée au niveau du tubercule postérieur, qui est arrondi et traversé par la carène intermédiaire seule; l'élévation humérale est accompagnée d'une petite bossette placée entre les deux carènes externes; bord apical tronqué obliquement ♂, sinueusement prolongé à la suture ♀. Tarses antérieurs dilatés ♂.

Ressemble bien au *terminata*, mais il est beaucoup

plus petit, moins large, son écusson n'est pas lancéolé en pointe aiguë, les carènes sont beaucoup plus saillantes, l'externe entière, et l'extrémité des élytres est concolore.

- 22^a. SILPHA FERRUGATA Solsky Turkest. Fedtensk. 1874. 215^a. 2. — Long. 11; larg. 5 mill. — Samarkand (Turkestan).

Semblable au *terminata*, mais plus petit, un peu plus oblong, distinct par sa couleur beaucoup plus claire et son prothorax sans tache; en carré oblong, déprimé, noir de poix, luisant en dessous, opaque en dessus, densément, finement ponctué-ruguleux, vêtu d'une fine pubescence cendrée, peu fournie; funicule des antennes presque tout entier, limbe latéral large et bord postérieur du prothorax, épaules et extrémité large des élytres, ainsi que les deux derniers segments de l'abdomen, d'un ferrugineux de poix. Parties du corps comme dans *terminata*, seulement les articles 6 et 7 des antennes moins transverses, le prothorax un peu plus long et plus distinctement sinué au milieu de la base, moins densément pubescent de cendré, sans taches noires distinctes. ♀ Elytres à angle apical moins prolongé que dans *terminata*, propygidium légèrement sinué au bout, ainsi que les jambes intermédiaires près de la base.

- 22^b. SILPHA SIBIRICA (Esch.) Gebl. Ledeb. Reise II. 1830. 96. 11^a. — Long. 14; larg. 7 mill. — Sibérie : Loktewsk, Irtysh.

Large, déprimé, noir, opaque, pubescent en devant, prothorax un peu échancré, fovéolé; élytres à 3 lignes raccourcies, extrémité, angles postérieurs du prothorax et anus un peu ferrugineux. Elytres subtronquées au bout ♂, subsinuées ♀. — Antennes en massue abrupte, dernier article obtus. Voisin des *sinuata* et *dispar*, il diffère par sa couleur, sa stature plus large, les lignes des élytres raccourcies.

23. SILPHA SINUATA F. Syst. ent. 75; Ent. Syst. I. 252. 18; Syst. El. I. 341. 20. — Ol. Ins. 2. II. 18. 17. pl. 2. f. 12. — Herbst. Käf. v. 191. 18. pl. 51. f. 7. — Marsh. Ent. Brit. 120. 14. — Gyl. Ins. Suec. I. 274. 13. — Fairm. Fn. 294. 3. — Gebl. Mosc. Bul. 1859. 460. — Mén. Pet. Lehm. 1848. 36. — Mots. Schrenck. 1860. 124. — Solsky Turk. 1874. 214. — Ball. Mosc. Bul. 1878. 276. — *opaca* Schrank Enum. Ins. 44. — *appendiculata* Fuessl. Verz. 6.

89. — *scabra* Fourc. Ent. i. 30. — Long. 9-12 ; larg. 5-6 mill. — Commun dans toute l'Europe, Suède, Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Kirghises, Karkaraly, Ajagus, Kolywan, Daurie, fleuve Saisan (Turkestan), Taschkent.

Var. *unicostata* Cast. Fr. Soc. ent. 1832. 400. — Très rare variété dans laquelle les deux carènes internes ont disparu.

Oblong, subparallèle, déprimé, mais parfois brun, luisant en dessous, terne en dessus. Antennes n'atteignant pas le milieu du prothorax, 1^{er} article pas tout à fait aussi long que les deux suivants ensemble, 2^e plus court que 3^e, 4-6 moniliforme, 7 transverse, 8^e plus large et plus mince, les 3 derniers pubescents en massue assez forte, dernier arrondi. Tête large et courte avec les yeux convexes saillants, garnie d'une épaisse et longue pubescence gris-soyeux, remontant en crête au sommet ; labre échancré en arc. Prothorax (3/5 mill.) peu convexe, inégal, finement strié, densément chagriné, vêtu d'une courte pubescence couchée d'un gris soyeux, laissant paraître 4 séries transverses de taches noires dénudées ; base largement trisinuée ; faiblement rebordée comme les côtés, angles arrondis ; côtés formant une courbe, rétrécis en avant, bord apical faiblement échancré en arc, angles obtus peu saillants. Ecusson lancéolé, finement chagriné, garni de poils roux sur les côtés. Elytres (6/6 mill) avec le rebord latéral mince, réfléchi, séparé par une gouttière égale et comprimée par les épipleures cannelées, pointillées, extrémité tronquée ♂, prolongée en appendice arrondi, échancré par un sinus rond sur ses côtés ♀, surface avec de petits points faibles et écartés, suture élevée ; carènes minces, presque entières, bien marquées surtout l'externe qui, au niveau du tubercule postérieur, se coude en S, ainsi que l'intermédiaire ; jambes intermédiaires contournées à la base ; tarses antérieurs légèrement dilatés ♂.

24. SILPHA DISPAR Herbst Kæf. v. 1793. p. 204. pl. 52. f. 1. — Gyl. Ins. Suec. i. 264. 14. — Er. Kæf. Brand. i. 229. — Fairm. Fn. Fr. 294. 4. — *abscissa* Laicht. Tyr. Ins. 1781. 91. 3. — Long. 10 ; larg. 5 mill. — France septentrionale, rare : dunes de St-Quentin, embouchure de la Somme ; Suède, Allemagne, Autriche, Tyrol.

Allongé, subparallèle, peu convexe, noir luisant en-

dessous, mat en dessus, garni d'une pubescence jaunâtre soyeuse, épaisse et longue sur la tête, courte et couchée sur le pronotum, avec le milieu et quelques taches latérales dénudés, noirs comme le fond, peu garni sur la base des élytres et éparse sur le reste de leur surface. Antennes assez longues, n'atteignant pas le bord postérieur du prothorax, articles lâches, 1^{er} pas aussi long que les 2-3 ensemble, celui-ci plus long que 3^e et 5^e, obconiques, 6-7 arrondis, 8^e transverse un peu plus large, les 3 derniers pubescents, en massue, peu serrés et médiocres, dernier arrondi. Tête courte et large, rétrécie derrière les yeux, qui sont médiocrement saillants; labre peu échancré en arc. Prothorax (3/4 mill.) peu convexe, inégal sur le disque, densément pointillé chagriné, trisinué à la base avec les angles arrondis; côtés arqués, faiblement rebordés, rétrécis en avant, bord apical largement échancré en arc, avec les angles obtus, peu avancés. Ecusson lancéolé, creusé, chagriné. Elytres (6/5 mill.) marquées de points très faibles, peu serrés, rebord latéral mince, peu élevé, entre la gouttière peu profonde et l'épipleure cannelée, pointillée; extrémité tronquée subarrondie ♂, appendice sutural peu saillant ♀; suture élevée, carènes fortes, élevées, à peine raccourcies au bout; bosse basale faible entre les deux carènes externes, tubercule postérieur soulevant fortement la carène intermédiaire. Jambes intermédiaires légèrement sinuées à la base; tarses antérieurs ♂ un peu dilatés.

Ressemble beaucoup à *sinuata*, mais il en diffère surtout par la pubescence du pronotum obsolète au milieu et par celle des élytres assez dense sur la base et éparse sur le reste, et par ses carènes plus droites postérieurement. Sa pubescence lui donne aussi l'aspect de l'*opaca*, mais l'élévation transverse du front, la ponctuation faible et espacée des élytres, sa carène externe continuée au-delà du tubercule postérieur, et l'intermédiaire plus saillante à la base le distinguent aisément.

25. SILPHA BAICALICA Mots. Schrenk. 1860. 125. 211. pl. 8. f. 22.
 . Ab. 16. 88. 115. — Long. 7-8; larg. 3,4 mill. — Lac Baïcal, Sibérie, Amur.

Allongé, subparallèle, déprimé, noir luisant en des-

sous, avec l'anus roux, terne en dessus, vêtu d'une courte pubescence couchée, jaune-roux, plus épaisse et plus longue sur la tête, chatoyante et mêlée de taches noires foncières, rare sur les élytres. Antennes atteignant presque la base du prothorax, 1^{er} article à peine plus grand que le 2^e, 3^e presque aussi long, 4^e 2 fois plus petit, 5-7 petits serrés, 8^e brusquement plus large et formant une massue assez forte, dernier ovale. Tête large et courte, ponctuée-rugueuse, rétrécie en col derrière les yeux ; labre largement échancré. Prothorax (2,5/4 mill.) densément ponctué-rugueux, disque légèrement inégal ; bord basal avancé au milieu, largement trisinué, avec les angles obtus ; côtés largement explanés, faiblement rebordés, arqués et rentrant en avant ; bord apical élevé au milieu, séparé par une petite échancrure des angles qui sont arrondis, peu avancés. Ecusson large, rugueux ponctué, en cœur. Elytres (6/4,5 mill.) marquées de points assez forts, repli marginal tranchant, égal, entre la gouttière sans gros points au fond et l'épipleuré cannelée ponctuée ; extrémité tronquée obliquement ♂, prolongée en queue à la suture ♀ ; suture élevée, ainsi que la carène externe qui commence à l'élévation humérale et et se termine brusquement au tubercule postérieur, qui soulève la carène intermédiaire, laquelle, d'abord à peine sensible, devient saillante en formant un crochet qui n'atteint pas l'extrémité, l'interne fort basse est obsolète à partir du milieu. Tarses antérieurs un peu élargis ♂, jambes intermédiaires contournées à la base.

Se distingue du *dispar* par sa taille bien plus petite, ses antennes très serrées, les points bien marqués des élytres, les carènes internes moins marquées et l'externe raccourcie au tubercule postérieur.

VI — *Heterotemna* (ἕτερος, autre ; τέμνω, couper)

Woll. Cat. Can. 1864. 96.

Corps très allongé, ainsi que les pattes et les antennes, celles-ci grêles à peine élargies vers l'extrémité, 8^e article très long, en tranche conique ; tête courte, limitée en arrière par une impression transverse ; labre profondément échancré, à peine dépassé par les mandibules. Pro-

thorax large échancré en devant, arrondi et explané sur les côtés, inégal sur le disque. Elytres largement rebordées, sans ailes. Hanches intermédiaires peu distantes.

26. SILPHA SIMPLICICORNIS Brull. Can. 1838. 59. — Wol. Cat. Can. 1860. 97. (*Heterotemna*.) — *tenuicornis* Brull. Can. 1838. 59. pl. 2. f. 10. — Long. 16-20; larg. 8-10 mill. — Ténériffe, bois de lauriers, au-dessus de Taganana, Las Mercedes, Agua Garcia.

Ovale-allongé, convexe sur le dos, noir brunâtre, luisant, glabre en dessus, garni de poils jaunâtres, abdomen roussâtre en partie. Antennes menues, très longues, dépassant le prothorax, articles grêles, longs, 1^{er} presque aussi long que les 2 suivants ensemble, 2-6 à peine décroissant, 7^e plus court, 8^e obconique 2 fois plus long que le 7^e, massue peu épaisse, composée de 2 courts articles subégaux et du dernier qui est ovale. Tête un peu convexe, élevée sur le vertex qui est trifovéolé, déprimée en col transversalement derrière les yeux, qui sont oblongs, assez saillants, points fins et épars; labre profondément échancré en arc. Prothorax (9/6 mill.) élargi et coupé droit à la base, avec les angles arrondis; côtés à rebord mince peu élevé, continué le long du bord apical, arqué, rentré en devant; bord apical largement échancré, avec les angles obtus, avancés; disque peu élevé, à points peu visibles épars, longé postérieurement par 4 faibles côtes lisses; séparé des bords latéraux par un profond sillon oblique présentant une boursofflure. Ecusson lancéolé peu ponctué. Elytres (12/9 mill.) finement aciculées ponctuées, entourées d'un mince repli peu élevé, présentant à l'angle huméral une petite dent, séparé par une gouttière qui va en s'élargissant par derrière, ponctuée au fond; épipleures presque lisses, larges, à peine convexes; bord apical arrondi ♂, en pointe allongée ♀; 3 carènes peu marquées, oblitérées par derrière; pas d'ailes. Pattes longues, très grêles; tarsi antérieurs ♂ peu dilatés.

27. SILPHA FIGURATA Brull. Canar. 1838. 59. — Wol. Cat. Can. 1864. 97. — *costata* Brull. Canar. 1838. 59. pl. 2. f. 11. — Long. 16; larg. 7 mill. — Ténériffe.

En ellipse, très allongé, peu convexe sur le milieu du dos, noir brun, terne en dessus, pubescent en dessous.

Antennes grêles, dépassant le prothorax, conformées comme dans le *simplicicornis*, mais plus ruguleuses. Tête comme dans celui-ci, mais à points plus forts. Prothorax (4,5/7 mill.) peu convexe, couvert de points granuleux, peu serrés, rendu inégal sur le disque par 4 lignes élevées, lisses, les 2 intermédiaires rapprochées, fines, allant presque du bord basal au bord apical, les 2 externes irrégulières interrompues, bords latéraux largement explanés, peu élevés postérieurement et séparés du disque par un faible pli; bord basal droit au milieu, sinué de chaque côté; côtés faiblement arqués, à peine rebordés, bord apical faiblement échancré, angles obtus peu avancés. Ecusson lancéolé, peu ponctué, finement caréné dans son milieu. Elytres (11/7 mill.) fortement ponctuées, points espacés râpeux, munis chacun d'une petite soie; rebord tranchant peu élevé, muni à l'épaule d'une petite dent; gouttière large, ponctuée, s'élargissant postérieurement, extrémité arrondie, plus acuminée ♀ que ♂; épipleures larges, concaves, fortement ponctuées en dehors; carènes minces, régulières, bien marquées, l'intermédiaire plus longue que l'externe, l'interne s'affaiblissant et se terminant plus tôt que les autres. Pattes comme dans *simplicicornis*.

Ces deux espèces se distinguent à première vue, quoique bâties sur le même modèle; si l'on ne doit pas en faire un genre particulier, elles méritent bien de former un groupe à part.

XVII — NECRODES (*νεκρῶδες*, *cadavéreux*) Wilkin Leach.

Zool. Misc. n. 1815. 87.

Corps allongé, subdéprimé, tronqué à l'extrémité des élytres, qui sont dépassées par l'abdomen; stigmates du prothorax très visibles, à la manière des *Philonthus*. Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux, qui sont très grands, échancrée en col par un sillon transverse profond; labre très étroit, largement et peu profondément échancré. Antennes courtes, assez épaisses sans être serrées, 2^e et 3^e articles de même longueur, 4-8 s'élargissant peu à peu en devenant plus minces, massue non séparée. Prothorax disciforme, faiblement tronqué en

devant ; élytres étroitement rebordées sur les côtés, marquées de 3 carènes lisses et luisantes. Hanches intermédiaires écartées. Tarses antérieurs ♂ dilatés, cuisses postérieures ordinairement renflées avec les jambes arquées.

La grande et curieuse espèce qui représente ce genre vit comme les espèces de *Silpha*, mais toujours dans les charognes de gros animaux, tels que chiens, chevaux, etc., son faciès est légèrement différent, quoique offrant la plus grande analogie. Aussi sa position a-t-elle été l'occasion de controverses entre les auteurs. La plupart l'ont reconnu comme genre particulier ; nous avons nous même longtemps hésité, mais nous avons fini par nous ranger à cette opinion, entraîné par le caractère des stigmates prothoraciques.

1. *NECRODES LITTORALIS* Lin. Fn. Suec. 450. Syst. Nat. i. ii. 570. 11. — F. Ent. Syst. i. 249. 2 ; Syst. El. i. 336. 2. — Payk. Fn. Suec. i. 326. 1. — Gyl. Ins. Suec. i. 261. 1. — ♂ *clavipes* Sulz. Abgek. Gesch. Ins. iv. p. 176. — ♂ *femoratus* Mulr. Zool. Prod. 64. — *contusus* Bergstr. Nomenc. i. 65. pl. 11. f. 2. — *gibbosus* Fourc. Ent. Par. i. 30. — *rufoclavatus* de Geer Ins. iv. 176. — ♀ *simplicipes* Heer Fn. Helv. 389. — ♂ Chap. Lieg. 1853. p. 392. pl. 1. f. 8. — Küst. Kæf. Eur. vii. 41. — Gebl. Ledeb. Reise 1830. 94. — Mosc. Bul. 1847. 440 (150). — Long. 15-22 ; larg. 6-10 mill. — Europe, France, Suède, Allemagne, Suisse, Sibérie, Salair, Barnaul.

Var. *brunneus* de G. Ins. iv. 176.

Var. *lividus* F. S. El. i. 337.

Allongé, subparallèle, élargi postérieurement, déprimé sur le dos, noir luisant et pubescent en dessous, un peu terne et glabre en dessus. Antennes fortes, n'atteignant pas la base du prothorax, 1^{er} article épais, deux fois plus long que le 2^e, qui est égal à 3, obconiques, 4-6 ronds, de plus en plus larges, 7-8 en sous-coupe très larges, les 3 derniers roux, formant une massue, dernier obovale. Tête en triangle, fortement étranglée derrière les yeux, qui sont très grands, globuleux ; milieu convexe, finement pointillé ; labre court largement échancré. Prothorax (6/9 mill.), base largement arrondie avec les côtés, dont le rebord est élargi et peu élevé, bord apical finement

rebordé, presque droit sans angles bien marqués ; surface densément pointillée, chagrinée, avec une série de points plus gros le long de la marge, milieu du disque presque lisse, légèrement sillonné dans son milieu, entre 2 élévations lisses, séparées du bord latéral par un sillon bien marqué. Ecusson long, lancéolé, pubescent en devant. Elytres (12/9 mill.) rabattues sur les côtés avec un mince repli, un peu rétréci en avant ; épipleures cannelées, pointillées ; extrémité tronquée, un peu en pointe à la suture ♀ ; carènes minces, élevées, lisses, externe plus forte, coudée, ainsi que l'intermédiaire, par le tubercule qui les croise, bosse humérale lisse, se prolongeant un peu entre les 2, toutes les 3 atteignent le bord apical ; intervalles densément couverts de très petits points râpeux ; on aperçoit en outre des lignes de granules espacés, le long des carènes et dans l'intervalle entre le repli marginal et la carène externe ; pas d'ailes sous les élytres ; débordées par l'abdomen ♂. Tarses antérieurs un peu élargis, patelliformes, cuisses postérieures renflées dans certains, jambes postérieures arquées.

XVIII — NECROPHORUS (νεκροφόρος, *qui emporte les morts*)

Fab. Syst. Ent. 1775. 71.

Corps grand, robuste. Tête plus ou moins grosse, dégagée du prothorax, rétrécie en col par un étranglement derrière les yeux ; tempes renflées ; yeux obliques ; front limité par des sillons profonds réunis postérieurement. Epistome séparé du front par une strie transverse, échancré, avec une membrane cornée enchassée dans l'échancrure, plus longue ♂ que ♀. Labre profondément échancré. Mandibules fortes, tranchantes, à pointe simple, prolongées bien au-delà du labre. Mâchoires à lobe interne mutique ; menton large, languette profondément bilobée. Palpes grêles et petits, dernier article des maxillaires subcylindrique un peu atténué.

Antennes courtes, de 10 articles apparents, mais en réalité de 11 ; le 2^e très petit, réduit à un nodule enfoncé dans le 1^{er} article, qui est obconique, long, funicule court, peu épais ; massue courte de 4 feuillets.

Prothorax rétréci postérieurement, tronqué devant et derrière, disque convexe, entouré d'un rebord explané, finement canaliculé dans sa longueur, traversé avant le milieu par un sillon profond, terminé de chaque côté par un arc. Ecusson grand, triangulaire. Elytres subparallèles, un peu élargies et tronquées au bout, avec la bosse humérale saillante et les épipleures cannelées. Abdomen dépassant les élytres et terminé en pointe, susceptible de se contracter.

Poitrine garnie de longs poils. Pattes grandes et fortes. Hanches intermédiaires très écartées; métépimères arrondies. Cuisses postérieures renflées; jambes dilatées, prolongées en dehors en une épine. Tarses antérieurs ♂ élargis en cœur et garnis en dessous de brosses de longs poils.

Ces insectes vivent de cadavres, tels que rats, souris, etc. Attirés par l'odeur de leur proie, ils arrivent aussitôt et de fort loin, en troupes souvent nombreuses, creusent la terre friable et l'y enfouissent. Si le terrain est dur ou qu'un obstacle se rencontre, ils portent le cadavre dans un endroit plus propice. C'est dans ces matières qu'ils trouvent leur nourriture et qu'ils déposent en même temps leurs œufs, afin que leurs larves en profitent à leur tour.

Quand on saisit les Nécrophores, ils font entendre un petit bruit dû au frottement de l'extrémité des élytres sur le 1^{er} segment de l'abdomen; ils répandent une odeur fétide et dégorgent un liquide puant.

Les larves de plusieurs espèces sont connues depuis longtemps : *germanicus* Klingelhoeffer Stet. Zeit. 1843. p. 88-89. — *vespillo* Roesel Ins. Belust 1761. p. 1-20. pl. 1. f. 5-6. de Geer Mém. 1774. p. 171. — Schiœdte Nat. bidsskr. 1862. p. 225-226. pl. 8. f. 1-10. — *investigator* Schiœdte Nat. bidsskr. p. 226. — *mortuorum* Schiœdte Nat. bidsskr. p. 226. pl. 8. f. 11-17.

Chapuis et Candèze ont décrit les métamorphoses de ces insectes dans leur travail sur les larves des Coléoptères. Liège. Mém. Soc. Sc. 1853, p. 390-391.

Tableau synoptique des espèces de *Necrophorus* F.

- A. Elytres noires, sans fascies jaunes ou rouges.
 B. Massue des antennes noire.
 C. Plus grand et plus épais. Epipleures rouges.
 1. *germanicus* L. BSFASib.
 C'. Plus petit et moins épais. Epipleures concolores.
 2. *morio* Gebl. R^s.
 B'. Massue des antennes rousse, sauf le 1^{er} article cupuliforme.
 3. *humator* F. Eur.As.
 A'. Elytres ornées de 2 fascies jaunes ou rouges.
 B. Massue des antennes rousse.
 C. Pronotum garni sur tout le pourtour, au moins en devant, de longs poils jaunes serrés.
 D. Jambes postérieures arquées. 4. *vespillo* L. Eur.Sib.
 D'. Jambes postérieures droites. 5. *vestigator* Hrsch. Eur.
 C'. Pronotum dénudé.
 D. Fascie jaune antérieure large entière.
 E. Abdomen densément vêtu de poils jaunes, les segments frangés au bord apical de poils de cette couleur. 6. *fossor* Er. FA.
 E'. Abdomen à peine garni de poils noirs au bord des segments et sur les côtés.
 F. Extrémité anale munie de poils jaunes.
 8. *ruspator* Er. FASib.
 F'. Extrémité anale à poils noirs.
 9. *sepultor* Charp. APyr.Sib.
 D'. Fascie jaune antérieure étroite, raccourcie en dedans et en dehors, décomposée et souvent réduite à une ou deux taches. 7. *corsicus* Cast. Corse, Sard.
 B'. Massue des antennes noire.
 C. Echancre de l'épistome campanulée jaune. Bord antérieur du prothorax fortement ponctué, dilaté et pubescent sur les côtés. Angle huméral non saillant en dehors, cilié. 10. *nigricornis* Fald. Cauc.
 C'. Epistome sans échancre campanulée jaune. Bord antérieur du prothorax faiblement ponctué, non dilaté ni pubescent sur les côtés. Angle huméral non cilié, en pointe saillante. 11. *mortuorum* F. Eur.Sib.

1. **NECROPHORUS GERMANICUS** L. Syst. nat. II. 569. — F. Ent. Syst. I. 246. S. El. I. 333. — Kust. Kæf. Eur. IV. 50. — Er. Brand. I. 223. — Fairm. Fn. Fr. 291. 1. — Redt. Fn. Aust. I. 317. — Gyl. Ins. I. 257. 1. — *listerianus* Fourc. Ent. Par. I. 17. — Long. 25-35, larg. 10-13 mill. — France orientale et boréale : Saumur, Le Mans, Montmorency, Metz, Allemagne, Vienne, Suède, Angleterre.
- Var. *frontalis* Fisch. Mosc. Bul. 1844. 138. — *speciosus* Schultz. Nat. VI. 95. pl. 4. f. 5. — Bucharie.

Allongé, subparallèle, légèrement convexe, noir-luisant, membrane lisse cornée jaune-roux, épipleures brun-roux. Tête grosse, courte et large, étranglée en col par un sillon transverse; yeux très grands, tempes petites strigieuses; surface éparsément pointillée, surface frontale plane, bordée d'un sillon circulaire, front séparé de l'épistome par une strie anguleuse; échancrure de l'épistome campanulée grande ♂♀. Antennes courtes, bouton large, lamellé, noir. Prothorax (8/10 mill.) entouré en devant d'un étroit rebord, dans le reste du pourtour d'un large rebord aplati, ponctué, disque large, convexe, très finement pointillé, marqué au milieu d'une fine canalicule, croisée par une ligne antérieure distincte seulement sur les côtés; arqué sinué latéralement, plus étroit à la base. Ecusson long, en triangle arrondi au sommet, densément aciculé pointillé. Elytres (15/12 mill.) ponctuées, avec deux faibles lignes longitudinales; bosse humérale saillante arrondie, ciliée en dehors de poils noirs, ainsi que les bords postérieurs, une faible bosse subapicale; bord apical tronqué, subsinué. Abdomen cilié de poils noirs. Trochanters postérieurs échancrés au bout, jambes droites. Tarses antérieurs ♂ médiocrement dilatés et garnis en dessous de brosses de poils roux.

Un exemplaire de Loudun présente, au tiers antérieur des élytres, une tache rouge sombre, répondant à un élargissement de la bande rouge de l'épipleure.

Le *ruthenus* Mots. Pet. Ac. 1859. 295 de la Russie méridionale, que l'auteur dit intermédiaire entre le *germanicus* et le *morio*, n'est sans doute qu'une légère variété de cette espèce, en voici le signalement : « d'un noir uniforme sur le corps, à l'exception des côtés latéraux des élytres et du front, qui sont d'un testacé roux comme dans

le *germanicus*, mais sa taille est constamment d'un tiers plus petite, la ponctuation des élytres plus fortement marquée, ce qui les rend peu luisantes, et une pubescence noirâtre sur le dessous du corps et sur les côtés latéraux des élytres, à leur partie postérieure, paraissent l'en distinguer. »

2. NECROPHORUS MORIO Gebl. Mosc. Mém. 1817. vi. 319. 1830. Ledeb. II. 2. 93. 1847. Mosc. Bul. xx. 4. 39. (149). 1850. 459. — Fald. Pet. Ac. Mém. 1835. 340. — Mots. Pet. Ac. 1860. 295. Mél. Biol. 304. — Solsk. Ross. Pet. 1874. 213. — Long. 23; larg. 10 mill. — Russie mérid. : Volga, Sarepta; Sibérie : Karkaraly, Ajagus, Kolywan, Loktewsk, Irtysch, Irkutsk, Issik-Kul.

Le *morio*, dont je tiens de Motschulsky un exemplaire en fort mauvais état, est très voisin du *germanicus*, faisant le passage à l'*humator*, si toutefois ce n'en est pas une simple variété, à épipleures concolores.

3. NECROPHORUS HUMATOR F. Ent. Syst. i. 247. S. El. i. 333. — ξ Roesel. Ins. Belust. iv. 1750. pl. 1. Küst. Kæf. Eur. iv. 51. Solsk. Turk. i. 1874. 213. — Gyl. Ins. Suec. i. 258. 2. Goëze. Ent. Beyt. 190. 2. — Er. Brand. i. 223. — Redt. Fn. Aust. 317. — Fairm. Fn. Fr. 291. — Long. 18-25; larg. 9-11 mill. — France, Allemagne, Suède, Angleterre, Turkestan.

Var. *bimaculatus* Steph. Lond. Ent. Soc. i. 82. pl. 2.

Ressemble beaucoup au *germanicus*, mais il est moins grand et plus étroit, le bouton des antennes est jaune-orangé, les épipleures sont noires comme le reste du corps ou d'un brun obscur, le prothorax est moins large, son sillon transverse mieux marqué et les élytres sont couvertes de points plus forts avec des lignes élevées plus distinctes. La strie entre le front et l'épistome est moins anguleuse et la membrane cornée-jaune moins longue et moins vasée en devant.

Dans des exemplaires très petits, on trouve la membrane cornée, courte et large, très loin d'atteindre la strie qui sépare le front de l'épistome; dans un exemplaire, elle est réduite à une mince bordure et l'épistome ne paraît pas échancré.

- 3^a. NECROPHORUS ORIENTALIS Mots. Schrenck 1860. 126. 216, pl. 8. f. 24. Ab. xvi. 90. 418. — Sibérie orientale.

- 3°. NECROPHORUS NIGERRIMUS Kr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 230. 3°.
— Long., 25 mill. — Margelan (Turkistan).

De la taille des plus petits exemplaires du *morio*, il en diffère par le dessus de la tête d'un noir uniforme et les bords latéraux rétroussés du prothorax de même couleur. Antennes noires. Tête légèrement ponctuée derrière la ligne enfoncée; l'espace, circonscrit par une ligne enfoncée entre les yeux, est divisé en 2 portions inégales, dont les 2/3 derrière la ligne et l'autre tiers au-devant; cette portion n'est enfoncée en aucune façon, seulement au milieu il y a une ligne à peine enfoncée, entièrement lisse par devant, obsolètement ponctuée par derrière, comme le reste de la tête. Du reste il ressemble au *morio*, seulement les épipleures sont noires.

L'espace de la tête au-devant des antennes est lisse, creusé, et jaune-rouge dans *germanicus* et *morio*.

4. NECROPHORUS VESPILLO Lin. Fn. Suec. 444. Syst. nat. II. 562.
— Kust. Käf. Eur. v. 52. † Schiød. Tidsskr. 1863. 225. pl. 8.
f. 1-10. — F. Ent. S. I. 247. S. El. I. 335. Payk. Fn. Suec. I.
324. Gyl. Ins. Suec. I. 259. Er. Brand. I. 224. Fairm. Fn. Fr.
291. Gebl. Ledeb. Leq. 1830. II. 94; 1847. Bul. Mosc. I. 440
(150). — *vulgaris* Preysl. Bohm. Ins. I. 12. — Long. 15-20;
larg. 7-9 mill. — Suède, Angleterre, Russie, Sibérie, France, rare
dans le midi, Allemagne.

Allongé, élargi postérieurement, subdéprimé, noir luisant, 2 fascies rouges transverses sur les élytres, avec les 3 derniers articles de la massue. Celles-ci courtes, 2 et 3 articles obconiques subégaux, 4-6 courts transverses, 7° cupuliforme, contenant la massue, qui est en bouton. Tête légèrement convexe, peu ponctuée; yeux grands, peu saillants; étranglée en col, avec les joues renflées; dessus bordé de chaque côté d'un fort sillon; séparée, par une fine strie transverse, de l'épistome qui est entaillé profondément ♂ et comme garni d'une membrane roussâtre courte ♀; labre bilobé. Prothorax (5/6 mill.) dilaté-arrondi sur les côtés en devant, droit au bord apical, arqué à la base, sinué sur les côtés, relevé au milieu, disque sillonné longitudinalement, entouré d'une impression sinueuse; ponctué rarement sur la partie élevée, densément sur le pourtour, garni sur la partie

antérieure de poils jaunes serrés mi-dressés. Ecusson ponctué, en ogive. Elytres (9/7 mill.) vaguement pointillées, parsemées de poils jaunes mi-dressés, épaules saillantes, épipleures creusées, faiblement ponctuées extrémité tronquée, angle sutural pointu; fascies jaune-rouge, l'une au tiers, l'autre au bord apical, se rejoignent sur les épipleures qu'elles occupent en entier. Dessous et abdomen garnis d'une pubescence jaune. Jambes postérieures arquées, trochanters munis d'une longue épine. Tarses antérieurs fortement dilatés à articles cordiformes et garnis de longues brosses de poils jaunes ♂.

- 4^a. NECROPHORUS LUNATUS Fisch. 1842. Cat. Karel. 9. — 1844. Mosc. Bul. 40. 36. — *var. particeps*. Fisch. id. 1844. 139. — Long. 19; larg., 12. — Songarie, Turcménie.

Noir, avec les 3 derniers articles de la massue antennaire d'un flave pâle et une large fascie médiane semi-lunaire parfois décomposée, rouge. Tête grande, avec des impressions latérales linéaires obliques; massue grande, ovale, pubescente. Prothorax largement bordé sur les côtés, arrondi postérieurement, convexe au milieu, marqué en avant de deux lignes enfoncées, se joignant en forme de V avec la demi-canalicule médiane. Elytres oblongues, peu convexes, tronquées à l'extrémité.

5. NECROPHORUS VESTIGATOR Hersch. Illig. Mag. vi. 274. — Kust. Käf. Eur. vii. 36. — Fairm. Fn. Fr. 291. 4. — *sepultor* Gyl. Ins. Suec. iv. 308. — *var. trimaculatus* Gredl. — *var. interruptus* Brul. Exp. Mor. Ent. 160.

Ressemble extraordinairement au *vespillo*, il en diffère seulement par son prothorax plus fortement dilaté en avant, garni de poils jaunes tout autour, même à la base, les jambes postérieures droites et les trochanters échancrés à l'extrémité et formant deux petites pointes.

La fascie jaune postérieure des élytres est plus étroite, plus en zigzag et éloignée du bord apical, mais quelquefois elle rejoint l'antérieure, ne laissant subsister de la fascie noire intermédiaire que quelques taches, telles qu'une externe géminée et une commune suturale carrée, avec une petite entre les deux (*interruptus* Brullé); plus

souvent la fascie postérieure se décompose en deux ou trois petites taches.

5. *NECROCEPHALUS SEPULCHRALIS* Heer Fn. Helv. 1842. 388. 7°.

— Long. 27 mill. — Alpes, Saint-Bernard.

Noir, massue des antennes concolore. Col densément et assez profondément ponctué. Prothorax un peu rétréci à la base, convexe sur le dos, peu impressionné en devant, garni de longs poils flaves, finement mais densément ponctué partout. Elytres très finement ponctuées, glabres, ciliées seulement au bord antérieur, noires, avec 2 fascies larges, sinuées, rousses ou rouges ; base, extrémité et fascie médiane interrompue à la suture, noires. Jambes postérieures peu incurbées.

Stature du *vespillo*, il se reconnaît aisément à la massue des antennes noire, au prothorax beaucoup moins profondément impressionné en devant, à ses élytres plus finement ponctuées.

Cette espèce, dont Heer n'avait vu qu'un seul exemplaire, avait été rapportée au *nigricornis* Fald. Depuis, le docteur Stierlin a retrouvé quelques autres individus du Simplon et du St-Gothard, les a comparés à des *nigricornis* du Caucase et regarde ces deux espèces comme différentes : les tempes sont simplement ponctuées et non striées, la massue des antennes est noire, le pronotum est plus étroit, échancré par devant ; la frange de poils des cuisses est jaune ; tandis que dans l'espèce du Caucase les tempes sont striées, la massue des antennes est jaune, le prothorax bien plus large et tronqué par devant, et la frange de poils des cuisses est noire.

6. *NECROPHORUS FOSSOR* Er. Brand. i. 224. Sturm Deuts. Ins. XIII.

66. pl. 266. — *interruptus* Steph. Ill. Brit. III. 18. pl. 16. f. 2. —

gallicus Duv. Glan. 1860. 139. — Scriba Berl. Zeits. 1864. 377. —

Gren. Fr. Soc. ent. 1867. 10°. — Long. 12-18 ; larg. 5-8 mill. —

France : Saumur, Le Mans, Tarbes ; Allemagne, rare.

Tête triangulaire, fortement étranglée en col, avec les tempes très renflées, peu pointillées ; disque finement sillonné dans son milieu, bordé sur ses côtés d'un fort sillon ; épistome séparé du front par une strie transverse, échancrure longue ♂, garnie d'une membrane rousse.

Bouton des antennes rouge, reçu dans le 7^e article cupuliforme. Prothorax (4/5 mill.) finement ponctué, sillonné dans son milieu, dilaté-arrondi aux angles antérieurs, traversé par un sillon profond, formé de 4 arcs, entièrement glabre. Ecusson ogival, densément pointillé. Elytres marquées d'une bossette oblongue à l'angle huméral, de points subalignés, de 3 faibles côtes peu régulières, ornées de 2 fascies transverses jaune-rouge, peu sinuées, interrompues à la suture, 1^{re} au tiers, 2^e apicale, s'éloignant près de la suture, épipleures occupées. Abdomen garni et bordé de poils jaunes, jambes postérieures droites, trochanters échancrés au bout. Tarses antérieurs dilatés en cœur et garnis en dessous de brosses de longs poils jaunes ♂.

7. NECROPHORUS CORSICUS Cast. Fr. [Soc. ent. 1832. 390.—*funereus*
Gen. Tur. Ac. 1839. 58. pl. 1. f. 12 ♂ 13 ♀. fasc. II. 18. 18.—
Long. 20; larg. 9 mill.

Cette espèce, regardée jusqu'ici comme très distincte, n'est qu'une variété propre aux îles de Corse et de Sardaigne, il m'est impossible de trouver d'autre différence notable avec le *fossor* que la forme des fascies rouges des élytres, qui sont plus ou moins réduites; l'antérieure large et complète se prolonge sur l'épipleure jusqu'au bord latéral, souvent même remonte jusqu'à l'épaule et va rejoindre postérieurement la fascie subapicale, tandis qu'ici la fascie antérieure est étroite, raccourcie en dedans et en dehors, sans rejoindre la bande rouge qui occupe les épipleures dans l'intervalle des deux fascies; elle est souvent décomposée et réduite à une ou deux petites taches.

- 7^a. NECROPHORUS BASALIS Fald. Pet. Ac. Mém. 1835. p. 365. (28)
16^a. — Long. 18,5; larg. 8 mill. — Mongolie.

Stature et grande ressemblance avec le *vespillo*, dont il est peut être une variété.

Noir luisant, sur l'épistome une tache triangulaire, membraneuse, flave, 3 derniers articles de la massue antennaire d'un flave testacé, sur les élytres, un peu avant le milieu, une fascie large, sinuée, transversale, d'un jaune orange, et une autre près du bord apical, con-

fluentes au bord latéral. Tête large, front médiocrement convexe, ligne longitudinale de chaque côté en dedans des yeux, vertex strigueux, obsolètement pointillé; labre profondément échancré, densément cilié de flave; palpes noirs avec le bout des articles ferrugineux. Yeux à peine saillants, transverses. Antennes peu plus longues que la tête. Prothorax glabre, rétréci postérieurement, tronqué devant et derrière, côtés obliques, à peine sinués, peu convexe en dessus, inégal, étroitement canaliculé, impression flexueuse transverse avant le milieu assez marquée, explané postérieurement et sur les côtés, sans rebord, marginé au sommet; ponctué densément sur les côtés, vaguement et obsolètement sur le disque. Ecusson grand, triangulaire, densément et profondément ponctué-strigueux, marqué à la base d'une dépression transverse. Elytres oblongues dilatés postérieurement, rudement et vaguement ponctuées, tronquées sinuées au bout, un peu convexes, avec 2 lignes très obsolètes, déclives sur les côtés. Dessous très densément mais obsolètement granuleux, poitrine garnie d'une pubescence testacée. Pattes robustes, allongées; tarses ♂ densément garnis d'une pubescence flave.

Toute cette description convient parfaitement au *fossor* et non au *vespillo*.

8. NECROPHORUS RUSPATOR Er. Brand. i. 225. 6*. — Sturm. Fn. Ins. xiii. p. 68. pl. 267. — Fairm. Fn. Fr. 292. — Schiedte Nat. Tidsschrif 1863. 226.

Var. *microcephalus* Thoms. Skand. iv. p. 9. — *investigator* Zett. Holm. 1824. 154. — Var. *dauricus* Mots. Schrenck 1860. 125. pl. 8. f. 23. Ab. xvi. 89. 117*. — Long. 19; larg. 8 mill. — France: Le Mans, Combrée, Vosges; Allemagne, rare; Suède; Daourie orientale: Amur.

Tête lisse, fortement étranglée en col, disque lisse, bordé de chaque côté d'un fort sillon, épistome séparé par une strie transverse, échancré, comme dans les espèces précédentes, avec une membrane jaune enchâssée. Prothorax (5/6 mill.) entouré d'un rebord déprimé ponctué, sillonné dans son milieu, traversé par un sillon festonné; côtés un peu élargis en devant mais non sinués; dénué de pubescence. Ecusson densément pointillé en

devant, en ogive. Elytres (10/8 mill.) plus fortement ponctuées, lignes longitudinales moins visibles; 2 fascies rouges : antérieure large, postérieure assez étroite apicale; épipleures jaune-rouge, bosse humérale lisse, très élevée. Abdomen presque glabre, chaque segment frangé de noir, sauf l'anal, qui est garni de poils jaunes. Jambes postérieures droites, trochanters échancrés au bout. Tarses antérieurs dilatés, garnis de longues brosses ♂.

9. NECROPHORUS SEPULTOR Charp. Hor. 1825. 200. — Gebl. Mosc. Bul. 1847. 439 (149). 1859. 459. — Küst. Käf. Eur. VII. 39. — Fairm. Fn. 292. 6. — *investigator* Gebl. Ledeb. 1830. 93. — *obrutor* Er. Brand. I. 1837. 225. 7.

Var. *sibiricus* Mots. Schrenck. Pet. 1860. II. 2. 126. Ab. XVI. 90. 119.
Var. *suturalis* Mots. Schrenck Pet. 1860. II. 2. 126. Ab. XVI. 90. 120.
— Long. 18-20; larg. 7-9 mill. — Allemagne, Silésie, Pyrénées, Autriche; Sibérie : Ajagus, Kolywan.

Allongé, noir luisant, élytres ornées de 2 fascies rouges, antérieure large et postérieure étroite en zigzag, fort rapprochée du bord apical, interrompue à la suture, la fascie noire intermédiaire s'étendant sur l'épipleure, ainsi que la fascie basale, sauf une petite tache subhumérale; bouton des antennes rouge, ainsi que la membrane enchâssée dans l'échancrure de l'épistome, longue et campanulée ♂, triangulaire et courte ♀. Tête étroitement échancrée en col, tempes renflées strigieuses; disque très finement pointillé, strie longitudinale médiane insensible, sillons interoculaires réunis sur la nuque, front séparé de l'épistome par une faible strie transverse. Prothorax (6/4,5 mill.) glabre, dilaté arrondi en devant, entouré d'un mince rebord, déprimé et rugueux sauf au bord apical, disque élevé, peu pointillé, finement canaliculé au milieu, croisé au tiers par un profond sillon formé d'arcs. Ecusson en ogive avec quelques points. Elytres (8/7 mill.) assez distinctement ponctuées, longées de faibles lignes, bosse humérale très élevée, bord apical tronqué, sinué en dedans et formant un petit angle fortement pointu. Abdomen finement pubescent de noir; jambes postérieures droites, trochanters échancrés-tronqués à la pointe. Tarses antérieurs fortement dilatés en cœur ♂ et garnis de brosses de longs poils jaunes.

10. NECROPHORUS NIGRICORNIS Fald. Transc. 1. 1835. 217. 200*.
— Long. 16; larg. 7,4 mill. — Caucase.

Taille et stature du *vespillo*. Noir, avec 2 fascies rousses ondulées, à peine interrompues à la suture, confluentes au bord latéral et remontant vers les épaules, mais rétrécies. Tête arrondie, ponctuée, strigieuse au vertex et derrière les yeux, ligne frontale fine semi-circulaire bien marquée. Yeux lunaires. Antennes peu plus longues que la tête, luisantes, massue grisâtre. Prothorax presque carré, assez luisant, tous les angles obtus, rebord élevé, médiocrement convexe en dessus, moins ponctué au milieu du disque, plus densément vers les côtés; marqué d'une ligne longitudinale très fine et d'une impression transverse avant le milieu; de chaque côté, à l'angle antérieur, de longs poils flaves. Ecusson grand, triangulaire, luisant, densément ponctué. Elytres raccourcies, en carré oblong, impressionnées à la base, très obsolètement pointillées, avec 3 lignes obsolètes, épaules fort saillantes. Dessous densément pointillé, poitrine et marges des segments densément garnies de poils flaves couchés. Tarses d'un noir de poix, antérieurs plus clairs.

11. NECROPHORUS MORTUORUM F. Ent. Syst. 1. 248. Syst. El. 1. 335. 8. — Küst. Kæf. Eur. vii. 40. — Fairm. Fn. 292. 8. — Schiedte Nat. Tidsskr. 1863. 226. pl. 6 f. 11-18. — Er. Brand. 226. 8. — Redt. Aust. 1. 317. — Gebl. Ledeb. Reis. 1830. II. 94. 47. Mosc. Bul. 1847. 439 (149). — Mots. Mosc. Bull. 1859. 461. 59. Pet. Biol. 1859. 231; 1860. 126. — *vespilloides* Herbst. Fuessl. Arch. 1784. v. 32. — Long. 12; larg. 6 mill. — Europe, dans les champignons des bois en décomposition: France, Allemagne, Autriche; Sibérie: Jakutsk, Kamtschatka, Amur.

Oblong, noir luisant, bouton des antennes noir, prothorax dénudé. Elytres ornées de 2 fascies jaunes et d'une tache humérale, fascie antérieure complète, rétrécie à la suture, dentée sur ses bords, postérieure petite, près du bord apical, n'atteignant ni la suture ni le bord externe. Tête à peine pointillée, fortement étranglée en col, tempes strigieuses peu renflées; disque limité par un sillon réuni à la nuque et séparé de l'épistome par une strie transverse; membrane enchâssée dans l'échancrure de l'épistome noire, fovéolée, plus grande ♂ que ♀. Pro-

thorax ($3/4$ mill.) finement pointillé, même dans son pourtour, disque élevé, canaliculé dans son milieu, sillon transverse profond formé de 2 arcs; bord antérieur étroitement rebordé, plus étroit que le bord basal, côtés arqués, subsinués. Ecusson en ogive, peu ponctué. Elytres ($7/6$ mill.) ponctuées, bosse basale élevée tranchante, postérieure arrondie assez distincte, bord apical tronqué, subsinué vers la suture. Abdomen à peine pubescent de de brun-noir. Jambes postérieures droites, trochanters à pointe tronquée. Jambes antérieures ♂ légèrement dilatées, articles en cœur, garnis en dessous de brosses de poils jaunâtres.

11^a. NECROPHORUS AURORA Mots Schrenck Reise 1860. 126. Ab. XVI. 91. 121. — Russie boréale.

XIX — AGYRITES (ἀγύρτης, *vagabond*) Fröehl. Nat. xxviii. 18.

Corps oblong, convexe. Tête courte, enfoncée, yeux arrondis assez saillants; mandibules saillantes, arquées et très aiguës à l'extrémité; mâchoires à lobe interne terminé par des spinules, palpes à dernier article grand, avant-dernier beaucoup plus petit; languette échancrée. Antennes claviformes, 3^e article plus long que le 2^e et le 4^e, massue formée des 4 ou 5 derniers articles, longues et grossissant peu à peu. Prothorax finement rebordé, rétréci en avant. Elytres oblongues, fortement striées-ponctuées. Pattes robustes, cuisses comprimées, dépassant à peine le bord postérieur des élytres; jambes un peu élargies à l'extrémité, munies au bord externe de fines épines.

Thomson a séparé, sous le nom de *Hadrambe*, certaines espèces d'*Agyrtes* auxquelles il attribue pour caractères des palpes maxillaires à dernier article linéaire $1\ 1/2$ fois plus long que le pénultième, des antennes à massue de 5 articles fortement épaissis, un prothorax transverse, plus large que les élytres, échancré au bord apical avec les 4 angles arrondis; des élytres à stries fortement ponctuées, toutes prolongées jusqu'à l'extrémité, sans aucune jonction; les tarsi antérieurs ♂ légèrement dilatés.

Les espèces à dernier article des palpes maxillaires

ovale acuminé, 2 fois plus long que le pénultième, à massue des antennes faible, à prothorax tronqué devant et derrière, avec les angles antérieurs obtus et les postérieurs droits; la 3^e strie des élytres réunie avec la 1^{re}, restent dans le genre *Agyrtes*.

1. AGYRTE BICOLOR Cast. Ins. n. 7. — Fairm. Fn. Fr. 298. 2. — Long. 5; larg. 2 mill. — France : Châtillon, Meudon, Montmorency, Fontainebleau, Orival, Strasbourg; sous les mousses; rare.

Oblong, elliptique, assez convexe, noir luisant en dessus, brun en dessous, bouche, antennes et pattes d'un rougeâtre obscur. Antennes atteignant presque la base du prothorax, 1^{er} article assez épais, les suivants obconiques, 2^e et 4^e beaucoup plus courts que le 3^e, 5-7 globuleux, 8-11 élargis peu à peu, formant une massue peu serrée. Tête peu convexe, inégale surtout en devant, avec des points forts, épars; yeux ronds, saillants, bord antérieur rétréci, tronqué, rebordé. Prothorax plus large que long, rabattu latéralement, parsemé de points assez forts, peu nombreux, entouré d'un fin rebord; base large, droite avec les angles droits; bord apical droit mais rétréci, avec les angles non saillants, obtus arrondis; côtés subarrondis au tiers postérieur, obliquant en avant. Ecusson en triangle, lisse, plan. Elytres un peu plus larges à la base et près de 3 fois plus longues que le prothorax, subparallèles, rebordées finement sur les côtés, arrondies et fortement rabattues au bout; épipleures rétrécies postérieurement, pointillées; stries ponctuées fortes, 6 en dedans de l'épaule, 3 en dehors, dont la marginale se divise à partir du tiers, interstries plans, lisses. Jambes épineuses et ciliées.

Se distingue du *castaneus* par sa couleur plus noire, sa forme plus parallèle, ses élytres plus fortement rabattues et brièvement arrondies, le devant de l'épistome rebordé, les yeux plus saillants, le prothorax à points plus forts et plus vagues, l'écusson plus court, les interstries plus plans et lisses.

2. AGYRTE CASTANEUS Fröhl. Naturf. 1799. 19. — F. Syst. El. n. 569 (*Mycetophagus*). — Küst. Käf. Eur. xxii. 24. — Fairm. Fn. Fr. 298. 1. — Er. Fn. Brand. 232. 1. — Gyl. Ins. Suec. iii. 682. —

vespertinus Frœhl. Naturf. 1799. 18. pl. 1. f. 11. — *spinipes* Panz. Fn. Germ. 24. 20. — Long. 3-5; larg. 1,5-2,8 mill. — Suède, Allemagne; France: Fontainebleau, Anjou; sous les pierres et les écorces, très rare.

Elliptique, allongé, peu convexe, subparallèle, arrondi aux deux bouts, luisant, brun; élytres marron; antennes, palpes et pattes roux. Antennes atteignant la base du prothorax, 1^{er} article ovale, 2^e arrondi, 3^e obconique plus long, 4-6 petits courts serrés, les 5 derniers épaissis peu à peu, formant une massue lâche. Tête large et convexe, parsemée de points assez forts; yeux arrondis peu saillants; front largement tronqué, labre échancré. Prothorax transverse, coupé droit à la base et au sommet, un peu convexe, avec des points un peu forts, écartés, mêlés de plus fins, entouré d'un mince rebord; côtés arqués, angles antérieurs arrondis, postérieurs droits à pointe obtuse. Ecusson grand, lisse, plan, triangulaire. Elytres plus larges à la base et 3 fois plus longues que le prothorax; finement rebordées en dehors, avec les épipleures pointillées, rétrécies et obsolètes bien avant l'extrémité; stries ponctuées, fortes, suturale enfoncée, 6 en dedans de l'épaule, 3 en dehors, et 1 marginale divisée en deux au dessous de l'épaule; interstries convexes postérieurement, fond pointillé. Pattes assez fortes, jambes ciliées, épineuses.

3. AGYRTEs PILOSUS Mots. Mosc. 1845. 51*. — Sibérie: fleuve Irtysh.

Plus grand que *castaneus*, d'un brun clair et couvert en dessus d'un poil grisâtre épars.

4. AGYRTEs FERRUGINEUS Solsky Turkest. 1. 1874. 220*. — Long. 3,2-4; larg. 1,5-2 mill. — Samarkand.

Oblong, peu convexe, subparallèle, glabre, luisant, en entier d'un ferrugineux de poix; yeux, tête et prothorax moins densément, finement ponctués; ce dernier transverse, peu arrondi sur les côtés, un peu rétréci en avant, avec les 4 angles obtus; points peu nombreux au milieu. Ecusson ponctué à la base. Elytres à peine plus larges que le prothorax, profondément striées-ponctuées; interstries presque plans, très finement et éparsement poin-

tillés, avec quelques points plus grands placés çà et là près des stries. — ♂ Plus petit, tête et prothorax d'ordinaire moins ponctués ; tarses antérieurs légèrement dilatés.

Très semblable au *castaneus* dans toutes ses parties, sauf la couleur, mais un peu plus petit et plus étroit, un peu moins convexe, il s'en distingue par la tête et le prothorax un peu plus densément ponctués, les angles postérieurs du prothorax à peine plus aigus.

5. AGYRTE (*Hadrambe*) LATISSIMUS Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 55^e. pl. 2. f. 11. — Long. 4 mill. — Grèce : Kumani.

Ovale très court, presque hémisphérique, jaune-rouge, luisant. Antennes grêles, les 5 derniers articles de plus en plus gros, formant une massue non abrupte, les 3-4 pénultièmes légèrement obscurs. Front grossièrement ponctué. Prothorax près de 2 fois aussi large que long, fortement rétréci par devant, bord antérieur échancré, bord postérieur légèrement sinué tout près des angles postérieurs, qui sont obtus arrondis et légèrement saillants, disque fortement ponctué. Ecusson triangulaire, lisse. Elytres grandement aussi larges que le prothorax à la base, en ovale très court, presque globuleuses, très convexes, fortement striées-ponctuées, toutes les stries plus profondes postérieurement et atteignant le bord postérieur ; interstries assez larges, lisses, seulement les externes ponctués près des bords externes ; médipectus à points forts et écartés, les segments du ventre plus densément ponctués et à la base réticulés alutacés. Tarses de 5 articles, simples. — Peut-être est-ce une ♀.

6. AGYRTE (*Hadrambe*) GLABER Payk. Fn. Suec. III. 335. 2. — Gyl. Ins. Suec. I. 208. 2. — Thoms. Skand. Col. IV. 22. — Long. 4,5 ; larg. 2,5 mill. — Suède, Laponie ; rare.

Ovale, convexe, roux-brun, luisant, partie antérieure élargie mais inclinée en avant, atténué peu à peu des épaules à l'extrémité. Antennes dépassant la base du prothorax, 1^{er} article court et épais, les suivants obconiques, 2^e et 4^e subégaux, bien plus courts que 3^e, les derniers à partir de 7 formant une forte et grande massue, grossissant peu à peu, 7-10 transverses, peu serrés, dernier

grand, pyriforme. Tête large, un peu convexe, lisse, avec quelques points à peine sensibles; yeux saillants arrondis; front séparé de l'épistome par une strie transverse, enfoncée, ce dernier biponctué-fovéolé. Prothorax court et très large, peu convexe, très éparsément pointillé, points distincts sur les bords latéraux, très finement rebordé; base droite, avec les angles largement arrondis et dépassant les élytres; bord apical un peu échancré droit au milieu, avec les angles largement arrondis; côtés amincis, arqués, ayant leur plus grande largeur près de la base. Ecusson ogival. Elytres 3 fois plus longues que le prothorax, rebordées d'un repli mince et d'une large gouttière, peu ponctuée; épipleures creusées, atténuées fortement et cessant de bonne heure, extrémité en pointe arrondie; stries fortes, ponctuées-crênelées, toutes les 9 complètes, séparées à l'extrémité comme à la base. Tarses antérieurs un peu dilatés, garnis de poils en dessous ♂.

XX — SPHÆRITES (σφαιρίτης, *sphérique*) Duft.

Fn. Austriaca i. 1805. 205.

Corps large, court, carré, assez convexe. Antennes de 11 articles, 1^{er} grand, épais, 2^e petit, 3^e plus long, les suivants très petits, massue brusque, ovale, compacte, de 3 articles. Tête ponctuée, yeux saillants, épistome rétréci, allongé; labre subtronqué; mandibules avancées, à pointe aiguë, munies en dedans d'une dent subapicale; dernier article des palpes ovalaire. Prothorax transverse, échancré au sommet, rebordé sur les côtés, sinué de chaque côté à la base. Ecusson presque en demi-cercle. Elytres courtes tronquées, abdomen de 5 segments, pygidium découvert. Hanches intermédiaires écartées par un mésosterne en carré transverse; jambes terminées par 2 pointes inégales, épineuses; tarses longs et grêles, de 5 articles, dernier muni de 2 crochets.

SPHÆRITES GLABRATUS F. Syst. El. i. 85. 9 (*Hister*). — Gyl. Ins. Suec. i. 241. 31 (*Nitidula*). — Fairm. Fn. Fr. 290. 1. — Sturm. Deuts. Ins. i. 264. pl. 20. — Long. 5-7; larg. 3-4 mill. — Suède, Allemagne, Alpes, Savoie, Jura, Alsace, Vosges; paraît vivre sous les écorces de bois mort, dans les excréments humains.

En carré oblong, convexe, vert noir métallique luisant.

Tête allongée, finement pointillée, yeux arrondis, saillants; épistome long, tronqué; labre court. Antennes courtes, ne dépassant qu'à peine le bord du prothorax; 1^{er} article renflé, 2^e ovoïde, 3^e obconique bien plus long, 4-7 noueux petits, 8^e mince un peu plus large, ferrugineux, massue noire, ovale, de 3 articles compacts. Prothorax fortement transverse, élevé en voûte sur le disque, avec les angles antérieurs abaissés, côtés finement ponctués, déprimés, rebordés et faiblement arqués; base arrondie au milieu, largement sinuée vers les angles, qui sont droits; bord apical largement échancré avec les angles obtus. Ecusson lisse, presque en demi-cercle. Elytres 2 fois plus longues et aussi larges que le prothorax, presque carrées, tronquées au bout avec l'angle sutural un peu saillant; angle huméral bien accusé, côtés bordés d'un mince repli; épipleures creusées en avant, atténuées postérieurement; 9 lignes de points fins et très serrés, assez régulières, obsolètes à l'extrémité. Pygidium à moitié découvert. Mésosternum raboteux, en carré transverse. Pattes assez longues, jambes étroites munies de 2 éperons, cannelées sur la tranche externe; tarsi très étroits et allongés.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES, ESPÈCES ET SYNONYMES
DE LA TRIBU DES SILPHIDES

	Pages		Page
<i>abdominalis</i> Rsh. Cat. 51. v ...	75	<i>armeniaca</i> Koln. Silph. 8 v	157
<i>Abeillei</i> Slc. Bathys. 33	37	<i>armipes</i> Kr. Col. 12	126
<i>abscissa</i> Laicht. Silph. 24	175	<i>asperula</i> Fairm. Bathysc. 60 ...	46
<i>acicularis</i> Kr. Cat. 13	73	<i>atrata</i> L. Silph. 4	150
<i>acuminata</i> Milr. Bathys. 2	28	<i>atrata</i> Herbst. Silph. 16	167
Adelops Telk. x	26	<i>atropurpurea</i> Stm. Silph. 8 v..	158
<i>adnexa</i> Schf. Bathysc. 88	55	<i>Aubei</i> Ksw. Bathys. 63	47
Adolus Fisch. xiv	139	<i>aurora</i> Mots. Necroph. 12	193
<i>affine</i> Friv. Phol. 5 v	17	<i>badius</i> Stm. Cat. 21	76
<i>affinis</i> Stm. Col. 9	124	<i>baicalica</i> Mots. Silph. 25	176
<i>agilis</i> F. Cat. 3	66	<i>Barnevillei</i> Slc. Bathys. 30	17
<i>agilis</i> Illig. Cat. 9	70	<i>Barnevillei</i> Kr. Col. 15 ^a v	129
<i>agilis</i> F. Cat. 56	98	<i>basalis</i> Fald. Necroph. 7 ^a	189
Agyrtes Fröhl. xix	193	<i>Bathyscia</i> Schdt. x	26
<i>aletina</i> Ab. Per. Bathys. 73	51	<i>Bedeli</i> Fairm. Catopsim 11	114
<i>alpicola</i> Kust. Silph. 6 v	153	<i>bicarinata</i> Gebl. Silph. 10 ^a ...	161
<i>alpina</i> Germ. Silph. 15 v	165	<i>bicolor</i> Kr. Catopsim 7	112
<i>alpinus</i> Gyl. Cat. 54	97	<i>bicolor</i> Cast. Agyr. 1	194
<i>altaica</i> Gebl. Silph. 5 ^a	152	<i>bidentatus</i> Sahl. Col. 1	118
<i>ambigua</i> Graëlls Silph. 15 v	165	<i>bimaculatus</i> Steph. Necroph. 1 v	185
<i>ambiguus</i> Heer Cat. 57	99	<i>blapsoides</i> Germ. Cat. 31	80
<i>amplicollis</i> Bandi Cat. 20	76	<i>Bonvouloiri</i> Schf. Bathys. 81 ..	53
<i>andalusicus</i> Heyd. Cat. 34	82	<i>Bonvouloiri</i> Duv. Bathys. 26 ...	36
<i>angularis</i> Er. Col. 7	123	<i>brevicollis</i> Ab. P. Bathys. 75 ..	51
<i>angustatus</i> Scht. Leptod. 2	7	<i>brevicollis</i> Kr. Cat. 59	100
<i>angustatus</i> F. Cat. 3	66	<i>brevicornis</i> Sahl. Col. 15	129
<i>angustatus</i> Kr. Cat. 3 v	67	<i>brunnea</i> Herbst. Silph. 4 v	150
<i>angusticolle</i> Hampe Phol. 3	17	<i>brunneum</i> Fisch. Pterol. 1	139
<i>angusticollis</i> Kr. Cat. 5	69	<i>brunneus</i> Stm. Cat. 25	79
<i>anisotomoides</i> Spence Cat. 68 ...	107	<i>brunneus</i> Spence Col. 21	135
Antrocharis Ab. P. II	9	<i>brunneus</i> De G. Necrod. 1 v ...	180
Aphaobius x	27	<i>Bugnoni</i> Tourn. Cat. 30	80
<i>appendiculata</i> Fuessl. Silph. 23	174	<i>byssina</i> Schiedt. Bathys. 3	18
<i>appendiculatus</i> Sahl. Col. 13 ...	127	<i>calcaratus</i> Er. Col. 14	128
<i>areana</i> Schf. Bathysc. 86	54	<i>californica</i> Manh. Silph. 20 ...	172
<i>arenarius</i> Hampe Catopsim 8 ...	113	<i>caliginosus</i> Steph. Cat. 41 v ...	89

	Pages		Pages
<i>cancellata</i> Gmel. Silph. 7.....	155	<i>curticornis</i> Fairm. Catopsim 17..	117
<i>canellinus</i> Fairm. Cat. 11.....	72	<i>curvipes</i> La Brul. Bathys. 52 ..	42
<i>cantabrica</i> Uhag. Bathys. 95 ...	59	<i>Cytodromus</i> Ab. P. iv.....	13
<i>carinata</i> Illig. Silph. 8	157	<i>dalmatina</i> Kust. Silph. 10 v ...	160
<i>casidea</i> Dahl. Silph. 4 v.....	150	<i>dalmatinus</i> Kr. Catopsim 2.....	112
<i>castaneus</i> Fröhl. Agr. 2.....	194	<i>Damryi</i> Ab. P. Bathys. 77.....	52
<i>castorina</i> Westw. Platyps. 1... ..	24	<i>dapsoides</i> Ab. P. Cytod. 1	14
<i>castoris</i> Ritz. Platyps. 1.....	24	<i>dauricus</i> Mots. Cat. 73	110
<i>Catopsimorphus</i> Aubé xii.....	111	<i>dauricus</i> Mots. Necroph. 8 v... ..	190
<i>Catops</i> Pkl. xi	62	<i>Delarouzei</i> Fairm. Bathys. 49..	41
<i>caucasicus</i> Mots. Lept. 2.	26	<i>Delarouzei</i> Tourn. Col. 25	137
<i>caudata</i> Ab. P. Antr. 4	11	<i>Dendroxena</i> Mots. xvi.....	146
<i>caudata</i> Say Silph. 20	171	<i>denticulatus</i> Kr. Col. 20.....	134
<i>caudatissima</i> Ab. P. Antr. 5... ..	12	<i>dentipes</i> Er. Col. 3	119
<i>celata</i> Hampe Bathysc. 10.. . . .	30	<i>dentipes</i> Sahl. Col. 15.....	128
<i>Chardoni</i> Ab. P. Bathys. 70	50	<i>depressa</i> Fairm. Bathys. 41	39
<i>Choleva</i> Latr. xi	62	<i>depressus</i> Mur. Cat. 35.....	83
<i>chrysoloides</i> Panz. Cat. 49.. . . .	93	<i>Destefanii</i> Rag. Bathys. 79	52
<i>Cisnerosi</i> Per. Arc. Bathys. 85. . . .	54	<i>Diecki</i> Slc. Bathys. 27.....	37
<i>cisteloides</i> Fröhl. Cat. 3 v... ..	68	<i>Discontignyi</i> Slc. Bathys. 29... ..	37
<i>clathratus</i> Perris Cat. 76.....	111	<i>dispar</i> Ab. P. Antr. 2.....	10
<i>clavata</i> Sley Bathys. 34.....	37	<i>dispar</i> Herbst. Silph. 24... ..	175
<i>claviger</i> Herbst. Col. 8.....	123	<i>dissimulator</i> Spence Cat. 44....	90
<i>clavipes</i> Sulz. Necrod. 1.	180	<i>Doderoi</i> Fairm. Bathys. 20.....	34
<i>collaris</i> Mots. Silph. 18 v	169	<i>Dohrni</i> Schf. Bathys. 81.....	53
<i>Colon</i> Herbst. xiii.....	117	<i>Doriæ</i> Fairm. Bathys. 24	35
<i>colonoides</i> Kr. Cat. 69	107	<i>dorothkana</i> Rtr. Bathys. 9.....	30
<i>complicata</i> Fourc. Silph. 19....	170	<i>dorsiger</i> Mars. Cat. 20	76
<i>confusus</i> Fairm. Col. 9.....	124	<i>Drimeotus</i> Milr. vi	17
<i>conjugens</i> Slc. Cat. 29	80	<i>Ehlersi</i> Dieck Spel. 1.....	20
<i>contusus</i> Bergst. Necrod. 1... ..	180	<i>Ehlersi</i> Ab. P. Bathys. 25.....	36
<i>coracinus</i> Keln. Cat. 42	89	<i>elongatus</i> Payk. Cat. 3	66
<i>corsica</i> Ab. Per. Bathys. 62... ..	47	<i>emarginatus</i> Rsh. Col. 18.....	132
<i>corsicus</i> Cast. Necroph. 7.....	189	<i>episternalis</i> Czwal. Col. 22.....	135
<i>costata</i> Mén. Silph. 11	162	<i>epuræoides</i> Fairm. Bathys. 65..	48
<i>costata</i> Brul. Silph. 27.....	178	<i>Erberi</i> Schf. Bathys. 10	30
<i>costatulus</i> Kr. Cat. 17.....	75	<i>Fairmairei</i> Delar. Catopsim 15..	116
<i>crassicornis</i> La Brul. Bathys. 56	44	<i>femoralis</i> Thoms. Cat. 40.....	87
<i>creticus</i> -Heyd. Cat. 71	109	<i>femoratus</i> Mulr. Necrod. 1.....	180
<i>cylindrata</i> Mén. Silph. 3.....	149	<i>ferrugata</i> Solsky Silph. 22 ^a	174
<i>cribratus</i> Slc. Cat. 27	80	<i>ferrugineus</i> Solsky Agr. iv....	195
<i>croatica</i> Milr. Bathys. 6.....	29	<i>festinans</i> Gyl. Cat. 36.....	84
<i>Crotchi</i> Sharp. Bathys. 84.....	54	<i>figurata</i> Brul. Silph. 27.....	178
<i>cuneiformis</i> Fairm. Cat. 8.....	70	<i>flicicornis</i> Uhag. Bathys. 93.....	57

Pages	Pages		
flavicornis Thoms. Cat. 39.....	87	Grouvellei Ab. Per. Bathys. 74	51
flaviobrigensis Uhag. Bathys. 91	55	Hecatæ Ab. P. Bathys. 61.....	46
fluctuosa Schf. Silph. 12 ^a	163	hermensis Ab. P. Bathys. 55..	44
formicetorum Peyr. Catopsim 15.	116	Heterotenna Wol. 6.....	177
Forstrœmi Gyl. Pterol. 1.....	139	hexastigma Sclsky Silph. 6 ^b	154
fossor Er. Necroph. 6.....	188	hirta Gmel. Silph. 5.....	151
Freyeri Milr. Bathys. 5.....	29	hispanica Kust. Silph. 13.....	164
frontalis Fisch. Necroph. 1 v..	184	Hoffmanni Mots. Bathys. 12...	32
fuliginosus Er. Cat. 41 v.....	88	Hohenwarthi Schmidt Leptod. 1.	6
fumatus Spence Cat. 58.....	99	humator F. Necroph. 3.....	185
fumatus Er. Cat. 56.....	98	humeralis Brul. Cat. 3 v.....	68
funereus Gené Necroph. 7.....	189	hungarica Rtr. Bathys. 16.....	33
fungicola Koln. Cat. 23.....	78	Hydrambe Thoms. xix.....	196
fusca Hbst. Silph. 4.....	150	incisipennis Sic. Catopsim 6...	112
fuscicornis Kr. Col. 17.....	131	inferna Dieck Bathys. 48.....	41
fuscipes Mén. Cat. 73.....	110	insignis Friv. Bathys. 17.....	33
fusculus Er. Col. 4.....	120	intermedius Kr. Cat. 3 v.....	67
fuscus Gyl. Cat. 9.....	70	interruptus Steph. Necroph. 6.	188
fuscus Panz. Cat. 36.....	84	interruptus Brul. Necroph. 5 v.	187
gallicus Duv. Necroph. 6.....	188	intricata Mén. Silph. 19.....	170
galloprovincialis Frm. Bathys. 59	46	investigator Zett. Necroph. 8..	190
georgicus Weise Catopsim 9...	113	investigator Gebl. Necroph. 9..	191
germanicus L. Necroph. 1.....	184	italica Kust. Silph. 8 v.....	157
Gestrol Fourc. Bathys. 76.....	52	Josephinæ Sic. Catopsim 12....	115
gibba Brul. Silph. 2 v.....	148	judæus Sicy Catopsim 3.....	112
gibbosus Fourc. Necrod. 1.....	180	Kerimi Fairm. Bathys. 11 ^a	31
glaber Payk. Agr. 6.....	196	kerkyrana Rtr. Bathys. 19.....	34
glabratus F. Sphær. 1.....	197	Khevenhulleri Milr. Bathys. 7..	29
globosa Milr. Bathys. 4.....	29	Kiesenwetteri Dieck. Bathys. 80	53
Golovatschovi Lind. Silph. 18..	169	Kirbyi Spence Cat. 52.....	96
gracile Friv. Phol. 4.....	17	Kovacs Milr. Drim. 1.....	18
gracilis Kr. Cat. 15.....	74	Kraatzl Friv. Drim. 2.....	18
græcus Kr. Cat. 16.....	75	Kraatzl Rtr. Cat. 48....	93
grandicollis Er. Cat. 47.....	92	Kraatzl Tourn. Col. 4. v.....	120
grandicollis Mur. Cat. 49 v....	94	lævigata F. Silph. 2.....	148
grandis Fairm. Bathys. 41.....	39	languidus Er. Col. 2.....	119
grandis Rtr. Cat. 33.....	82	lapidicola Sic. Bathys. 47.....	41
granigera Chev. Silph. 20.....	171	lapponica Herbst. Silph. 20....	172
granulata Msh. Silph. 7.....	155	Larcennei Ab. P. Bathys. 45...	39
granulata Ol. Silph. 14.....	164	latericarinata Mots. Silph. 22..	173
Gravenhorsti Schil. Pterol. 1..	139	lateritius Mén. Cat. 12.....	72
Grenieri Sic. Bathys. 43.....	39	latissimus Rtr. Agr. 5...	196
griesbachiana Steph. Silph. 8..	157	latus Kr. Col. 24.....	137
griseus Czwal. Col. 11.....	125	Leachi Spence Cat. 51.....	95

	Pages		Pages
Lederi Weise Cat. 24.....	78	myrmecobius Roth. Catopsis 16.	117
Leptinus Mulr. ix.....	25	nanus Er. Col. 14 v.....	128
leptoderum Friv. Phol. 2.....	16	narentina Milr. Bathysc. 8.....	30
Leptoderus Schm. 1.....	6	Necrodes Wilkin xvii.....	179
Lesinæ Rtr. Bathysc. 16.....	32	Necrophilus Latr. xv.....	140
Levallanti Muls. Silph. 21.....	172	Necrophorus F. xviii.....	181
Linderi Ab. Per. Bathys 71....	50	nigerrimus Kr. Necroph. 3 ^b	186
listerianus Fourc. Necroph. 1..	184	neglectus Kr. Cat. 53.....	96
littoralis Bergst. Silph. 16....	167	nigricans Spence Cat. 41.....	88
littoralis L. Necrod. 1.....	180	nigricornis Fald. Necroph. 10..	192
lividus F. Necrod. 1 v.....	180	nigrita Stm. Cat. 51.....	95
longicornis Slc. Bathys. 31....	37	nigrita Creutz. Silph. 15.....	165
longipennis Chd. Cat. 41 v.....	88	nigrita Mur. Cat. 49 v.....	94
longulus Keln. Cat. 50.....	94	nigrita Er. Cat. 46.....	91
lucidula Delar. Bathys. 58.....	45	nitidicollis Kr. Cat. 43.....	90
lucidus Kr. Cat. 61.....	101	nivalis Kr. Cat. 4.....	68
lunatus Fisch. Necroph. 4 ^a	187	nivicola Ksw. Cat. 60.....	101
marginalis Kugel. Silph. 8.....	157	norwegicus Sparre Cat. 7.....	70
margintollis Luc. Cat. 72.....	109	notaticollis Bandi Cat. 19.....	76
Marqueti Fairm. Catopsis 10...	114	novemfontium La Brul. Bath. 50	41
Mayeti Ab. Per. Bathys. 72....	50	nuda Mots. Silph. 5 ^b	152
Mazarredoi Uhag. Bathys. 92..	56	oblongus Latr. Cat. 3.....	66
Menetriesi Fald. Cat. 37.....	85	obrutor Er. Necroph. 9.....	191
Merkli Friv. Phol. 5.....	17	obscura L. Silph. 16.....	167
meridionalis Duv. Bathys. 42..	39	Otceoptoma Leach. xvi.....	151
meridionalis Aubé Cat. 32.....	81	opaca Pkl. Silph. 8.....	157
Mestrei Ab. P. Antr. 3.....	10	opaca L. Silph. 5.....	151
mialetensis Ab. P. Bathys 78.	52	opaca Schrank Silph. 23.....	174
Michoni Slc. Catopsis 5.....	112	orchesioides Fairm. Cat. 10....	71
microcephalus Thoms. Nocr. 8 v	190	orientalis Aubé Catopsis 1.....	111
microps Czwal. Col. 6.....	122	orientalis Mots. Necroph. 3 ^a ...	185
Milleri Scht. Bath. 1.....	27	orientalis Brul. Silph. 12....	162
mongolica Fld. Silph. 9 v.....	159	Oryotus Milr. iii.....	12
montana Schiced. Bathys. 12...	32	ovata Ksw. Bathys. 46.....	40
montivagus Heer Cat. 51 v.....	96	oviformis La Brul. Bathys. 57..	45
morio F. Cat. 44 v.....	90	ovoidea Fairm. Bathys. 64. ...	47
morio Gebl. Necroph. 2.....	185	pallidum Esch. Pterol. 2.....	140
morio Payk. Cat. 46.....	91	pallidus Mén. Cat. 37.....	85
mortuorum F. Necroph. 11....	192	Pandellei Ab. P. Bathys. 53...	43
multipunctata Friv. Silph. 12..	162	paramariboa Herbst. Silph. 19.	170
murinus Kr. Col. 19.....	133	particeps Fisch. Necroph. 4 ^a v.	187
muscorum Dieck Bathys. 24....	36	Paveli Friv. Bathys. 18.....	33
Mylæchus Latr. xiii.....	117	pedemontana F. Silph. 4 v.....	150
myops Czwal. Col. 5.....	121	Pelopis Rtr. Cat. 64..	103

	Pages		Pages
Perezii Sharp. Bathys. 87. f.	54	<i>rotundicollis</i> Mur. Col. 49 v. ...	94
perforata Gebl. Silph. 9.	159	<i>rotundicollis</i> Keln. Cat. 52.	96
Perieri La Brul. Bathys. 51.	42	Rougeti Slc. Catopsim 13.	116
persica Ab. P. Bathys. 39.	38	<i>rufescens</i> Illig. Cat. 3.	66
Peyroni Ab. P. Bathys. 38.	38	<i>rufescens</i> F. Cat. 36.	84
Pholeuon Hamp. v.	15	<i>rufescens</i> Kr. Col. 23.	136
Phosphuga Leach. xvi.	148	<i>rusticornis</i> Kust. Silph. 19 v. ...	170
<i>picipes</i> Kngl. Cat. 66.	105	<i>rustipennis</i> Luc. Catopsim 14. ...	116
<i>picipes</i> F. Cat. 31.	80	<i>rustipes</i> Czwal Col. 16.	130
<i>picipes</i> Mots. Necrophil. 2.	141	<i>rusoclavatus</i> De G. Necrod. 1. .	180
<i>picticollis</i> Slc. Cat. 20.	76	<i>rufus</i> Kr. Cat. 37.	83
<i>pilicornis</i> Thoms. Cat. 50.	94	<i>rugosa</i> Sharp Bathys. 89.	55
<i>pilosus</i> Mots. Agyr. 3.	195	<i>rugosa</i> Panz. Silph. 7.	155
<i>pilosus</i> Muls. Catopsim 8.	113	<i>rugosa</i> L. Silph. 19.	170
Piochardi Ab. P. Bathys. 52. .	46	<i>ruspator</i> Er. Necroph. 8.	190
Platypssylla Ritz. viii.	20	samaritanus Slc. Catopsim 4. ...	112
Pluto Rtr. Phol. 1.	15	sarteanensis Bargl. Bathys. 23. .	36
<i>polita</i> Sulz. Silph. 2.	148	Saulcyi Ab. P. Bathys. 32.	37
<i>præcox</i> Èr. Cat. 22.	77	<i>scabra</i> Fourc. Silph. 23.	174
<i>præustus</i> Kr. Cat. 62.	102	<i>scabra</i> Scopl. 'Silph. 19.	170
Proserpinæ Ab. P. Bathys. 40. .	38	Schiœdtei Ksw. Bathys. 41. . .	39
<i>pruinosa</i> Schf. Bathys. 8.	30	Schmidti Milr. Oryot. 1.	13
Pteroloma Gyl. xiv.	139	<i>Schmidti</i> Mts. Leptod. 1 v.	7
Ptomaphagus Helv. xi.	80	<i>scitulus</i> Er. Cat. 58.	99
<i>pubescens</i> Luc. Col. 10.	125	<i>sculptipennis</i> Fald. Silph. 9 ^a	160
<i>pubescens</i> Kr. Col. 17.	131	Seeboldi Uhag. Bathys. 94.	58
<i>punctata</i> Herbst. Silph. 4.	150	<i>sepulchralis</i> Heer Necroph. 5 ^a . .	188
<i>punctatus</i> Bris. Cat. 2.	66	<i>sepultor</i> Gyl. Necroph. 5.	187
<i>puncticollis</i> Kr. Col. 3.	119	<i>sepultor</i> Charp. Necroph. 9. ...	191
<i>puncticollis</i> Luc. Silph. 13.	164	<i>sericatus</i> Chd. Cat. 66 v.	105
<i>pusilla</i> Mots. Bathys. 98.	81	<i>sericeus</i> Scht. Leptod. 3.	8
<i>pusillus</i> Mots. Cat. 74.	110	<i>sericeus</i> Payk. Cat. 36.	84
<i>pygmaeus</i> Er. Col. 14.	128	<i>sericeus</i> F. Cat. 66.	105
<i>pyrenæa</i> Lespès Bathys. 28.	37	<i>sericea</i> Zubk. Silph. 6 ^a	154
<i>quadraticollis</i> Aubé Cat. 45. . .	91	<i>sericeus</i> Gyl. Cat. 44.	90
<i>4-maculata</i> Saml. Silph. 1.	147	<i>serripes</i> Sahl. Col. 4.	120
<i>4-punctata</i> L. Silph. 1.	147	<i>6-carinata</i> Mots. Silph. 1 v. ...	148
<i>4-punctulata</i> Mulr. Silph. 1. ...	147	<i>sibirica</i> Gebl. Silph. 21.	172
<i>Quæsticulus</i> Schf. x.	55	<i>sibirica</i> Gebl. Silph. 22 ^b	172
<i>Quæstus</i> Schf. x.	53-54	<i>sibiricus</i> Mots. Necroph. 9 v. .	191
<i>Querilbaei</i> Lesp. Antr. 1.	10	Silpha L. xvi.	142
<i>recta</i> Marsh. Silph. 8.	157	Silpha L. 4.	156
<i>rectangulus</i> Chd. Col. 7 v.	123	<i>silphoides</i> Marsh. Cat. 66.	103
<i>reticulata</i> F. Silph. 7.	155	<i>simile</i> Friv. Phol. 5 v.	17

	Pages		Pages
Simoni Ab. P. Bathys. 67.....	48	triangulum Sharp. Bathys. 62...	53
<i>simplex</i> Thoms. Col. 4.....	120	<i>trilineata</i> L. Silph. 8.....	157
<i>simplicicornis</i> Brul. Silph. 26..	178	<i>trimaculatus</i> Gredl. Necroph. 5 v	187
<i>simplicipes</i> Heer Necrod. 1....	180	<i>tristis</i> Gyl. Cat. 46.....	91
<i>sinuata</i> F. Silph. 23.....	174	<i>tristis</i> Mur. Cat. 49 v.....	94
<i>sinuatus</i> Chd. Col. 26.....	138	<i>tristis</i> Illig. Silph. 10.....	160
<i>soror</i> Newm. Cat. 41 v.....	89	<i>tristis</i> Panz. Cat. 51.....	95
<i>Souverbii</i> Fairm. Silph. 6.....	153	<i>troglydites</i> Schicdte Leptod. 1.	6
<i>spadicens</i> Stm. Catops. 1.....	66	<i>tropica</i> Ab. P. Bathys. 96.....	60
<i>Spagnoloi</i> Fairm. Bathys. 22...	35	<i>truncatus</i> Illig. Cat. 66.....	105
<i>Sphaerites</i> Duft. xx.....	197	<i>tuberculata</i> Luc. Silph. 19.....	170
<i>speciosus</i> Schultz Necroph. 1....	184	<i>tuberculata</i> Germ. Silph. 20...	171
<i>Spelaeochlamys</i> Dieck vii.....	19	<i>turcica</i> Kust. Silph. 12.....	162
<i>speluncarum</i> Delar. Bathys. 37.	37	<i>tarkestanica</i> Ball. Silph. 7 ^a	156
<i>spinipes</i> Panz. Agr. 2.....	196	<i>tyrolensis</i> Laicht. Silph. 8.....	157
<i>spinipes</i> Halid. Col. 15.....	128	<i>tyrolensis</i> Laicht. Silph. 15....	163
<i>Stagobius</i> Schicd. 1.....	6	Uhagoni Sharp Bathys. 90.....	55
<i>striatus</i> Duft. Cat. 31.....	80	umbrinus Er. Cat. 38.....	87
<i>strigosus</i> Kr. Cat. 14.....	73	undata Mulr. Silph. 7.....	155
<i>striola</i> Mén. Silph. 17.....	168	<i>unicostata</i> Cast. Silph. 23 v....	174
<i>Sturmi</i> Bris. Cat. 6.....	70	<i>validus</i> Kr. Cat. 63.....	103
<i>stygia</i> Dieck Bathys. 35.....	37	Vandalitiæ Heyd. Cat. 70....	108
<i>subalpina</i> Fairm. Bathysc. 66..	41	<i>varicornis</i> Rosh. Cat. 65.....	104
<i>subasperata</i> Slc. Bathys. 44....	39	<i>variolosa</i> Herbst. Silph. 14.....	164
<i>subcostatus</i> Reiche Cat. 28....	80	<i>vasconica</i> La Brûl. Bathys. 83..	53
<i>subcurvipes</i> Ab. P. Bathys. 52 v	43	<i>velox</i> Spence Cat. 18.....	75
<i>subdepressus</i> Chd. Col. 28....	138	<i>ventricosus</i> Weise Cat. 55.....	98
<i>subfuscus</i> Koln. Cat. 54.....	97	<i>verrucosa</i> Mén. Silph. 7 v.....	156
<i>subrectipes</i> Ab. P. Bathys. 52 v	43	<i>vestita</i> Kust. Silph. 19 v.....	170
<i>subrotunda</i> Steph. Silph. 4 v....	150	<i>vespertinus</i> Frœhl. Agr. 2....	195
<i>sulcipennis</i> Fairm. Cat. 26....	79	<i>vespillo</i> L. Necroph. 4.....	186
<i>subterraneus</i> Dahl. Necrophil. 1.	141	<i>vespilloides</i> Herbst. Necroph. 11	192
<i>suturalis</i> Mots. Necroph. 9 v...	191	<i>vestigator</i> Hersch. Necroph. 5..	187
<i>sylvestris</i> Mots. Bathys. 14....	32	<i>viennensis</i> Herbst. Col. 2.....	118
<i>Tarissani</i> Bed. Bathys. 68.....	49	Villardi Bed. Bathys. 69.....	49
<i>tarsalis</i> Ksw. Bathys. 11.....	31	<i>villosa</i> Naezen Silph. 5.....	151
<i>tenuicornis</i> Brul. Silph. 26....	178	<i>villosus</i> Latr. Cat. 66.....	105
<i>tenuicornis</i> Rosh. Cat. 67.....	106	<i>vulgaris</i> Preyss. Necroph. 4...	186
<i>terminata</i> Hum. Silph. 21.....	172	<i>Watsoni</i> Spence Cat. 56.....	98
<i>testaceus</i> Mulr. Lept. 1.....	25	<i>Wilkini</i> Spence Cat. 22.....	77
<i>testaceus</i> Latr. Cat. 9.....	70	Wollastoni Jans. Bathys. 97...	61
<i>Thanatophilus</i> Leach. 5.....	168	<i>Xylodrepa</i> Thoms. xv. 1.....	146
<i>thoracica</i> L. Silph. 18.....	169	<i>Zebei</i> Kr. Col. 15 ^a	129
<i>tomentosa</i> Herbst. Silph. 5....	151	<i>zophosina</i> Slc. Bathys. 36.....	37

NOUVEAU RÉPERTOIRE

CONTENANT LES DESCRIPTIONS DES ESPÈCES DE

COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN-MONDE

publiées isolément ou en langues étrangères
en dehors des Monographies ou Traités spéciaux et de l'ABEILLE

VI. — CLAVICORNES

ANISOTOMIDÆ

1. — *Triarthron* Mærkl.

1. TRIARTHRON MÆRKELI Schmidt Ent. Zeit. 1840. 142. — Germ. Zeits. III. 200. 1. — Er. Deuts. Ins. III. 45*. 1. — Long. 3,3 mill. — Allemagne, Thuringe, Autriche.

Un peu plus grand que *Anisotoma rubiginosa*, convexe, jaune-rougeâtre luisant. Front finement ponctué. Prothorax presque de la largeur des élytres, de moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, un peu rétréci par devant, particulièrement ♀, angles postérieurs arrondis, dessus finement ponctué. Ecusson avec quelques points. Elytres marquées de 9 stries à points forts, dont la suturale est enfoncée dans toute sa longueur, les autres obsolètes vers l'extrémité, la plus rapprochée du bord externe indistincte et confondue dans toute sa longueur; interstries lisses, seulement l'un distinct des autres par des points qui, à la suture, sont plus serrés. — ♂ Tête considérablement grande, l'épistome enfoncé, limité par une ligne élevée en arc; tarsi antérieurs légèrement dilatés, cuisses postérieures comprimées, bord inférieur à la base avec une échancrure arquée, puis au milieu formant une saillie arrondie, garnie sur les bords de dents épineuses, formant de nouveau au bout une saillie. ♀ Tête assez petite, épistome formant une même surface avec le front, et séparée par une ligne arquée, cuisses antérieures et postérieures simples.

2. — *Hydnobius* Schmidt.

2. HYDNOBIUS CILIARIS Thoms. Op. 545*. 1. — Long. 3,5 mill. — Suède, Christiania.

On dirait l'*Anisotoma furva*. — Ovale, ferrugineux. Tête brun de poix, front assez fortement ponctué. Antennes assez courtes, ferrugineuses, massue noire; dernier article pas plus étroit que le pénultième, qui est transverse, 2^e subégal au 3^e. Prothorax peu plus étroit que les élytres à la base, subtronqué au sommet, rebordé, côtés dilatés un peu en angles tout de suite après le milieu; tronqué à la base, avec les angles moins obtus; assez convexe transversalement sur le disque, surtout en avant, à peine longitudinalement, ferrugineux, assez densément, plus fortement ponctué. Ecusson ponctué, lisse à la pointe. Elytres ovales, près de 3 fois plus longues que le prothorax, ferrugineuses, moins convexes sur le dos, déclives sur les côtés et à l'extrémité, marge latérale garnie de cils courts très fins et très serrés; fortement striées-ponctuées, interstries marqués de points également profonds; strie suturale moins écartée postérieurement, atteignant presque la base. Dessous du corps ferrugineux, poitrine obscure. Pattes d'un testacé ferrugineux, jambes antérieures assez dilatées, crénelées-denticulées sur le bord; cuisses postérieures largement ovales, bord inférieur subanguleusement dilaté aussitôt après le milieu, ensuite rétréci plus vers le bout que vers la base; jambes postérieures subcomprimées, légèrement courbées.

3. HYDNOBIUS SEPTENTRIONALIS Thoms. Op. 546*. 3. — Laponie.

Testacé, prothorax à angles postérieurs arrondis; élytres fortement ponctuées et striées-ponctuées, interstries non strigieux transversalement. — Ressemble beaucoup au *multistriatus* par sa taille, sa stature et sa coloration, mais certainement distinct par son prothorax à angles postérieurs entièrement arrondis; ♂ par ses cuisses postérieures à dent encore plus forte, les intermédiaires dilatées en dessous en angles obtus au tiers postérieur. — ♂ Cuisses postérieures armées d'une forte dent recourbée, intermédiaires tronquées en dessous obliquement au bout.

4. HYDNOBIUS SPINIPES Gyl. Ins. Suec. III. 1813. 716*. 9-10.—Thms. Skand. Col. IV. 29*. 2. Op. 547*. 4. — *spinula* Zett. Ins. Lap. 156. 8. — Long. 1,3-1,5 mill. — Suède : Westrogothie ; Laponie.

Oblong, brun, luisant, antennes à massue noir-brun ; prothorax ponctué densément, plus finement, plus densément mais pas plus profondément sur les côtés, à peine sinué de chaque côté à la base ; élytres plus finement striées-ponctuées, interstries marqués de strigosités transverses obliques, de points plus petits très serrés, disposés en séries assez régulières. — ♂ Cuisses postérieures armées en dessous avant l'extrémité d'une dent spiniforme ; ♀ pattes postérieures simples. — Voisin du *septentrionalis* par les angles postérieurs du prothorax arrondis, mais distinct par son corps un peu plus étroit, subovale, à peine rétréci postérieurement, le disque du prothorax et la tête parfois d'un noir de poix, celle-ci avec le front moins convexe, celui-là moins ample, par les élytres moins fortement striées-ponctuées, les interstries obliquement strigieux, à points subsériés plus obsolètes, la dent des cuisses postérieures ♂ moins robuste, mais un peu recourbée à la pointe.

5. HYDNOBIUS INTERMEDIUS Thoms. Op. 548*. 5. — Long. 1,2 mill. — Avec *spinipes*.

Testacé, angles postérieurs du prothorax arrondis, élytres subovales, striées-ponctuées, interstries substri-gueux, pointillés. — Ressemble beaucoup au *spinipes* ; il s'en distingue seulement par son corps un peu plus petit, plus subovale, le disque du prothorax presque lisse, la massue des antennes moins large. — ♂ Cuisses postérieures armées en dessous d'une petite dent sub-triangulaire au tiers postérieur.

6. HYDNOBIUS ANDALUSICUS Dieck Span. Ent. Reis. 1870. 102*. 82. — Long. 1,6 mill. — Espagne : Algésiras.

Elliptique, assez légèrement convexe, jaune-rougeâtre, avec la tête et le prothorax à peine plus foncés, luisant. Antennes jaune-rouge, avec la massue plus foncée ; front légèrement convexe, et parsemé de points à peine visibles. Prothorax très luisant, très finement ponctué, rétréci fortement par devant, mais peu à peu, brusquement

par derrière près des angles postérieurs, qui sont très obtus. Ecusson à points fins, distincts, épars. Elytres marquées chacune de 7 stries ponctuées régulières, sans compter la suturale et la marginale, 6° à points à peine distinctement plus profonds; interstries presque polis, sans rides ou strigosités transverses; strie suturale à peine marquée en avant par quelques points, mais profondément enfoncée par derrière, de sorte que là la suture est élevée, tandis qu'elle est un peu enfoncée sur le dos et à la base. Une strie distinctement enfoncée dans toute son étendue se voit au devant du bord latéral. — Cette espèce est très voisine du *strigosus* Schmidt, mais elle s'en distingue aisément par les interstries plans, paraissant, sous un jour oblique, strigieux transversalement.

7. HYDNOBIUS PUNCTULATUS Hampe Wien. Ent. Monat. v. 1861. 66°. 3. — Long. 2,3 mill. — Croatie : Agra.

Plus petit et plus étroit que *punctatissimus*, rouge-brun-clair, luisant. Les 1^{ers} articles des antennes rouge-brun, massue jaune-rougeâtre. Tête assez grande, convexe, avec quelques points très fins. Yeux noirs. Prothorax presque aussi large que les élytres, arrondi sur les côtés, un peu rétréci par devant, angles postérieurs arrondis, dessus assez convexe transversalement, à points fins et épars. Ecusson avec quelques points fins. Elytres densément et finement striées-ponctuées, stries elles-mêmes indistinctes, interstries plans, avec des rangées de points qui se distinguent à peine de ceux des stries, marqués de fines strigosités transverses; strie suturale écartée, profondément enfoncée par derrière. Pattes jaune-ferrugineux. — ♂ Cuisses postérieures largement comprimées, avec une dent obtuse en vrille, au bout. ♀ Simples. — Se distingue du *punctatissimus* particulièrement par sa taille moindre, sa forme plus étroite, par la ponctuation du prothorax plus fine et plus écartée, la ponctuation des élytres bien plus fine, les stries plus indistinctes, et par la dent obtuse des cuisses postérieures ♂.

8. HYDNOBIUS MULTISTRIATUS Gyl. Ins. Suec. III. 1813. 708*. 9-10 (*Anisotoma*). — Thoms. Op. 546*. 2. — Long. 2,8 mill. — Suède : Scanie.

Ovale-oblong. Tête transverse, convexe, d'un ferrugi-

neux foncé, presque marron roux, luisante, très finement et moins densément pointillée, bouche plus pâle, mandibules fortes, arquées, brunes au bout; yeux subdéprimés, noir-brun. Antennes plus courtes que la tête et le prothorax, assez épaisses, d'un ferrugineux foncé, massue de 5 articles, les 3 derniers grands, d'un noir ferrugineux. Prothorax court, transverse, un peu plus étroit en devant, où il est largement et peu profondément échancré, un peu arrondi sur les côtés et par derrière, finement et moins densément pointillé. Ecusson en triangle court, ferrugineux luisant, finement pointillé. Elytres à peine plus larges que la base du prothorax, près de 4 fois plus longues que lui, atténuées par derrière, convexes en dessus, d'un roux ferrugineux plus clair, luisantes, très densément sèriées-punctuées, stries à peine visibles, mais séries alternes à points un peu plus profonds et plus rapprochés que ceux des interstries, stries moins régulières vers l'épaule. Dessous du corps d'un roux testacé plus clair, luisant, à peine pointillé, poitrine plus foncée. Pattes médiocres, d'un testacé pâle, cuisses comprimées, jambes ciliées épineuses, postérieures peu arquées. — Bien distinct par son corps subovale, son prothorax ample, à angles postérieurs non arrondis, par sa tête grande, ses élytres moins régulièrement striées-punctuées, ses interstries fortement subsérialement punctués, sans strigosités transverses. — ♂ Cuisses postérieures armées en dessous d'une dent forte, subrecourbée.

3. — *Anisotoma* Illig.

9. ANISOTOMA OBLONGA Er. Deuts. Ins. 1845. III. 53*. — *ferruginea* Illig. Käf. Prus. 75. 3. — Long. 2,6 mill. — Allemagne.

Taille presque des plus petits *cinnamomea*, mais elliptique allongé. Antennes un peu plus courtes, presque de la même forme, massue de la couleur du corps. Prothorax tronqué à la base, rétréci en devant, densément punctué, moins fortement arrondi sur les côtés, puisqu'il ne se rétrécit pas par derrière, d'où les angles postérieurs sont moins obtus et presque droits; angles antérieurs au contraire un peu plus obtus. Elytres proportionnellement un peu plus larges et plus arrondies sur les côtés, plus forte-

ment striées-punctuées, interstries peu densément pointillés. — ♀ Cuisses postérieures avec la pointe entièrement arrondie en dessous, non saillante. ♂ Se reconnaît encore plus aisément du *cinnamomea*.

10. ANISOTOMA BAICALENSIS Rye Ent. Monthl. Mag. xiii. 1875. 151*.
— Long. 3,3 mill. — Sibérie S.-E. : lac Baïcal. — Un seul ex. ♀.

Ovale-oblong, médiocrement convexe, ferrugineux ; massue des antennes grande, concolore, dernier article plus étroit que les précédents. Prothorax à peine transverse, tronqué à la base, rétréci en avant, non arrondi sur les côtés, densément et fortement ponctué. Elytres striées-punctuées, interstries marqués vaguement de fines strigosités transverses. Jambes antérieures linéaires. — On peut dire en quelques mots que c'est un équivalent de *rugosa*, dans la section à jambes antérieures linéaires. En dehors de ce caractère des jambes, il diffère de *rugosa* par sa taille un peu plus petite et sa forme plus oblongue, sa massue unicolore, son prothorax plus long et plus fortement ponctué, dont les côtés ne sont pas dilatés mais rétrécis presque en ligne droite de la base au sommet (angles postérieurs presque droits quoique à pointe obtuse), par les points des stries des élytres pas tout aussi étroitement serrés, et les strigosités transverses des interstries pas si serrées, la surface étant plus luisante. Il se reconnaît tout de suite d'*hybrida* par sa forme plus courte, plus aplatie, sa couleur plus claire, son prothorax plus fortement ponctué, ses stries plus grosses, etc.

11. ANISOTOMA MACROPUS Rye Ent. Monthl. Mag. x. 1873. 133*.—
Long. 2,3 - 3,5 mill. — Angleterre, France.

Ovale-oblong, assez convexe, ferrugineux, antennes assez courtes, massue à peine rembrunie, dernier article distinctement plus étroit que le précédent. Prothorax densément ponctué, côtés doucement et régulièrement arrondis, base subsinuée de chaque côté, presque tronquée, angles postérieurs obtus, antérieurs arrondis. Elytres fortement striées-punctuées, interstries médiocrement et très finement pointillés, côtés presque droits dans leur moitié basale, ensuite atténuées en courbe vers l'ex-

trémité; jambes antérieures linéaires, cuisses postérieures grossièrement ponctuées en dessous. — ♂ Tarses antérieurs et intermédiaires légèrement dilatés, pattes postérieures allongées, cuisses subdilatées anguleusement en dessous avant le milieu, angle externe arrondi, non saillant, interne arrondi denticulé, jambes médiocrement courbées au bout, article basal des tarses allongé. — ♀ Pattes simples, cuisses postérieures à extrémité arrondie en dehors, arrondie saillante en dedans. — Diffère du *calcarata*, dont il a le faciès, les jambes antérieures linéaires et le dernier article des antennes petit, par sa couleur toujours d'un ferrugineux clair uniforme, sa forme un peu plus longue avec ses antennes plus courtes, son prothorax plus arrondi sur les côtés, un peu plus fortement ponctué, avec les angles antérieurs plus arrondis, les postérieurs un peu plus marqués, la base à peine subsinuée sur les côtés, les élytres pas si acuminées par derrière, avec les stries à points plus grands, et la structure des pattes postérieures ♂ dissemblable ♀.

12. ANISOTOMA RHÆTICA Er. Deuts. Ins. III. 1845. 57*. — Long. 2,8 mill. — Tyrol.

Ovale-oblong, taille du *Triepki*, convexe, rouge-jaune-brunâtre en dessus, tête et prothorax un peu plus foncés. Antennes à peine de moitié plus longues que la tête, rouge-brun, massue plus brun-foncé, 3^e article de moitié plus long que le 2^e, les 3 derniers d'égale largeur. Tête densément ponctuée, front médiocrement convexe. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci par devant, bord antérieur légèrement échancré, bord postérieur très légèrement sinué près de chaque angle; angles postérieurs obtus et un peu arrondis; dessus densément ponctué. Ecusson densément ponctué. Elytres fortement striées-ponctuées, strie suturale sulciforme vers le bout, interstries unis, à points fins et écartés, alternes marqués d'une rangée de plus grands points écartés. Dessous brun-noirâtre. Pattes jaune-clair. — ♂ 2-4 articles des 4 tarses antérieurs légèrement dilatés, garnis en dessous de brosses de poils; pattes postérieures allongées; trochanters prolongés en un denticule aigu; cuisses com-

primées, arête inférieure droite, angles externe du genou arrondi, interne en forme de denticulé aigu, qui cependant est couvert par l'externe. Jambes allongées, courbées dans toute leur longueur, mais plus fortement vers l'extrémité. www.libtool.com.cn

13. ANISOTOMA OBESA Schmidt Germ. Zeits. III. 150. 3. — Er. Deuts. Ins. III. 59. 7*. — ♀ *armata* Pkl. Fn. Suec. I. 72 (*Sphaeridium*). — *ferruginea* Gyl. Ins. Suec. III. 564. — Long. 3,6 mill. — Allemagne; rare.

Ovale court, convexe, brun-rouge, luisant. Antennes assez longues, 3^e article particulièrement allongé, 2 fois aussi long que le 2^e, massue petite par rapport aux autres articles, le 1^{er} de ses articles plus étroit que les 3 derniers, ceux-ci de même épaisseur, dernier en pointe conique tronquée. Tête finement et pas très densément ponctuée, front marqué de 4 points plus grands. Prothorax grandement de la largeur des élytres, légèrement arrondi sur les côtés, de sorte qu'il est rétréci tout-à-fait par devant et non par derrière; bord antérieur largement échancré pour la réception de la tête, par les angles antérieurs obtus, un peu saillants, bord postérieur droit, avec les angles presque droits, quoique un peu arrondis; surface fort convexe transversalement, assez densément et finement ponctuée. Ecusson finement ponctué. Elytres pas tout-à-fait aussi longues que le prothorax, très légèrement arrondies sur les côtés, en ovale pointu par derrière, convexes, striées-ponctuées, strie suturale sulciforme après le milieu, interstries plans, à points écartés et très fins, parfois à peine visibles, alternes marqués de plus gros points écartés. Pattes d'un rouge-jaunâtre clair. — ♂ 3 articles intermédiaires des tarsi antérieurs un peu élargis, longuement pubescents en dessous; pattes postérieures un peu allongées; cuisses comprimées, indistinctement dentelées en dessous vers l'extrémité, simples du reste, se terminant en dehors et en dedans par une petite dent arrondie peu saillante; jambes présentant au-dessus du milieu une légère courbure, et du milieu à l'extrémité un arc léger. — ♀ Tarsi simples, pattes postérieures non allongées, cuisses arrondies au bout et jambes très faiblement arquées. — Très voisin de *picea*,

il en diffère, en outre de la couleur, par la forme des jambes postérieures ♂, les angles postérieurs du prothorax presque droits et la forme des antennes; — de *dubia*, qui a les jambes postérieures ♂ plus en rapport, par son prothorax large, distinctement échancré par devant, non rétréci par derrière, moins densément et fortement ponctué, avec les angles postérieurs presque droits et surtout par le corps plus large.

14. ANISOTOMA BRUNNEA Sturm Deuts. Ins. n. 40. 7. pl. 24. f. d.
 — Schmidt Germ. Zeits. III. 179. 22. — Er. Deuts. Ins. III. 72*. 18.
 — *sylicola* Schmidt Germ. Zeits. III. 179. 21. — ♀ *nemoralis*
 Schmidt Germ. Zeits. III. 178. 20. — Long. 1,5-2,3 mill. — Allemagne, Autriche.

En ovale court, médiocrement convexe, rouge-ferrugineux luisant. Antennes assez courtes, massue petite, concolore, dont les 3 derniers articles sont d'égale épaisseur; 3^e article un peu plus long et plus menu que le 2^e. Front convexe, finement ponctué. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, médiocrement rétréci par devant, légèrement arrondi sur les côtés, bord antérieur légèrement échancré, angles antérieurs obtus, arrondis; bord basal droit avec les angles obtus par suite de la rondeur des côtés, non arrondis, surface ponctuée de points tantôt plus serrés et plus distincts, tantôt plus écartés et plus fins. Ecusson très légèrement ponctué. Elytres 2 fois aussi longues que le prothorax, en ovale plus court rétréci par derrière, stries ponctuées de points assez serrés et fins, strie suturale plus enfoncée vers l'extrémité, interstries polis, à points écartés, extrêmement fins et à peine visibles. — ♂ Pattes postérieures allongées, cuisses élargies peu à peu de la base au milieu au bord inférieur; jambes courbées, plus fortement au milieu; tarsi antérieurs non élargis. ♀ Cuisses postérieures simples, jambes droites. — Très voisin du *calcarata*, dont il se distingue par sa forme courte ovale, le bord postérieur du prothorax droit et les angles postérieurs non arrondis, ainsi que par les cuisses postérieures inermes et les jambes courbées d'une autre façon. Il diffère des petits *dubia* par sa forme plus courte, les angles postérieurs du prothorax non arrondis et sa ponctuation plus fine;

dans celui-ci, les pattes postérieures ne sont pas allongées, et les jambes ne sont pas courbées.

15. ANISOTOMA CURVIPES Schmidt Germ. Zeits. III. 1841. 167*. 13.
— Long. 3,8; larg. 2,8 mill. — Lombardie.

Si voisin de *dubia* qu'on pourrait le prendre pour un exemplaire décoloré de cette espèce, mais il en diffère par des caractères très importants et très facile à séparer. Avec la même taille, la même forme et les mêmes proportions dans chacune de ses parties, il s'en distingue : 1° par le bord basal du prothorax, qui n'est pas coupé droit, mais plus fortement bisinué que dans aucune autre espèce; 2° par la conformation des pattes postérieures. Les cuisses commencent menues et présentent à la base au bord inférieur une légère échancrure, mais au milieu elles deviennent brusquement 2 fois aussi larges, et présentent là une saillie obtuse, arrondie, et vont obliquement, mais toujours elles sont encore considérablement plus larges au bout qu'à la base; la rainure des jambes a les bords inégaux, l'externè, très saillant, s'arrondit au bout, l'interne est très étroit, échancré et terminé au bout en une dent obtuse, en hameçon, qui ne dépasse pas l'externe; les jambes postérieures sont presque droites jusqu'au milieu, mais à partir de là se recourbent en dedans presque aussi fortement que dans *dubia*, du reste aussi longues que dans celui-ci. — ♂ Tarses antérieurs subdilatés. — Subarrondi, déprimé, luisant, roux-testacé, pattes plus pâles, prothorax bisinué à la base, élytres striées-punctuées, cuisses postérieures claviformes.

16. ANISOTOMA FLAVESCENS Schmidt Germ. Zeits. III. 1841. 157. 7.
— Er. Deuts. Ins. III. 1845. 63*. 9. — Long. 2,3-2,8; larg. 1,8 mill. — Allemagne, France.

Semble n'être qu'une variété du *dubia*, dont il a la forme et la couleur, si ce n'est que la massue des antennes présente un caractère très-remarquable. Les antennes sont de médiocre longueur, 3° article pas plus long que le 2°; massue très forte, les 2 pénultièmes articles beaucoup plus grands et plus épais que le 1^{er} et le dernier, celui-ci avec la pointe conique fortement séparée

et petite ; les 3 derniers articles bruns. Tête assez grande, densément et finement ponctuée, avec de plus gros points sur le front ; brune, la portion antérieure du front et la bouche brun-rouge clair. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés, rétréci très peu par derrière, un peu plus par devant, largement et peu profondément échancré au sommet, droit à la base ; tous les angles obtus sans être arrondis ; surface médiocrement convexe transversalement, ponctuation assez dense et distincte si ce n'est très forte ; brun, rouge-brun-jaunâtre plus clair sur les côtés. Ecusson ponctué, brun. Elytres assez convexes, striées-ponctuées, interstries plans, à points fins, épars, alternes avec une rangée de gros points écartés ; brun-rouge-jaunâtre ; dessous jaune-rougeâtre, pattes un peu plus claires. — ♂ 3 articles intermédiaires des tarsi antérieurs dilatés, jambes postérieures un peu allongées, cuisses terminées en dessous, dedans et dehors par un denticule peu saillant et assez obtus ; les jambes médiocrement arquées à partir du milieu. ♀ Tarsi antérieurs simples, jambes postérieures non allongées, cuisses arrondies en dessous au bout, jambes à peine distinctement arquées.

17. ANISOTOMA SILESIACA Kr. Stet. Zeit. 1852. 380. — *arctica* Thoms. Skand. Col. iv. 35. 5. — Long. 4,6 mill. — France, Allemagne, Laponie.

Sa stature oblongue, les interstries alternes des élytres à points plus grands, sériés et les tarsi antérieurs plus fortement dilatés ♂, le distinguent très facilement de ses voisins. — Tête ferrugineuse, luisante, très densément pointillée, yeux et pointe des mandibules d'un noir de poix. Antennes ferrugineuses, massue à peine plus obscure, 3^e article près de 1 1/2 fois plus long que le 2^e, 4-6 subtransverses, 7^e un peu plus étroit que le 9^e, dernier en ovale court, pénultième transverse à peine plus étroit. Prothorax transverse, un peu plus étroit que les élytres, largement échancré au sommet, légèrement arrondi sur les côtés, tronqué à la base avec les angles presque droits ; très densément ponctué, convexe transversalement, ferrugineux, luisant. Ecusson triangulaire, densément pointillé. Elytres deux fois plus longues que

le prothorax, à peine arrondies sur les côtés, convexes, ferrugineuses, fortement striées-punctuées, interstries très finement pointillées, alèrnes marqués de séries de points plus gros (12-16). Dessous et pattes ferrugineux ; jambes antérieures dilatées, postérieures à éperons droits, à peine arqués ♂ ; 1^{er} article des tarsi égal au dernier, celui-ci plus de 2 fois plus long que le pénultième. — ♂ Tarsi antérieurs assez fortement dilatés ; cuisses postérieures simples, angle apical arrondi, jambes légèrement arquées, 1^{er} article des tarsi égal au dernier, celui-ci près de deux fois plus long que le pénultième.

18. ANISOTOMA SIMPLEX Thoms. Op. 542*. — Scanie, Espérod.

Stature de l'*arctica*, mais plus grand et plus oblong, il s'en éloigne par l'absence de striole punctuée raccourcie près des épaules. — Tête ferrugineuse, densément, assez finement punctuée, les 4 points frontaux ordinaires plus grands, bien marqués. Antennes ferrugineuses, massue noir-obscur ; 3^e article 1 1/2 fois plus long que le 2^e, 4-7 petits subarrondis, 8^e un peu plus étroit que le 10^e, dernier un peu plus étroit que le pénultième, qui est transverse. Prothorax fortement transverse, tronqué à la base et un peu plus étroit que les élytres ; côtés subdilatés au-delà du milieu, à peine plus rétréci devant que derrière, transversalement convexe sur le disque, densément mais non profondément punctué, avec quelques points plus gros de chaque côté à la base. Elytres deux fois plus longues que le prothorax, en ovale rétréci au bout, moins convexes sur le dos, déclives sur les côtés et au sommet, assez fortement striées-punctuées, interstries à points obsolètes, 3^e, 5^e et 7^e marqués de grands points en petit nombre ; striole humérale raccourcie, réunie avec la marginale, nulle. Cuisses postérieures oblongues, avec l'angle apical interne subépineux, externe arrondi ; jambes antérieures assez larges, plus fortement denticulées ; tarsi subtomenteux en-dessous, non dilatés. — ♂ Tarsi antérieurs légèrement dilatés ; cuisses postérieures obsolètement crénelées en-dessous près de la base, dilatées-subdentées au milieu, jambes postérieures subincourbées dans leur moitié apicale.

19. ANISOTOMA HUMERALIS Thoms. Op. 1871. 523*. — Suède, Eland.

Oblong, ferrugineux, massue des antennes noire; élytres striées-punctuées, interstries très densément pointillées, avec des séries de points plus grands, striole humérale confondue avec la marginale. — Ressemble presque au *simplex* pour la stature, mais encore plus grand et plus oblong; il s'en distingue par ses antennes plus longues, à dernier article de la massue à peine plus étroit que le pénultième, par son prothorax à angles antérieurs plus larges, moins avancés, non dilaté sur les côtés au-delà du milieu, par ses élytres à interstries densément et finement ponctués, à points plus grands sériés à peu près comme dans *arctica*, à striole humérale raccourcie, formée de 6-8 points, confondue avec la marginale; par ses cuisses postérieures à angle apical externe, plus aigu que l'interne et saillant.

20. ANISOTOMA FURVA Er. Deuts. Ins. m. 64. 10*. — Long. 3,5-3,8 mill. — Allemagne boréale.

Voisin du *ciliaris*, mais souvent un peu plus grand, aussi plus long et plus déprimé. — Obovale, assez fortement convexe, brun-foncé ou brun-rouge, quelquefois jaune-ferrugineux, médiocrement luisant. Antennes assez courtes, 3^e article de moitié plus long que le 2^e, massue assez forte, à 1^{er} et dernier articles bien plus étroits que les 2 pénultièmes, brun-noirâtre, les autres articles jaune-ferrugineux. Tête assez grande, densément ponctuée, front peu convexe, ses 4 gros points un peu effacés. Prothorax court, près de 2 fois aussi large que long, beaucoup plus étroit que les élytres, arrondi sur les côtés, nullement ou peu rétréci par derrière, un peu plus par devant; bord apical très légèrement échancré, basal droit, angles antérieurs à peine saillants, obtus et un peu arrondis comme les postérieurs; surface faiblement convexe, assez densément et fortement ponctuée. Ecusson ponctué. Elytres un peu plus de 2 fois aussi longues que le prothorax, un peu dilatées-arrondies après le milieu, assez convexes, distinctement ciliées sur les côtés de poils fins, assez fortement striées-punctuées, interstries plats, assez finement et pas densément ponctués, alternes

avec une rangée de quelques plus gros points. Dessous et pattes pubescents, celles-ci assez fortes, postérieures pas distinctement épaissies ; cuisses postérieures terminées en-dessous par un petit angle arrondi saillant. Les 3 articles du milieu des tarsi intermédiaires légèrement élargis dans les 2 sexes. — ♂ Articles 2-4 des tarsi antérieurs un peu élargis, cuisses postérieures élargies en-dessous après le milieu en un angle obtus, jambes postérieures légèrement arquées. ♀ Tarsi antérieurs simples, cuisses postérieures droites en-dessous, jambes postérieures droites et un peu plus courtes que ♂. — Diffère du *ciliaris*, dont il est très voisin, par sa forme plus allongée, moins convexe, par la forme du prothorax, qui ne se rétrécit pas par derrière, par les stries ponctuées plus fortes et les points des interstries des élytres moins serrés, et les pattes postérieures non épaissies, — des autres espèces par le bord des élytres densément cilié.

21. ANISOTOMA CILIARIS Schmidt Germ. Zeits. III. 1841. 175. 18.
Er. Deuts. Ins. III. 65*. 11. — Long. 3,3 mill. — Suède, France, Allemagne, Hongrie.

En ellipse, court, fortement convexe, jaune-rougeâtre ou rouge-ferrugineux, légèrement luisant. Antennes courtes, 3^e article un peu plus long que le 2^e, massue forte, 1^{er} article un peu, dernier considérablement plus petit et plus étroit que les 2 précédents. Tête assez grande, densément ponctuée, front un peu convexe, les 4 gros points peu visibles entre les autres. Prothorax court, moitié aussi long que large, visiblement plus étroit que les élytres, très fortement arrondi sur les côtés, et ayant sa plus grande largeur au milieu, également rétréci devant et derrière, très légèrement échancré au sommet, avec les angles à peine saillants, très obtus et arrondis, bord basal droit avec les angles obtus sans être arrondis ; dessus convexe, densément ponctué. Ecusson densément ponctué. Elytres grandement 2 fois aussi longues que le prothorax, fortement convexes, garnies au bord de petits poils serrés, striées-ponctuées, stries légères, strie suturale plus enfoncée postérieurement, ponctuation plus fine et plus superficielle que dans les autres espèces ; interstries plans, assez finement et assez densément ponctués.

alternes avec quelques plus gros points. Pattes assez densément pubescentes, très robustes, jambes antérieures fortement épineuses, cuisses postérieures épaissies, convexes en dehors, bord supérieur arqué, bord inférieur droit, finissant en dehors en une pointe arrondie; jambes postérieures épaissies, plus fortement épineuses en dehors. Tarses intermédiaires à 3 articles médiaires légèrement épaissis dans les deux sexes, postérieurs avec le 1^{er} article plus large et plus long que les suivants. — ♂ 3 articles intermédiaires des tarses antérieurs élargis; ♀ simples.

22. ANISOTOMA CLAVICORNIS Rye. Ent. Mont. Mag. xii. 1875. 150*.
— Long. 2,8 mill. — Ecosse.

Ovale, convexe, testacé-ferrugineux, prothorax moins densément pointillé, tronqué à la base; élytres striées-ponctuées assez grossièrement, mais non profondément, interstries visiblement pointillés, avec quelques points plus grands, assez abruptement rétrécies par derrière; jambes antérieures médiocrement dilatées vers l'extrémité, non linéaires; antennes courtes, ne dépassant pas le milieu du prothorax; 3^e article un peu plus long que le 2^e, 4-6 graduellement plus larges, transverses, massue concolore, graduellement plus large, 2 pénultièmes articles fortement transverses, dernier plus clair, grand, de la largeur du précédent, globuleux-acuminé; un seul exemplaire. ♂ inconnu. — La structure des antennes le distingue de toutes les autres espèces; très courtes (rappellent les *Cyrtusa*), élargies vers le bout, avec les articles 4, 5 et 6 extraordinairement petits; le dernier, quoique court, aussi large que les 2 précédents (très transverses), formant une massue plus grande que celle d'*ovalis*. — Prothorax uniformément arrondi sur les côtés, presque tronqué en avant, avec les angles fort arrondis; surface finement, mais non très densément pointillée; élytres grossièrement, mais non très profondément striées-ponctuées, les points pas si nets, mais plus grands que dans *ovalis*.

23. ANISOTOMA SCITA Er. Deuts. Ins. m. 70. 16*. — Long. 3 mill.
— Allemagne, Berlin, rare.

Ovale, convexe, rouge-ferrugineux ou jaune-ferru-

gineux luisant. Antennes de moyenne longueur, 3^e article un peu plus long que le 2^e, massue assez étroite, les 3 derniers articles d'égale épaisseur. Tête densément et finement ponctuée, front avec les 4 grands points ordinaires. Prothorax pas tout à fait de la largeur des élytres. côtés droits jusqu'au milieu, puis arrondis en avant, de sorte que la plus grande largeur est au bord postérieur, et que le prothorax paraît seulement rétréci en avant; bord apical légèrement échancré de chaque côté, avec les angles antérieurs très peu saillants, obtus et un peu arrondis; bord basal droit; les angles postérieurs seraient droits si le bord basal ne tombait un peu obliquement sur eux; surface légèrement convexe, assez densément et très finement ponctuée. Ecusson finement ponctué. Elytres au moins 2 fois aussi longues que le prothorax, ayant leur plus grande largeur avant le milieu, ovales, pointues au bout, assez convexes, fortement striées-ponctuées, strie suturale sulciforme après le milieu, interstries plans, à points écartés extrêmement fins, alternes avec quelques points plus grands très écartés. Pattes assez fortes, jambes fortement épineuses. — ♂ Tarses antérieurs non fortement dilatés, jambes postérieures non allongées, angle inférieur externe des cuisses postérieures un peu saillant, arrondi, jambes postérieures légèrement courbées dans toute leur longueur. ♀ angle inférieur externe des cuisses postérieures toujours arrondi, et non saillant; jambes postérieures droites. — Se distingue bien de toutes les autres espèces; de *calcarata*, auquel il ressemble le plus, par son prothorax droit par derrière, par la conformation des jambes postérieures et la grandeur du dernier article de la massue; — de *dubia* par sa forme entièrement ovale allongé et le prothorax plus légèrement échancré par devant; — de *rubiginosa*, par sa forme ovale, la ponctuation moins fine et éparse, le prothorax plus large par derrière, et la proportion des articles de la massue des antennes qui sont plus longues; — d'*ovalis*, par la ponctuation plus légère du prothorax, les stries des élytres plus fortement ponctuées et la forme plus allongée.

24. ANISOTOMA ALGIRICA Rye. Ent. Mont. Mag. XII. 1875. 151*. —
Long. 2,3 mill. — Algérie.

Ovale-oblong, testacé-ferrugineux ; massue des antennes menue, concolore, dernier article de la largeur des précédents ; prothorax densément, à peine visiblement pointillé, tronqué à la base ; élytres nettement mais non profondément striées-punctuées, interstries à pointillé peu serré et très obsolète ; jambes antérieures linéaires. — ♂ Cuisses postérieures dilatées, avec un denticule aigu apical en-dessous. — Ressemble un peu à un très petit *calcarata* pâle, dont il se distingue très vite par le dernier article des antennes égal en largeur au pénultième, sa massue plus menue, son prothorax plus obsolètement punctué, à base non sinuée, etc. Il diffère de *scitula*, auquel il ressemble le plus, par la forme du prothorax dont les côtés sont également arrondis au milieu (au lieu d'être droits jusqu'au milieu, puis rétrécis en avant), par ses stries moins profondément punctuées, et l'angle inférieur des cuisses à dilatation non arrondie ♂. Ce dernier caractère suffit pour le distinguer des plus petits et des moins développés *dubia* ou *ovalis*.

25. ANISOTOMA LUNICOLLIS Rye Ent. Month. Mag. VIII. 1872. 203*.
— Long. 3 mill. — Angleterre.

Ovale-oblong, convexe, luisant, ferrugineux, massue des antennes assez grêle, brunâtre, dernier article plus étroit que le précédent ; prothorax un peu plus large que les élytres, côtés fort arrondis (surtout vers le sommet), échancré au bout, tronqué à la base, finement et densément pointillé en dessus ; élytres striées-punctuées de points serrés plus petits, interstries légèrement élevés, assez densément et finement pointillés ; pattes intermédiaires et postérieures assez épaisses, assez courtes, jambes antérieures linéaires. — ♂ Jambes intermédiaires dilatées et légèrement incurbées au bout, tarsi assez épais, cuisses postérieures élargies, comprimées, sinuées en dessus avant l'extrémité qui est denticulée, jambes non allongées, un peu incurbées, légèrement épaissies près de l'extrémité. — Intermédiaire entre *calcarata* et *hybrida*, il diffère du premier par son prothorax plus

large, avec les côtés si arrondis, que les angles antérieurs sont oblitérés et les postérieurs à peu près, la base tronquée, presque sans sinuosités, par ses antennes à massue plus petite, par sa forme bien plus allongée, ses élytres ne commençant pas si près des épaules à se rétrécir, les points des stries plus serrés, pas si grands, ceux des interstries plus distincts et plus nombreux, les pattes postérieures ♂ à peine plus distinctement allongées, les cuisses n'ayant en dessous qu'un petit denticule au bout; — du deuxième, par sa forme un peu moins oblongue, son prothorax plus large, moins densément ponctué, sans traces d'angles antérieurs, la ponctuation des stries légèrement plus forte, sans traces de strigosité transverse, et les cuisses postérieures ♂ dentelées.

27. ANISOTOMA PICTA Reiche, Fr. Soc. ent. 1861. 370. — *fuscincta* Fairm. Fr. Soc. ent. 1878. Bul. 55. — *Heydeni* Rag. Nat. Sic. 1. 1881. p. 62*. — Long. 2-3; larg. 1-2 mill. — Corse, Sicile.

Convexe, subovale, luisant, testacé. Tête noir-marron, finement ponctué; antennes ferrugineuses à la base, 4 derniers articles bruns, 1^{er} plus petit que les 3 derniers. Prothorax noir-marron, finement ponctué comme la tête, marqué sur les côtés de deux taches ferrugineuses, angles arrondis. Ecusson triangulaire, brun-marron, ponctué. Elytres d'un testacé pâle, avec la suture et les bords latéraux noirâtres; marquées de huit stries ponctuées bien accusées. Pattes testacées, plus pâles que les élytres. — ♂ Cuisses postérieures armées d'une dent, et jambes postérieures d'une épine et courbées. — Voisin de *picta* Reiche d'Algérie, dont il a la coloration, *Heydeni* en diffère par les stries des élytres, également ponctuées, par la dent des cuisses postérieures qui le distingue aussi de *ornata* Fairm.

28. ANISOTOMA PUNCTULATA Gyl. Ins. Suec. II. 1810. 566*. 9. Thoms. Skand. Col. IV. 39. 8. — Long. 3,3 mill. — Laponie; Finlande : Smoland.

Taille et presque stature de *ferruginea*. Oblong, ferrugineux. Tête arrondie, d'un noir de poix, luisante, très densément ponctué, mandibules fortes, arquées. Antennes plus courtes que le prothorax, assez épaisses, ferrugi-

neuses à la base, massue épaisse, d'un noir de poix. Prothorax comme dans *ferruginea*, convexe en dessus, marron luisant, fortement, très densément ponctué, un peu plus étroit que les élytres, côtés à peine arrondis, angles postérieurs droits. Ecusson triangulaire, noir, densément ponctué. Elytres convexes, d'un ferrugineux luisant, suture un peu plus obscure, fortement striées-ponctuées, interstries assez profondément séries-ponctués, sutural avec une série de points plus petits allant jusqu'au-delà du milieu. Dessous ferrugineux luisant, à peine pointillé, poitrine brune. Pattes d'un testacé pâle, cuisses larges comprimées, jambes ciliées d'épines, postérieures à peine arquées.

29. ANISOTOMA PUNCTICOLLIS Thoms. Skand. Col. iv. 1862. 39*.
— Long. 3,3 mill. — Laponie.

Voisin du *punctulata* Gyl, dont il se distingue vite par la ponctuation des élytres. Ovale-oblong, convexe, ferrugineux. Tête vaguement et assez fortement ponctué, convexe, ferrugineuse, luisante. Antennes moins courtes, ferrugineuses, massue à peine plus obscure, 2^e article un peu plus court que le 3^e, 4-6 de plus en plus courts, à peine transverses, 7^e un peu plus étroit que le 9^e, 8^e égal au 6^e, 9-11 de même largeur, à peine transverses. Prothorax un peu plus étroit que les élytres, échancré au sommet, également arrondi sur les côtés, rétréci vers le sommet; tronqué à la base avec les angles droits; assez fortement, moins densément ponctué, convexe transversalement, ferrugineux, luisant. Ecusson triangulaire, évidemment ponctué. Elytres plus de deux fois plus longues que le prothorax, convexes, subovales, arrondies au bout, fortement ponctuées-striées, interstries marqués de vagues strigosités transverses avec des points plus petits en séries assez régulières, alternes marqués de points plus grands; ferrugineuses luisantes. Métasternum très finement alutacé, marqué de chaque côté de points assez forts, peu nombreux. Pattes ferrugineuses, cuisses moins robustes, jambes linéaires, droites, peu épineuses, épérons assez courts, tarses postérieurs à 1^{er} article plus long que le dernier, celui-ci un peu plus long que le 2^e.

30. ANISOTOMA NITIDULA Er. Deuts. Ins. III. 74. 19*. — Long. 2,8 mill. — Allemagne : Erlangen.

Ovale large et très court, faiblement convexe, d'un brun ferrugineux profond, très luisant. Antennes allongées, 3^e article de moitié plus long que le 2^e, massue très lâche, dernier article de la largeur des précédents, arrondi, à pointe obtuse. Tête petite, à points écartés, fins et obsolètes, les quatre gros points du front plus distincts. Prothorax de la largeur des élytres au bord postérieur, près de deux fois aussi large que long, peu à peu fortement rétréci par devant, légèrement arrondi sur les côtés, peu sinué par devant, avec les angles arrondis, échancré en un arc large par derrière, par suite angles postérieurs saillants en arrière, pointus, embrassant les élytres, surface couverte de points fins obsolètes, un peu écartés. Ecusson finement ponctué. Elytres près de deux fois aussi longues que le prothorax, en ovale pointu de la base au sommet, striées-ponctuées, stries légères sauf la suturale qui est sulciforme par derrière, leurs points gros et profonds, interstries plans, chacun avec une rangée assez régulière de points fins, 3^e, 5^e et 7^e marqués en outre de quelques gros points. Pattes postérieures non allongées, cuisses postérieures simples avec les angles du genou arrondis, jambes postérieures légèrement arquées, tous les tarses un peu épais. — Se rapprochant du *nigrita* par les points forts des stries des élytres, il s'en éloigne par sa forme plus large et sa convexité moindre; en outre, les angles pointus du prothorax, embrassant les épaules, sont si remarquables qu'on ne peut le confondre avec aucune autre espèce.

31. ANISOTOMA SIMILATA Rye Ent. Month. Mag. 1870. 8*. — Long. 2,3 mill. — Angleterre.

Ovale-subglobuleux, ferrugineux, luisant, prothorax lisse, antennes grêles à la base, élytres striées-ponctuées, points légèrement marqués, 4^e strie à partir de la suture légèrement arquée derrière la base. — Considéré d'abord comme une forme extrême de *badia*, dont il est très voisin, il diffère par sa taille un peu plus grande et sa couleur plus claire, les articles basals des antennes un

peu plus grêles, ses élytres proportionnellement un peu plus longues, avec les points, quoique réguliers et bien définis, beaucoup plus fins, la 4^e strie à partir de la suture étant, de plus, légèrement ondulée vers le tiers supérieur.

www.libtool.com.cn

32. ANISOTOMA HYBRIDA Er. Deuts. Ins. III. 1845. p. 75. 21*. — Long. 3,3 mill. — Allemagne, Silésie, Berlin, Caucase.

Oblong, convexe, brun de poix foncé, élytres un peu plus claires, d'un brun de poix plus rougeâtre, luisant. Antennes assez courtes, 3^e article peu plus long que le 2^e, 1^{er} article et le dernier quoique moins, plus étroits que les 2 précédents; massue noirâtre, les autres articles d'un rouge brun. Tête assez grande, finement ponctuée, front marqué des 4 plus grands points ordinaires. Prothorax de la largeur des élytres, arrondi sur les côtés, rétréci très peu par devant, un peu davantage vers la base, bord antérieur échancré de chaque côté, angles antérieurs peu avancés, bord basal droit, tous les angles obtus et un peu arrondis, dessus convexe, assez densément et finement ponctué. Ecusson finement ponctué. Elytres un peu plus de deux fois aussi longues que le prothorax, striées-ponctuées, les stries extrêmement légères, avec des points fins, interstries marqués de fines strigosités peu serrées, alternes avec quelques points assez obsolètes; strie suturale; comme d'ordinaire fortement sulciforme à partir du milieu. Pattes courtes, brun-rouge clair, simples, cuisses postérieures avec l'angle apical inférieur arrondi. — Ressemble beaucoup à *badia* pour la sculpture des élytres, mais n'en a pas la taille, la forme et la coloration; c'est l'espèce la plus allongée, et présentant l'aspect d'un *Hydnobius*.

33. ANISOTOMA BICOLOR Brancs. Deuts. Zeits. 1874. 228*. 3. — Long. 2,3 mill. — Hongrie, Carpathes.

Taille d'un grand *badia*. Brun-jaune; tête et prothorax rouge-jaune, très finement et densément ponctués, yeux noirs; antennes brun-jaune, massue noir de poix; prothorax ayant sa plus grande largeur à la base, peu plus étroit que la base des élytres, avec les angles postérieurs droits; élytres d'un noir de poix avec des rangées régu-

lières de points forts, qui disparaissent vers l'extrémité ; interstries à points extrêmement fins et très indistincts, alternes avec des rangées de plus gros points écartés. Strie suturale plus fortement ponctuée vers le sommet ; jambes antérieures peu élargies.

34. ANISOTOMA RECTANGULA Reitr. Brünn. Verh. Nat. Ver. xxm. 1885. Sépar. 97*. — Long. 3,2-4,2 mill. — Caucase.

Jaune-brun, dessus fortement ponctué. Massue des antennes longue, étroite, jaune. Prothorax sinué de chaque côté au bord basal, rétréci en courbe par devant sur les côtés, couvert de points serrés distincts, assez forts ; angles postérieurs plus ou moins pointus, prolongés en arrière et embrassant la base des élytres. Elytres marquées de stries légèrement enfoncées, à points serrés ; interstries densément et distinctement, assez fortement ponctués. Jambes antérieures élargies vers l'extrémité ; ♂ postérieures ou allongées et 2 fois courbées, la courbure inférieure la plus grande, presque en demi-cercle ou droites ; cuisses postérieures avec une petite dent lobuliforme à l'extrémité interne.

35. ANISOTOMA NITIDA Rtr. Brünn. Verh. Nat. Ver. xxiii. 1885. Sépar. 97*. — Long. 3,2-3,5 mill. — Carpathes, nord de la Hongrie.

Voisin du *rectangula*, dont il se distingue par les caractères suivants : Jambes antérieures étroites. Bord basal du pronotum échancré en une faible courbe, presque droit jusque près des angles postérieurs, bord latéral rétréci jusqu'en droite ligne vers le devant. Dessus finement ponctué, brun-marron foncé, antennes et pattes d'un rouge ferrugineux, massue plus claire. ♂ Cuisses postérieures allongées à l'extrémité interne en une petite dent lobuliforme, jambes postérieures très légèrement courbées.

36. ANISOTOMA FLAVICORNIS Bris. Soc. Ent. Fr. 1883. Bul. cxliii*. — Reitr. Brünn. Verh. Nat. Ver. xxiii. 1885. Sépar. 97. — Long. 1,5-1,8 mill. — France : Saint-Germain-en-Laye, Jura, Savoie ; Autriche, Hongrie.

Ovale, convexe, d'un testacé ferrugineux ; antennes jaunes ; pronotum presque lisse ; élytres striées-ponc-

tuées ; interstries marqués de strigosités transverses, vagues. — ♂ Cuisses postérieures terminées par une dent spiniforme et aiguë. — Très-voisin de *parvula* et évidemment confondu avec lui, il s'en distingue par ses antennes un peu plus courtes, unicolores, son prothorax un peu moins élargi en arrière, à ponctuation moins distincte, et surtout par les cuisses postérieures ♂ armées en dessous, tout-à-fait à l'extrémité, d'une petite épine aiguë, tandis que celles de *parvula* sont prolongées en dessous en une large dent triangulaire.

37. ANISOTOMA PILIFERA Reitr. Brünn. Nat. Ver. xxiii. 1885. Sépar. 98°. — Long. 3 mill. — Lenkoran, au bord de la mer Caspienne.

Corps allongé, d'un brun jaune, tête et suture des élytres plus foncées, couvert d'une fine pubescence écartée, particulièrement vers les bords latéraux et apical des élytres. Massue des antennes longue, parallèle, le dernier article à peine plus étroit que le pénultième. Prothorax à angles postérieurs obtus, mésosternum finement caréné. Jambes antérieures étroites ; cuisses du ♂ simples, postérieures arquées. — Vient se placer près de *rugosa* Steph. (*armata* Sturm.), il s'en distingue par les jambes antérieures qui ne sont pas, comme dans celui-ci, élargies vers le bout, par son corps allongé au lieu d'être en ovale court, et par le dernier article des antennes moins étroit. Sa taille est aussi moins grande.

38. ANISOTOMA SUBGLOBOSA Reitr. Brünn. Verh. nat. Ver. xxiii. 1865. Sépar. 100°. — Long. 2,3 mill. — Allemagne ; Bohême.

Ovale très court, très convexe, subhémisphérique, rouge-ferrugineux luisant. Elytres globuleuses, ayant leur plus grande largeur avant le milieu, rétrécies un peu vers la base, en courbe vers le sommet, un peu plus longues que larges. Prothorax formant une même courbe avec les élytres, conformées comme dans *dubia*. Massue des antennes assez étroite, à peine plus foncée que la tête. Jambes postérieures du ♂ courbées, bisinuées, angle apical inférieur des cuisses saillant en une dent obtuse. — Entièrement semblable au *Triepkei* pour la forme et le faciès, différent cependant par la massue antennaire étroite, parallèle, et les cuisses postérieures du ♂.

39. ANISOTOMA GALLICA Reitr. Brünn. Verh. nat. Ver. XXIII. 1881.
Sépar. 101*. — Long. 2 mill. — France centrale.

Antennes à massue étroite, jaune, unicolore. Front marqué de chaque côté de 2 plus grands points. Bord basal du pronotum coupé droit, avec les angles paraissant obtus ou presque arrondis; dessus plus ou moins distinctement ponctué. Elytres finement striées avec des points serrés. Cuisses postérieures ♂ munies au bord apical interne d'une dent distincte, et arrondies à l'externe; cuisses postérieures arquées. Jambes antérieures étroites. — Se distingue de *brunnea*, auquel il ressemble beaucoup, par la base du prothorax et l'armature des cuisses ♂; du *clavicornis* par ces mêmes caractères et la massue antennaire étroite. Se place après l'*ovalis*, qui a la massue des antennes assez grande et large, ordinairement rembrunie, mais sa taille est plus petite et les cuisses ♂ sont munies d'une dent apicale.

40. ANISOTOMA CALCARIFERA Reitr. Brünn. Verh. nat. Ver. XXIII. 1885. Sépar. 104*. — Long. 3 mill. — Caucase.

Très voisin du *calcarata*; comme lui, il a la massue des antennes large, avec le dernier article plus étroit que le pénultième; il en diffère par ses jambes antérieures élargies vers le bout, la forme du corps plus ramassée, les angles postérieurs du pronotum droits et non obtus, et sa base très légèrement sinuée près de ceux-ci.

41. ANISOTOMA FRACTA Seydl. Fn. Balt. 1874. 209*. — Long. 5 mill.
— Estland, Gute Schwarzen.

En ovale court; grand, trapu, brun. Antennes courtes et épaisses, dernier article de la massue un peu plus étroit que les deux précédents, avec la pointe séparée. Tête convexe, avec une impression indistincte sur le front. Prothorax 2 fois aussi large que long, rétréci légèrement par derrière, plus fortement par devant, ayant sa plus grande largeur presque au milieu; angles postérieurs obtus, mais assez pointus, antérieurs arrondis. Elytres sans bordure de cils, grossièrement ponctuées-striées, interstries alternes avec 2 rangées de fovéoles. Cuisses postérieures ♂ munies au bout, seulement en

dedans, d'une grande dent pointue dirigée en arrière, arrondies en dehors, près du milieu avec une grande saillie faiblement dentiforme ; cuisses intermédiaires sans dent, jambes intermédiaires droites avec une apparence de courbure vers le haut, puis brusquement très courbées en dedans comme coudées. Tarses antérieurs et intermédiaires élargis (1).

4. — *Cyrtusa* Er.

Front et base du pronotum sans points plus grands. Elytres marquées de stries obsolètes, interstries densément et fortement ponctués.

A. Antennes paraissant de 10 articles et massue de 4, le 2^e article de la massue n'étant pas visible ordinairement. CYRTUSA Er.

B. Dessus densément ponctué ; élytres avec 2 légères rangées de points, interstries densément et fortement ponctués.

C. Strie suturale fortement enfoncée du milieu jusqu'au bout ; dos du pronotum finement mais distinctement ponctué.

D. Jambes postérieures étroites, lignes de points des élytres très indistinctes, raccourcies à la base et au sommet, interstries à points pas plus fins que ceux-ci.

E. Rouge-ferrugineux, tête et prothorax brun-marron, rarement unicolores, antennes (sauf la massue foncée) et pattes jaunes. Elytres à points très fins,

(1) Dans son tableau synoptique des *Necrophaga*, qui ne nous est parvenu qu'après l'impression, et auquel nous n'avons pu emprunter tout ce que nous aurions voulu, Ed. Reitter nous signale deux nouvelles espèces d'*Hydnobius*, l'une de Sicile, *Demarchii*, et l'autre de Martkopi, au Caucase, *puncticollis* (Brünn Nat. Ver. xxiii. 1885. Sépar. p. 94).

Demarchii est très voisin du *punctatissimus*, dont il ne diffère que par le dessus rouge-ferrugineux, les élytres d'un brun-jaunâtre pâle, avec la suture et une tache transversale sur le bord latéral, d'un noir-brun. — Long. 2,2-3 mil.

puncticollis vient près des *punctatus* et *septentrionalis* ; il a, comme eux, les élytres fortement ponctuées, mais le pronotum, au lieu d'être finement ponctué, ne l'est guère plus légèrement que les élytres, et sa couleur est d'un rouge-ferrugineux clair et non jaune-rouge. — Diffère du *Demarchii* par sa surface rouge-ferrugineux ou jaune-rouge unicolore, et les stries des élytres régulières.

ceux du pronotum à peine plus légers. — Long. 1,7 mill.

1. *subtestacea* Gyl. Eur^a. méd.

E'. Rouge-ferrugineux clair, unicolore; massue des antennes non rembrunie. Elytres assez fortement, pronotum 2 fois plus finement ponctués. Corps plus petit, plus globuleux. — Long. 1,5 mill.

2. *subferruginea* Rtr. Fl.

D'. Jambes postérieures fortement élargies vers le bout, épineuses en dehors. Lignes ponctuées des élytres distinctes jusqu'au bout, interstries un peu plus finement ponctués.

E. Plus grand, ovale globuleux, 8^e article des antennes (2^e de la massue) non visible; prothorax et interstries des élytres très densément et distinctement ponctués; jambes postérieures élargies peu à peu vers le bout. — Long. 1,5 - 2 mill.

femorata Schmidt. 3. *minuta* Ahr. Eur^a. méd.

E'. Plus petit, ovale, allongé, moins convexe, 8^e article des antennes (2^e de la massue) visible comme une petite lame transverse; prothorax et interstries des élytres à points très fins et très clair-semés; jambes postérieures du ♂ subitement élargies au bout. — Long. 1,3 mill.

4. *pauvilla* Schm. Eur. méd.

C'. Strie suturale enfoncée seulement au bout des élytres, stries ponctuées fines mais distinctes, devenant plus fortes vers le sommet. Prothorax avec les angles postérieurs obtus, son dos à points difficiles à voir. Jambes postérieures courtes et larges, élargies aplaties également de la base au sommet. Ovale globuleux, jaune-brun clair, article apical de la massue peu plus étroit que les deux précédents. — Long. 2 mill.

5. *latipes* Er. Eur. méd.

B'. Pronotum et interstries des élytres à peine ponctués; 3^e interstrie avec 3 points. Ovale court, rouge-ferrugineux, dos du prothorax et élytres transversalement rembrunies derrière le milieu, antennes grêles. — Long. 2 mill.

6. *castanescens* Frm. Corse.

A'. Antennes de 11 articles distincts, massue grande, de 3 articles. Ressemble beaucoup à un grand *Cyrtusa minuta*, de mêmes forme, couleur et ponctuation,

brun ferrugineux, yeux et massue des élytres (grande) foncés, dernier article de la massue bien plus étroit que le précédent. — Long. 2 mill.

XANTHOSPHERA Fairm. 7. *Barnevillei* Frm. Hong.

42. CYRTUSA LATIPES Er. Deuts. Ins. nr. 1845, p. 80. 3*. — Long. 1,3-1,6 mill. — Allemagne, Berlin.

Forme presque hémisphérique de *subtestacea*, rouge-brun ou jaune-rouge, luisant. Antennes courtes, massue large, brunâtre, avec le dernier article ferrugineux. Tête finement ponctuée. Prothorax postérieurement assez de la largeur des élytres à la base, rétréci par devant; côtés légèrement arrondis, seulement moitié aussi longs que la longueur médiane, bord antérieur fortement bisinué, angles antérieurs bien moins avancés que le milieu entre les deux échancrures, obtus et arrondis; bord basal largement arrondi au milieu, très légèrement sinué de chaque côté près de l'écusson, un peu échancré aux côtés, et par suite angles postérieurs un peu pointus; surface lisse au milieu, très finement et obsolètement ponctuée vers les côtés. Ecusson finement et indistinctement ponctué. Elytres marquées de fines rangées de points, pas très régulières et n'atteignant pas tout à fait la base, interstries très finement et pas très densément ponctués; strie suturale enfoncée seulement au bout. Jambes postérieures, dans les deux sexes, élargies à partir de la base, très larges et fortement comprimées, garnies de spinules sur l'arête externe. — ♂ Cuisses postérieures armées, au bout en dessous, d'une dent large, pas très pointue, dirigée en arrière; ♀ l'extrémité est arrondie. — Diffère de *subtestacea* et *minuta* par sa ponctuation plus fine, par les stries ponctuées des élytres, pas tout à fait régulières et droites, et par la strie suturale qui manque presque entièrement, particulièrement par les jambes postérieures qui s'élargissent fortement dès la base.

43. CYRTUSA PAUXILLA Schmidt Germ. Zeits. III. 1841. 188. 28. — Er. Deuts. Ins. III. 81*. 4. — Long. 2; larg. 0,5 mill. — Allemagne, Poméranie, Saxe, Hesse; Autriche.

Taille du plus petit *minuta*, un peu plus allongé et entièrement ovale, assez convexe, jaune-rougeâtre, lui-

sant. Antennes assez longues, massue forte. Tête un peu foncée, front et vertex souvent brunâtres, finement mais visiblement et profondément ponctuée. Prothorax par derrière presque de la largeur des élytres, peu rétréci par devant; côtés médiocrement arrondis, de moitié plus courts que le diamètre du milieu; bord antérieur largement échancré de chaque côté, angles antérieurs aussi avancés que le milieu entre les deux échancrures, avec la pointe plus obtuse et arrondie; bord postérieur un peu arrondi au milieu, coupé obliquement sur les côtés; angles postérieurs un peu obtus, sans être arrondis; surface très finement et beaucoup moins distinctement ponctuée que la tête. Ecusson très finement et un peu indistinctement ponctué. Elytres ponctuées, les points disposés par derrière en rangées, qui sont visibles à partir du milieu, et deviennent toujours plus distincts vers le bout, pendant que les points des interstries deviennent au contraire plus fins; la strie suturale est enfoncée de la pointe jusqu'au-dessus du milieu. Pattes comme dans *minuta*, les jambes postérieures sont dilatées peu à peu ♀, brusquement à la pointe ♂. L'angle externe de l'extrémité des cuisses postérieures est en angle droit pointu ♂, arrondi ♀. — Diffère de *minuta* par la forme ovale du corps, les angles postérieurs du prothorax obtus, les cuisses postérieures ne se terminant pas par une dent ♂ et les jambes postérieures brusquement dilatées à l'extrémité.

5. — *Colenis* Er.

44. COLENIS BONNAIREI Duv. Glan. 1859. 32*. — *foveicollis* Uhag. Esp. Soc. Hist. nat. v. 1876. Sép. 36. pl. 4. f. 1. — Long. 2 mill.; larg. 1,1. — France : Fontainebleau; Espagne.

Ovale, convexe, assez luisant, en entier d'un jaune testacé. Antennes un peu plus courtes que la tête et le prothorax, 2° article plus épais que le 3°, qui est au moins moitié plus long que lui, 7° égal aux contigus, dernier de la massue un peu plus étroit que les deux précédents. Tête finement pointillée. Prothorax environ deux fois aussi large que long, visiblement moins court que dans *dentipes*, à peine rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés, visiblement sinué de chaque côté à son

bord antérieur et légèrement aussi à sa base, avec les angles postérieurs obtus et un peu arrondis même au sommet; convexe sur son disque, très subtilement pointillé. Elytres légèrement, mais distinctement striées, à stries finement ponctuées, peu visibles au sommet, la suturale toutefois au contraire fortement enfoncée en sillon en arrière. — ♂ Cuisses postérieures larges, fortement comprimées, avec leur bord postérieur formant simplement un angle à peu près droit et peu saillant en dehors au sommet, mais notablement dilaté-arrondi presque dans toute sa moitié basilaire et muni sur cette dilatation d'une forte épine aiguë assez longue et assez étroite. — Faciès intermédiaire entre *Colenis dentipes* et les *Agaricophagus*.

6. — *Agaricophagus* Schmidt.

45. AGARICOPHAGUS CEPHALOTES Schmidt. Germ. Zeits. III. 192. 1. — Duv. Gen. Eur. pl. 37. f. 183. — Er. Nat. Ins. III. 85* 1. — Long. 2,3 mill. — France; Allemagne: Silésie, Cassel.

De forme plus allongée, de largeur égale, de moitié plus grand que les plus grands *Colenis dentipes*, légèrement convexe, brun-rougeâtre clair ou jaune-rougeâtre, très luisant. — Tête grande, marquée de strigosités transverses extrêmement fines et de points épars très fins. Prothorax de la largeur des élytres, légèrement arrondi sur les côtés, à peine rétréci par devant, bord antérieur légèrement échancré de chaque côté, bord basal droit, tous les angles arrondis, surface couverte de strigosités transverses extrêmement fines et serrées, aussi finement et éparsement ponctuées. Ecusson strigieux et ponctué de même. Elytres finement striées-ponctuées, strie suturale fortement enfoncée postérieurement à partir du milieu, tous les interstries strigieux transversalement. — ♂ Tête considérablement grosse, tarsi antérieurs faiblement élargis, cuisses postérieures largement comprimées, armées en dessous d'une dent crochue dirigée en arrière, avec une échancrure devant et derrière cette dent; ♀ tête un peu plus petite, prothorax un peu rétréci en avant, tarsi simples, ainsi que les cuisses postérieures.

46. AGARICOPHAGUS CONFORMIS Er. Nat. Ins. III. 1845. p. 86. 2°. — Long. 1,3 mill. — Silésie ; Tyrol.

Elliptique court, égal pour la taille et la forme aux plus grands *Colenis dentipes*, légèrement convexe, rouge-brun vif, très luisant. Tête assez petite, à peine distinctement strigieuse à un fort grossissement. Prothorax presque de la largeur des élytres, deux fois aussi large par derrière que long, fortement rétréci par devant, légèrement arrondi sur les côtés, bord antérieur légèrement sinué de chaque côté, bord postérieur droit, angles postérieurs obtus, antérieurs arrondis, dessus parsemé de points très fins, particulièrement vers les côtés, avec des strigosités transverses, serrées et très fines, plus visibles que sur le milieu. Ecusson sculpté de même. Elytres très finement striées-punctuées, strie suturale assez écartée de la suture, enfoncée presque jusqu'à la base, et plus fortement au milieu, interstries marqués de stries transverses serrées. — ♂ Tarses antérieurs légèrement dilatés, cuisses postérieures armées d'une petite dent, dirigée obliquement en arrière. — Diffère du *cephalotes* par sa forme brièvement arrondie, sa tête petite, le prothorax considérablement rétréci en avant, les strigosités transverses des élytres plus serrées, et la strie suturale plus écartée et plus enfoncée au milieu.

7. — *Liodes* Latr.

47. LIODES SERRICORNIS Gyl. Ins. Suec. III. 1813. 710. 13-14. — Er. Nat. Ins. III. 90°. 4. — *signatus* Walll Isis 1839. 221. — Long. 2,5 mill. — Allemagne, Suède.

Très remarquable par sa couleur et la structure des antennes. Convexe, globuleux. Antennes jaunes, les 2 pénultièmes articles bruns, 3-8 avancés en dents par en dedans, 7° plus large que les précédents et que le 8°, les 3 derniers formant une massue lâche. Tête à points écartés, front impressionné transversalement, jaune-rougeâtre, vertex et côtés du front noirs. Prothorax lisse, jaune clair, avec une grande tache médiane noire, assez nettement limitée. Ecusson lisse, rouge-brun. Elytres finement punctuées, rouge-brun, noires à la base. Dessous et pattes d'un jaune-rougeâtre.

8. — *Amphicyllis* Er.

48. AMPHICYLLIS GLOBUS F. Ent. Syst. 1. 78. 5. Syst. El. 1. 94. 11. — Payk. Fn. Suec. 1. 68. 18. III. 437. — Gyl. Ins. Suec. II. 568. 12. — Er. Nat. Ins. III. 93. — Duv. pl. 37. f. 185. — Fairm. Fn. Fr. 322. — Steph. Ill. II. 180. — *ruficollis*. Ol. Ent. II. 15. 9. 11. pl. 2. f. 7. — Herbst. Käf. IV. 71. 7. pl. 37. f. 7. — Sturm. Deuts. Ins. II. 68. 11. pl. 29. f. D. — Steph. Ill. II. 179. 1. — Var. *staphylæa* Gyl. Ins. Suec. 569. 13. — *ferruginea* Sturm. Deuts. Ins. II. 66. 9. pl. 29. f. B. — Steph. Ill. Brit. II. 180. 3. — Long. 2,8 mill. — France, Allemagne, Suède, Angleterre.

Assez hémisphérique, très convexe, noir très luisant. Antennes rouge-brun clair, les 2 articles intermédiaires de la massue noirâtres. — Tête densément et finement ponctuée, labre brun-rouge, palpes jaunes. Prothorax au bord postérieur plus de deux fois aussi large que long, très rétréci par devant, côtés et angles antérieurs arrondis, densément et finement ponctué, rouge de sang. Ecusson finement ponctué. Elytres un peu plus fortement ponctuées, avec une strie suturale enfoncée, qui remonte de l'extrémité jusqu'au milieu. Pattes brun-rouge; cuisses postérieures noirâtres. — Varie avec le corps tout rouge-ferrugineux brillant : prothorax, antennes et pattes ordinairement un peu plus clairs.

49. AMPHICYLLIS GLOBIFORMIS Sahlb. Ins. Fen. 1. 468. 16. — Er. Nat. Ins. III. 94*. 2. — Long. 2,3 mill. — Avec le précédent.

Très voisin du *globus*, mais seulement moitié aussi grand et pas tout-à-fait aussi densément ponctué. — Noir luisant. Antennes rouge-brun, les 2 articles intermédiaires de la massue pour l'ordinaire d'un brun plus foncé, le dernier article jaune-ferrugineux. Tête densément et finement ponctuée, labre brun-rouge, palpes jaunes. Prothorax de même forme que dans le *globus*, également arrondi sur les côtés, angles postérieurs un peu plus obtus, densément et très finement ponctué, noir, avec les bords brun de poix transparents. Ecusson finement ponctué. Elytres assez finement et assez densément ponctuées, avec des traces de simples rangées de points plus grands sur le dos, et avec une strie suturale allant de l'extrémité jusqu'au milieu, devenant peu à peu

d'un brun de poix vers le sommet. Pattes brun-rouge. — Présente une ressemblance frappante avec le *Liodes orbicularis*, et probablement souvent confondu avec lui. Il s'en distingue par la massue antennaire de 4 articles et les jambes sans épines.

9. — *Agathidium* Illig.

50. AGATHIDIUM CAUCASICUM Reitr. Brünn. Best. Tab. 1884. 111*. — Long. 2,5 - 2,8 mill. — Caucase.

Noir ou rouge-ferrugineux unicolore. Bord antérieur de l'épistome tronqué droit; 3^e article des antennes court, aussi long que les 2 voisins ensemble; massue des antennes noire, le dernier article jaune. Elytres courtes, à peine ou très peu plus longues que larges, finement et densément ponctuées, strie suturale très fine, n'atteignant pas le milieu, épaules arrondies en courbe. La plus grande largeur du prothorax se trouve avant le milieu.

51. AGATHIDIUM SUTURALE Reitr. Led. Cauc. 1878. 147*. — Long. 2,5-3 mill. — Caucase : Raho.

Presque hémisphérique, noir dessus avec les bords du prothorax rouge-brun et la suture étroite brune sur les élytres. Dessus très finement aciculé-alutacé partout, ce qui le rend moins luisant que dans les autres espèces, à peine ponctué, à un très fort grossissement points écartés obsolètes. Antennes jaune-brun unicolore, 1^{er} article assez également épaissi, plus long que large, 2^e plus étroit, un peu plus long que large, et beaucoup plus court que le 1^{er}; 3^e très long, au bout de la largeur des suivants, presque aussi long que les 3 voisins ensemble, 4^e et 5^e aussi longs que larges, 6-8 légèrement transverses, s'élargissant mais peu; massue bien séparée, à articles d'égale largeur; les 2 1^{ers} en carré transverse, le dernier plus long que large, obliquement acuminé d'un côté. Tête assez large, à peine ponctué, mandibules ♂ simples. Prothorax fortement transverse, tous les angles arrondis, la plus grande largeur tombant au milieu; bord postérieur presque droit. Elytres avec la suture étroitement d'un brun clair, la pointe plus claire et la strie suturale enfoncée remontant au-dessus du milieu. Dessous, antennes et pattes

brun-rouge, finement et peu pubescents. Mésosternum extrêmement court ♂, bord postérieur marqué d'une fossette au milieu, garnie d'une courte tomentosité brune. Cuisses simples, tarses ♀ 5,4,4 articles. — Du groupe de *atrum*, *seminulum* et *levigatum*, il se distingue des 2 1^{ers} par le dessus non ponctué, du dernier par la strie suturale remontant au dessus du milieu. Il diffère de *badium*, *nigripenne*, *siculum* et *Leprieuri* par une coloration foncée, et enfin du *pisanum* par sa coloration uniforme, les cuisses du ♂ simples, et de toutes les espèces de ce groupe par la sculpture du dessus alutacée.

52. AGATHIDIUM CASPICUM Reitr. Brünn, Naturf. Ver. xxii. 1883. Sépar. 1^o. 2. — Long. 1,5-2 mill. — Caspienne, Lirik.

Petit, convexe, noir de poix, luisant, très finement alutacé, à peine distinctement ponctué, antennes, palpes et pattes d'un roux-ferrugineux, élytres avec les épaules obtusément arrondies, strie suturale obsolète, marquée sur leur moitié postérieure.

53. AGATHIDIUM BOHEMICUM Reitr. Brünn. 1884. — Bestim. Tabel. 113^o. — Long. 2,8-3 mill. — Forêts de Bohême.

Brun-noir en dessus et brun-ferrugineux en dessous. Antennes jaunes unicolores, à 3^e article près de 2 fois aussi long que le 2^e, et aussi long que les 3 voisins pris ensemble. Elytres densément et très distinctement ponctuées, une strie suturale à peine marquée au sommet. Cuisses postérieures du ♂ avec une saillie dentiforme au bout. — Se distingue de l'*atrum* par l'absence de strie suturale.

54. AGATHIDIUM OPUNTIAE Reitr. Brünn. 1884. Best. Tabel. 113^o. — Long. 2,1-2,4 mill. — Grèce, Iles Ioniennes, sous les feuilles d'*Opuntia*.

Grand, dessous rouge-brun, noir, les bords du prothorax lavés de rouge-brun. Antennes avec les 2 pénultièmes articles noirs. Elytres distinctement ponctuées, une strie suturale à peine marquée au bout. Cuisses postérieures ♂ presque tronquées au bout, formant en dessous une petite dent aiguë. — Entièrement comme l'*escorialense*, si ce n'est que ce dernier est plus petit, a le ventre noir, les élytres très finement pointillées, et les 2 avant-der-

niers articles des antennes à peine ou peu plus foncés ; les cuisses postérieures ♂ sont arrondies au bout, avec un denticule obtus en dessous près de l'extrémité.

55. AGATHIDIUM BANATICUM Reitr. Best. Tabel. 1884. 113*. — Long. 1,8-3 mill. — Resicza.

Noir, avec l'extrémité des élytres d'un brun rougeâtre, lisse, sans strie suturale. Antennes unicolores. Epistome non séparé du front par une ligne transverse. Tarses ♀ de 4, 4, 4 articles. — Se distingue du *nudum*, qui a l'épistome séparé par une ligne arquée transverse, souvent peu marquée, dont la couleur est rouge-brunâtre, avec les antennes jaunes terminées par une massue d'un rouge ferrugineux.

56. AGATHIDIUM AGLYPTOIDES Reitr. Brünn. Best. Tabel. 1884. 114*. — Long. 1,2 mill. — Croatie, Lika.

Très petit, comprimé latéralement, très fortement convexe, rouge-ferrugineux ; antennes jaunes, grêles, 2^e article allongé, à peine plus menu que le 1^{er}, 8^e fortement transverse, bien plus large que le 7^e, massue rouge-ferrugineux, au moins 3 fois aussi large que le funicule, dernier article presque plus large que le précédent. — Epistome séparé du front par une ligne arquée transverse souvent marquée. Elytres lisses, sans strie suturale. Tarses ♂ avec 4, 4, 4 articles. — Diffère de *nudum*, qui est plus grand, jaune-rouge, rouge-ferrugineux ou brun-ferrugineux, plus rarement noirâtre, dont les antennes normales ont les 7-8 articles fortement transverses, de même forme et de même largeur, la massue seulement 2 fois plus épaisse que le funicule, à dernier article presque plus étroit que le précédent.

57. AGATHIDIUM BRISOUTI Reitr. Deuts. Ent. Zeits. 1884. 58*. — Long. 2,5 mill. — Kumani (Morée).

Globuleux, luisant, noir, antennes testacées, excepté les 2 pénultièmes articles qui sont noirs, pattes testacées, bouche, côtés du prothorax largement et vaguement d'un roux testacé ; pointillé obsolète sur la tête, à peine visible sur le prothorax, élytres indistinctement ponctuées, presque lisses, strie suturale raccourcie de moitié ; épaules

tronquées obliquement, avec l'angle huméral obtus. — ♂ Tarses avec 5, 5, 4 articles ; antérieurs nullement épaissis, 1^{er} article des antennes légèrement épaissi, ovale-oblong, 2^e un peu plus étroit, oblong, 3^e allongé, plus étroit et un peu plus long que le 2^e, 4, 5 obconiques, à peine plus longs que larges, 6^e un peu transverse, 7, 8 transverses, subdentés en dedans ; les trois derniers abruptement plus grands, de même largeur, 9^e presque carré, 10^e légèrement transverse, dernier en ovale allongé, près de deux fois plus long que le précédent, métasternum marqué au milieu d'une fovéole obsolète, finement fasciculée. ♀ Tarses simples, avec 5, 4, 4 articles ; antennes plus menues, 1^{er} article oblong, légèrement épaissi, 2^e peu plus étroit, faiblement plus long que large, les suivants plus étroits, 3^e allongé, 4-5 obconiques, non transversés, 6-8 subglobuleux, massue plus grande, abrupte, allongée, 9-10 presque carrés, 11^e acuminé, à peine plus étroit et 1 1/2 fois plus long que le précédent. — Voisin des *pallidum* et *varians*, il s'en éloigne par la conformation des antennes et sa couleur d'un noir uniforme, avec les côtés du prothorax largement rouges.

58. AGATHIDIUM WANKOWICZI Hoch. Mosc. Bul. 1872. 212. 7*. — Long. 1 mill. — Russie méridionale.

Ressemble à première vue au *nigripenne* pour la forme et les couleurs, mais il est 2 fois aussi grand et surtout plus large. Sa place naturelle est près du *marginatum*, les élytres sont coupées droit à la base, les angles huméraux droits, et tous les tarses ♀ de 4 articles. — C'est la plus grande espèce connue ; parallèle, légèrement convexe, un peu arrondi devant et derrière ; rouge-brun ; poitrine, milieu du prothorax et les 3 articles de la massue des antennes brun-marron clair. Élytres d'un noir luisant. Tête et pronotum assez densément et distinctement ponctués, les élytres un peu plus fortement, et vers les côtés les points sont encore plus gros, rapprochés, en séries régulières, les stries sont légèrement marquées ; on ne voit pas trace de strie suturale.

59. AGATHIDIUM PICEUM Er. Nat. Ins. III. 1845. p. 101. 8*. — *globosum* Muls. Op. 12. 125. — *convexum* Sharp. Bris. 189. —

— Long. 1,8 mill. — Europe médiane boréale, France, Angleterre, Brunswick.

Forme du *mandibulare*, mais un peu plus petit, brun-rouge foncé, très luisant. Antennes rouge-brun clair. Tête à points écartés et extrêmement fins, mandibule gauche très allongée ♂, en forme de faucille, très courbée en avant et en haut. Prothorax presque de la largeur des élytres, très éparsément ponctué sur le dos, un peu plus densément vers les côtés, très finement, fortement arrondi aux angles et aux côtés. Ecusson lisse. Elytres un peu éparsément et très finement ponctuées, strie suturale remontant de l'extrémité au milieu. Dessous et pattes brun-clair.

60. AGATHIDIUM TENUICORNE Reitr. Brünn. 1884. Sépar. 114*. — Long. 2,6 mill. — Caucase : Meskisch.

Rouge-ferrugineux unicolore ; grand, hémisphérique. Antennes à 2^e article ovale, de moitié plus court que le suivant, les 2 pénultièmes articles pas ou peu rembrunis, carrés ♀, transverses ♂. Mandibules ♂ simples. Epistome tronqué droit ou légèrement bisinué au bord antérieur, simple, fortement abaissé, séparé du front au moins par une ligne obsolète. Elytres avec une strie suturale, remontant vers le milieu, très rapprochée de la suture, très finement mais distinctement ponctuées. — Très voisin du *Brisouti*, il s'en distingue par sa couleur d'un rouge ferrugineux uniforme, les 2 pénultièmes articles des antennes non foncés, et l'épistome fortement abaissé.

61. AGATHIDIUM NASICORNE Reitr. Brünn. 1884. 115*. — Long. 2,5 mill. — Lenkoran : Lirik.

Plus grand, prothorax un peu plus étroit que les élytres. Elytres (à épaules presque rectangulaires) finement ponctuées, dernier article des antennes un peu plus étroit que le pénultième. Front du ♂ muni près du bord antérieur d'un petit tubercule plus ou moins distinct ; tarses grêles. Les grands ♂ ont la mandibule gauche élargie, et le côté interne est armé d'une longue corne horizontale, non élevée, mais appuyée sur le bord antérieur de la tête. Noir, prothorax brun-noir, bords, ainsi que les antennes (à l'exception de la massue, qui est brune) et

les pattes d'un rouge ferrugineux. — Se place entre le *rotundatum*, qui est plus petit, dont le prothorax n'est pas plus étroit que les élytres, celles-ci assez fortement et densément ponctuées, le front ♂ sans tubercule et le dernier article des antennes pas plus étroit que le pénultième — et le *nigriceps*, dont la couleur est d'un jaune rouge, avec la tête un peu plus foncée, et dont les élytres ont une ponctuation très fine et clair-semée.

62. AGATHIDIUM BESCIDICUM Reitr. Brünn. 1884. Sépar. 115*. — Long. 2 mill. — Silésie, Beschide, Caucase.

D'un brun ferrugineux, presque unicolore, semblable au *badium*. Front sans fossette entre les yeux ; épistome non séparé, à bord antérieur tronqué ou bisinué, simple. Antennes avec la massue plus ou moins obscure, 2^e article court, arrondi, 2 fois plus court que le 3^e. Elytres fortement ponctuées, avec une strie suturale, fortement rapprochée de la suture et remontant jusqu'au milieu. Tarses ♀ avec 5, 4, 4 articles. — Il se range à la suite du *pulchellum* par sa couleur brun-ferrugineux presque unicolore, au lieu d'avoir, sur un fond jaune-rouge, la tête, 2 taches rapprochées sur le pronotum, les côtés et une tache commune centrale sur les élytres, noirs, et par l'absence des 2 légères fossettes interoculaires, qu'on remarque dans celui-ci.

63. AGATHIDIUM ROTUNDULUM Reitr. Brünn. 1884. Sépar. 116*. — Long. 1,8 mill. — Tyrol, Servie, Corse, Caucase.

Petit, noir, prothorax étroitement bordé de jaune-brun, à peine aussi large que les élytres. Deuxième article des antennes court, arrondi, 2 fois plus court que le 3^e. Tarses ♀ de 5, 4, 4 articles. Bord antérieur du prothorax tronqué droit ou légèrement bisinué, simple. Elytres avec une strie suturale rapprochée de la suture, remontant jusqu'au milieu. — Confondu avec le *confusum*, il s'en distingue par sa petite taille, les dimensions des 2-3 articles des antennes ainsi que par son épistome non échancré. Il a, comme le *mandibulare*, les élytres indistinctement ponctuées, et la massue des antennes foncée ; mais non l'épistome plus ou moins séparé du front par une fine ligne transverse arquée, la couleur brun-noir, avec les

bords du prothorax brun-rouge clair, le prothorax grandement aussi large que les élytres.

64. AGATHIDIUM RUBICUNDUM Reitr. Deuts. Ins. 1878. 47*. — Long. 3-3,3 mill. — Carpathes, Raho.

Ressemble à un très grand *badium*, mais il s'en éloigne par ses antennes tout autrement formées et colorées, par ses élytres pourvues d'une strie suturale remontant jusqu'au milieu, et la coupe des épaules. — En entier d'un rouge-brun, très luisant. Antennes assez grêles, rouge-jaune, massue, surtout les deux premiers articles, brun-noir, 1^{er} article du funicule épaissi, fortement dilaté-arrondi en dehors, 2^e petit, aussi long que large, de la largeur des voisins, 3^e long, près de 3 fois aussi long que le 2^e, 4^e plus long que large, 5^e aussi long que large, 6-8 transverses, saillants en pointe en dedans, 8^e article des plus étroits, 6^e un peu plus petit que son voisin; massue bien séparée, d'égale largeur, les deux premiers articles légèrement transverses, quadrangulaires, le dernier plus long que large, obtusément arrondi au bout; articles du funicule 3-5 un peu élargis en bosse en dedans. Tête grande, très finement ponctuée, avec les joues élargies au-dessous des yeux; front creusé transversalement au bord postérieur, tout au devant du prothorax. Celui-ci à peine de la largeur des élytres, près de 4 fois aussi large que long, arrondi sur les côtés avec tous ses angles, angles antérieurs formant une saillie arrondie à cause de la sinuosité que présente de chaque côté le bord antérieur; bord postérieur droit au milieu, dos très densément et on ne peut plus finement ponctué partout. Ecusson très petit, triangulaire, à peine ponctué, Elytres droites en dehors des épaules, obliquement tronquées, avec l'angle huméral obtus mais en pointe, dos plus distinctement et moins densément ponctué que le prothorax, avec la strie suturale bien marquée remontant de la pointe jusqu'au milieu. Dessous presque mat, très finement pubescent. Mésosternum très court, avec une légère carène longitudinale. Métasternum 4 fois aussi large qu'à sa place la plus étroite; ♂ il y a, un peu au-dessus du milieu, un pinceau de poils brun-jaune,

très petit mais distinct, et les tarsi antérieurs sont légèrement élargis ; ♀ tarsi antérieurs de 5 articles, les 4 postérieurs de 4 ; mandibules simples. — Se range près du *globosum* Muls. (*convexum* Sharp), se distingue de toutes les autres espèces du groupe par son corps rouge-brun unicolore et sa taille considérable ; le *nudum* Hampe n'est pas ponctué et n'a pas de strie suturale.

65. AGATHIDIUM VITTATUM Mots. Bul. Mosc. 1839. 53*. pl. 1. f. F.
— Long. 2,3 ; larg. 1,3 mill. — Sabui au pied du Caucase sur les bolets.

Forme du *globus* Illig. Globuleux, glabre, très luisant, d'un rouge testacé, 1-4 articles des antennes, tête et élytres noires, avec une épaisse bande testacée. Tête noire, luisante, mandibules, labre et palpes jaunâtres ; yeux grands et foncés. Antennes fortement en massue et de la longueur du prothorax, 1^{er} article cylindrique et plus gros que les suivants, dont 5 sont moniliformes et jaunes, au 7^e commence la massue qui est noire et 3 fois plus large que le 1^{er}, 11^e grand, un peu globuleux et de la couleur du prothorax. Prothorax jaune-rougeâtre, convexe, presque en demi-lune et entièrement lisse, vers les élytres il est 2 fois plus large que la tête et les côtés s'arrondissent vers celle-ci, sa longueur ne dépasse pas la moitié de celle des élytres et le tiers du corps entier. Ecusson distinct, triangulaire, noir. Elytres un peu plus larges que le prothorax, globuleuses et pointues à l'extrémité, noires, chacune ayant dans son milieu une large ligne longitudinale d'un jaune-rougeâtre, bien distincte, qui remonte en s'élargissant de l'extrémité à la base ; une strie longe la suture sur la moitié postérieure. Dessous foncé, poitrine et abdomen jaunâtres ; pattes d'un jaune-rougeâtre plus obscur que le prothorax, cuisses noires avec les côtés intérieurs ciselés.

66. AGATHIDIUM ARCTICUM Thoms. Skand. Col. iv. 54*. 9. —
Long. 2,3 mill. — Laponie.

Ressemble beaucoup au *discoideum* par la structure du prothorax, mais d'une coloration différente, stature presque du *Liodes castanea*. — Tête subtriangulaire, de la longueur du prothorax, noire luisante, presque lisse,

front marqué par derrière d'une impression transverse plus légère, finement pointillée derrière les yeux, labre et mandibules noir de poix. Antennes brunes, 2^e article à peine 2 fois plus court que le 3^e, massue noir-brun, dernier article plus de 2 fois plus long que le pénultième qui est à peine transverse. Prothorax plus étroit que les élytres, sinué de chaque côté au sommet avec le lobe médian saillant, angles antérieurs aigus projetés, à pointe arrondie; côtés rétrécis vers le sommet, droits, tronqué à la base, avec les angles postérieurs obtus; convexe fortement en travers, et peu dans la longueur, points peu nombreux sur le disque, denses et fins sur les côtés, noir luisant, à limbe brunâtre. Ecusson triangulaire, noir, luisant, finement pointillé. Elytres 2 fois plus longues que le prothorax, à pointe un peu défléchie au bout, à épaules droites, noires, luisantes, finement pointillées, strie suturale atteignant le milieu. Dessous du corps noir; abdomen à pattes brunes; ♂ tarses antérieurs simples.

67. AGATHIDIUM HELLENICUM Reitr. Brunn. 1884. Sépar. 116*. — Long. 2,1 mill. — Grèce.

Voisin du *plagiatum* Gyl., auquel se rapporte le *vittatum* Mots., il a, comme celui-ci, le 7^e article des antennes bien plus large que le 8^e, les 2 pénultièmes articles sombres, la tête très large, avec un petit renflement derrière les yeux, le bord antérieur de l'épistome largement et assez profondément échancré, les élytres lisses, avec une strie suturale qui remonte très près de la suture jusqu'au milieu; il est noir comme lui, mais au lieu d'avoir les bords du prothorax et une large bande longitudinale sur chaque élytre d'un rouge de sang, c'est à peine s'il a au prothorax une étroite bordure brun-jaune.

Sous-Genre *Ancibaris* Reitr. Rev. Mens. d'Ent. Pet. 1883. 111. Brunn. 1884. 110.

Tête grande, tempes longues, parallèle; yeux très petits, allongés, obliques, peu saillants; labre très court, linéaire; mésosternum plus ou moins fortement caréné; élytres sans rangées de points; massue des antennes de 3 articles; article 7^e des antennes plus grand et plus

large que ses adjacents ; angles postérieurs du prothorax en pointe ; mésosternum muni d'une haute carène ; hanches intermédiaires séparées par une saillie triangulaire du métasternum, qui est rudimentaire. — Ressemble à un petit *Agathidium*.

68. ANSIBARIS ALEXIIFORMIS Reitr. Brünn. 1844. 110*. — Long. 1,5 mill. — Caucase, Swanetie.

Hémisphérique, comprimé latéralement, très convexe, brun-rouge, antennes et pattes plus claires, lisse, prothorax non abaissé ; élytres sans strie suturale.

CLAMBIDÆ.

1. — *Cybocephalus* Er.

PHANTAZOMERUS Duv. — STAGANOMORPHA Wol.

A. Tout d'une couleur métallique foncée.

B. Dessus à fond très fortement alutacé-réticulé.

C. Plus grand, vert-bronzé mat, un peu luisant, pattes noires, antérieures brun-noir, dos des élytres sans stries. — Long. 1,5 mill.

Rép. 128. 1. *metallicus* Baudi Cauc. Syr.

C'. Plus petit, noir, avec une teinte bronzée distincte, pattes brun de poix, antérieures jaune-brun ; dos des élytres avec une strie marquée sur les côtés. — Long. 1 mill. Rép. 128. 2. *seminulum* Baudi Cauc. Syr.

B'. Dessus à fond très finement et indistinctement alutacé-réticulé, presque lisse.

C. D'un vert métallique unicolore, tarses d'un brun de poix foncé, antérieurs et antennes jaune-brun, élytres avec des stries marquées. — Long. 0,8 mill.

3. *viridiæneus* Rtr. Eur.

C'. Bronzé brillant unicolore, pattes métalliques. — Long. 0,8 mill. Rép. 129. 4. *æneus* Reiche Alg.

C''. Violet métallique, tête ♂ vert-bronzé, pattes brun de poix foncé, jambes, tarses, pattes antérieures et antennes jaune-brun. — Long. 1 mill.

Ab. 13. 191'. 5. *micans* Rtr. Eryp.

A'. Au moins élytres noires.

B. Tête ♂ métallique.

C. Tête et bord antérieur du prothorax ♂ distinctement métalliques.

- D Tête et bord antérieur du ♂ d'un bronzé obscur.
(Élytres alutacées aciculées.)
- E. Noir, convexe, antennes et pattes brun de poix, élytres couvertes de points à 3 stries courtes, divergentes par derrière, avec des stries marquées.
— Long. 1,1-1,2 mill. 6. *pulchellus* Er. Eur^a. méd.
- E'. Plus grand, presque carré, avec les angles arrondis, noir avec un reflet d'éclat bronzé, aplati par derrière, jambes antérieures brunes, élytres simplement ponctuées, sans stries. — Long. 1,2-1,4 mill.
7. *syriacus* Rtr. Syr.
- D'. Tête et bord antérieur du prothorax ♂ d'un vert émeraude brillant.
- E. Bord antérieur du prothorax ♂ largement d'un vert émeraude; élytres simplement ponctuées.
- F. Plus grand, court et large ovale; élytres avec des stries marquées, fortement obtuses au sommet, subtronquées. — Long. 1,1 mill.
diadematus Chevr. 8. *festivus* Er. Eur. Alg.
- F'. Plus petit, ovale, très convexe, élytres sans stries, arrondies au sommet. — Long. 0,8 mill.
9. *smaragdifrons* Rtr. Alg.
- E'. Bord antérieur du prothorax ♂ étroitement vert émeraude, mais brillant; ponctuation des élytres à 3 strigosités au milieu, élytres avec des stries marquées. Noir, en ovale court, très convexe. Élytres non tronquées au sommet. — Long. 1 mill.
10. *hispanicus* Rtr. Es.
- C'. Tête ♂ d'un vert émeraude, prothorax tout noir, ou seulement l'extrême bord antérieur avec un léger éclat métallique.
- D. Ponctuation des élytres à 3 strigules; stries marquées. — Long. 1,3 mill. 11. *Heydeni* Rtr. F^a.
- D'. Ponctuation des élytres simples. — Long. vix 1 mill.
12. *Reitteri* Uhag. E.
- B'. Tête ♂ jaune. Élytres sans stries.
- C. Tête du ♂ jaune, tout le prothorax brun-jaune. Noir, antennes et pattes jaunes. — Long. 1 mill.
Ab. 13. 191'. 13. *flaviceps* Rtr. Egyp.
- C'. Tête ♂ jaune. Prothorax tout au plus avec une étroite bordure jaune.

D. Plus grand, dessus obsolètement réticulé alutacé ; élytres très finement mais distinctement à points tristrigulés. Pattes brunes. ♂ Tête jaune. Pattes antérieures rouge-brun. — Long. 1,1 mill.

(*exiguus* Shlb.) 11. *politus* Germ. Eur^a. méd.

D'. Plus petit, dessus distinctement, élytres assez fortement alutacées-réticulées, à peine visiblement ponctuées. Pattes brun-rouge. ♂ Tête brun-rouge, Pattes antérieures jaunes. — Long. 0,9 mill.

15. *rufifrons* Rtr. Eur^a.

C". Tête, ainsi que le dessus, noire unicolore dans les 2 sexes.

D. Petit, ovale court et large, très convexe, fort luisant ; élytres à points fins, écartés, simples, à fond lisse par devant, légèrement alutacé-réticulé par derrière ; antennes et pattes brunes, jaune-brun ♂. — Long. 0,8 mill. — (*politus* Er. — *atomus* Bris.)

Rép. 130. 16. *similiceps* Duv. F^a. E. Syr.

D'. Beaucoup plus grand, légèrement convexe, brun-noir, élytres très finement ponctuées, à fond fortement alutacé-réticulé, pattes brun de poix, antérieures et antennes jaune-brun. — Long. 1,5 mill.

Ab. 13. 194'. 17. *membranaceus* Rtr. Egypt.

1. CYBOCEPHALUS MICANS Reitr. Ab. XIII. Nouv. 48°. 191'. — Brunn. 1873. Sépar. 4. 2°. — Long. 1 mill. — Egypte.

Ovale court, convexe, noir bronzé, luisant, finement alutacé, pointillé très fin, clair-semé, marge latérale du prothorax et apicale des élytres finement bordées de flave, jambes et pattes antérieures d'un testacé de poix, extrémité des élytres obtuse-arrondie.

2. CYBOCEPHALUS PULCHELLUS Er. Nat. Ins. III. 1845. 218. 3°. — Reitr. Brunn. 1874. Sépar. 7. 13. — *anceps* Duv. Soc. Ent. Fr. 1854. 38. — Long. 1 mill. — Europe : Autriche.

Noir, luisant, tête à l'exception du vertex et une étroite bordure au bord antérieur du pronotum d'un bronzé obscur ; bord latéral du prothorax et apical des élytres transparents jaunâtres, antennes, tarsi (fusse) brunâtres. Tête et prothorax à points clair-semés et extrêmement fins ; élytres aussi marquées de fins points écartés,

et paraissant à un fort grossissement très densément et finement alutacées-strigieuses. Dessous très finement pubescent de gris. Elytres coupées un peu obliquement par derrière, et chacune formant près de la suture une pointe obtuse.

3. CYBOCEPHALUS SYRIACUS Reitr. Deuts. Zeits. 1878. 91. 1*. — Long. ♂ 1,1-1,2; ♀ 1,4 mill. — Syrie, Chypre.

Carré long, convexe fortement par devant, peu vers l'extrémité des élytres qui est tronquée, noir avec un léger reflet verdâtre, à fond finement alutacé-aciculé et finement ponctué, rebord étroit du prothorax et marge apicale des élytres jaune-brun, pattes antérieures brun-pâle. ♂ Tête et bord antérieur du pronotum d'un bronzé obscur très indistinct. — Se distingue par sa taille et particulièrement par le léger reflet verdâtre du corps, qui est noir. — Vient après *seminulum*.

4. CYBOCEPHALUS FESTIVUS Er. Nat. Ins. 1845. III. 218. 2*. — Reitr. Brünn. 1873. 6. — *diadematus* Chev. Guér. Rev. zool. 1861. 265. — Long. 1 mill. — Europe, Algérie.

Taille et faciès de l'*exiguus*. Noir luisant; tête et bord antérieur du prothorax d'un vert émeraude luisant; prothorax large au milieu et arrondi en arc par derrière, rétréci vers les angles et formant seulement aux angles antérieurs une étroite bordure jaunâtre; bord latéral avec une étroite bordure jaunâtre transparente; antennes, pattes antérieures et tarsi postérieurs jaune-brunâtre. Tête et prothorax très éparsement et finement ponctués, les élytres assez densément et finement. Dessous finement pubescent de gris. Elytres très obtusément arrondies chacune au bout.

5. CYBOCEPHALUS HEYDENI Reitr. Har. Col. Hefte xii. 1875. 56*. — Long. 1,3 mill. — France méridionale: Hyères.

Ovale-globuleux court, fort convexe, noir luisant, subtilement alutacé; tête et pronotum ponctués de points très petits à peine perceptibles; élytres finement pointillées; bord latéral du prothorax et apical des élytres finement testacés; antennes et pattes noires. — ♀ Concolore; ♂ marge antérieure de la tête et du prothorax finement verte; peu luisants. — Considérablement plus

grand que le *festivus* Er., la tête verte ♂ et le bord antérieur du pronotum bien moins brillant; le dessus plus distinctement alutacé-réticulé; la ponctuation des élytres comme dans le *pallidus*; dessous, antennes et pattes entièrement noirs.

6. CYBOCEPHALUS FLAVICEPS Reitr. Ab. XIII. Nouv. 48°. 191'. — Brünn. 1873. 8. 14°. — Long. 1 mill. — Egypte.

Ovale court, convexe, noir luisant, à peine alutacé; élytres couvertes de points fins épars, les points distincts avec les intervalles très densément et finement pointillés; bord latéral du prothorax et limbe postérieur des élytres testacés, antennes et pattes flaves. Elytres arrondies séparément au bout. — ♂ Tête et devant du prothorax largement testacés-roux, partie postérieure de celui-ci brune; ♀ noire, tête et prothorax d'un noir de poix. — S'éloigne du *politus* par la couleur du prothorax, des antennes et des pattes et par son prothorax à peine alutacé-aciculé; il lui ressemble beaucoup, mais il est beaucoup plus petit.

7. CYBOCEPHALUS RUFIFRONS Reitr. Ab. XIII. Nouv. 48°. 193'. — Brünn. 1873. 9. 16°. — Long. 1 mill. — Europe méridionale, sud de la France, Espagne.

Ovale court, convexe, noir, luisant, tête et prothorax très finement alutacés; élytres finement et peu densément pointillés, intervalles des points très finement et densément pointillés, subalutacé, marge latérale du prothorax et postérieure des élytres finement testacées, antennes et pattes roux de poix. — ♂ Tête et une marge très fine du prothorax ainsi que les pattes postérieures roux de poix, antennes et pattes antérieures rousses. — ♂ Tête concolore. — Pourrait se réunir à l'*exiguus*, seulement il est toujours plus petit, un peu moins convexe, ponctuation moins distincte, d'ailleurs semblable; antennes et pattes plus claires; au contraire la tête ♂ est seulement rouge-brun et souvent la couleur claire de la tête est limitée sur le front.

8. CYBOCEPHALUS MEMBRANACEUS Reitr. Ab. XIII. Nouv. 48°. 194'. — Brünn. 1873. 11. 24°. — Long. 1,5 mill. — Egypte.

Allongé, légèrement convexe, noir de poix, luisant, for-

Nouveau Répertoire III. — 1884.

tement alutacé, finement pointillé, bord latéral du prothorax étroit, postérieur des élytres assez large, antennes et pattes antérieures testacées, 4 pattes postérieures brun de poix ; élytres tronquées-arrondies au bout.

9. CYBOCEPHALUS SPHÆRULA Wol. Ins. Mad. 1854. p. 484. pl. 10. f. 8. — Cat. Col. Can. 116. 181*. — ♀ *unicolor* Wol. Ins. Mad. 1854. p. 485. — Cat. Mad. Col. 148. — Long. 1-1,3 mill. — Madère, Canaries (toutes les îles).

Brièvement ovale, noir (ou noir un peu bronzé), luisant, densément alutacé ; prothorax très finement et rarement pointillé, d'une couleur obscure un peu claire ; élytres (surtout par derrière) assez distinctement pointillées ; antennes et pattes assez courtes, d'un testacé obscur. ♂ Tête et prothorax d'un testacé clair. — Diffère de *exiguus* par sa taille plus petite, le bord postérieur plus sinué ou concave, ce qui fait paraître les angles moins arrondis, et par sa surface beaucoup plus grossièrement alutacée et avec des points très écartés, plus visibles.

2. — *Clambus* Fisch.

A. Dessus lisse (à un très fort grossissement couvert de petits poils pulvérulents très rapprochés).

B. Plus grand, ovale, noir, côtés du prothorax jaunâtres, dos des élytres rouge-ferrugineux clair, parfois rouge-ferrugineux ou brun-marron unicolore. Dernier article des antennes bien plus long que large. Dernier segment ventral avec un pinceau de poils allongé, et avec une petite fossette ♂. — Long. 1 mill.

1. *minutus* Stm. Eur. Afr^a.

B'. Beaucoup plus petit, rond, noir, côtés du prothorax jaunâtres, élytres d'une teinte plus claire, ou entièrement brun-marron, rouge-ferrugineux ou jaunes ; dernier article des antennes aussi long que large ; dernier segment ventral glabre. — Long. 0,8 mill.

2. *punctulum* Gyl. Eur. As. Afr.

A'. Dessus vêtu d'une fine pubescence, distincte.

B. Pubescence distinctement mais légèrement relevée, non entièrement couchée.

C. Plus grand, noir, côtés du prothorax et dos des ély-

tres jaune-rouge, pubescence jaune. Dernier segment ventral gainé au bout d'une pubescence jaune d'or serrée. — Long. 1,3 mill. 3. *pilosellus* Rtr. A. Cauc.

C'. Petit, noir, côtés du prothorax très étroitement bordés de jaunâtre, pubescence gris-blanc; dernier segment ventral plus densément pubescent au bout.

— Long. 0,9 mill. 4. *armadillo* De G. Eurⁿ. méd.

B'. Pubescence extrêmement fine, pulvérulente, couchée.

Noir ou brun, côtés du prothorax, dos et aussi ordinairement sommet des élytres plus clairs. Dernier segment ventral avec un petit pli longitudinal. — Long.

0,6 - 0,7 mill.

5. *pubescens* Redt. Eurⁿ. FAR.

10. CLAMBUS PILOSELLUS Reitr. Deuts. Zeits. 1876. 289*. — Long. 1,1 mill. — Caucase.

Ovale subglobuleux, brun de poix, luisant, assez densément vêtu de petits poils fauves, à peine perceptiblement pointillé, côtés du prothorax, élytres vers l'extrémité peu plus clairs, antennes et pattes d'un flave de poix. — Un peu plus grand que l'*armadillo*, à pubescence plus dense, plus longue, distinctement redressée, jaunâtre, couleur se rapprochant plus de celle des *Calypomerus*, ce qui le distingue des autres espèces connues.

11. CLAMBUS ARMADILLO De Geer. Mém. iv. 1774. 220. — Gyl. Ins.

Suec. i. 190. — Fairm. Fn. Fr. i. 327. — Duv. Gen. Col. i. pl. 38.

f. 188. Glanur. 24. 1*. — *convexus* Marsh. Ent. Brit. 1802. 73.

— *atomarius* Stm. Deuts. Ins. 1807. II. 65. — *punctulus* Beck.

Beyt 1817. 8. — Long. 0,8 - 1 mill. — Europe, détritus de végétaux.

Ovale-globuleux, fortement déclive en arrière, visiblement atténué, subacuminé-obtus au sommet; noir plus ou moins profond, luisant, très imperceptiblement pointillé, entièrement vêtu d'une très fine pubescence grisâtre, dirigée en arrière et légèrement redressée, peu serrée, très subtile quoique bien distincte. Tête très grande, notablement plus large que longue, largement arrondie en devant, anguleuse de chaque côté avec les yeux en arrière; bouche testacée-roussâtre. Antennes d'un testacé un peu brunâtre. Prothorax court, fort transverse, un peu plus large que la tête, aussi large que les élytres à la base, convexe, très déclive sur les côtés, qui sont arron-

dis, ainsi que tous les angles, bordé vaguement et étroitement de roux-testacé. Elytres largement coupées obliquement à la base, à épaules très obtuses. Dessous noir-brunâtre, hanches postérieures finement bordées de roussâtre, pattes testacées.

12. *CLAMBUS PUBESCENS* Redt. Fn. Aust. 1849. 158 et 1857. 298. — Fairm. Fn. Fr. 1855. 327. — Duv. Glan. 25. 2*. — ? *coccinelloïdes* Steph. Ill. Brit. Col. II. 184. — Long. 0,8 mill. — France : Paris ; Autriche ; vieux fagots et détrit.

Un peu en ovale globuleux, fortement déclive en arrière ; graduellement et faiblement atténué par derrière, obtus au sommet, noir-brun ou brun de poix, imperceptiblement pointillé, entièrement vêtu d'une pubescence grisâtre très subtile, très courte, couchée, assez serrée, produisant un léger aspect soyeux. Tête de l'*armadillo*, antennes testacées comme la bouche, massue brunâtre. Prothorax conformé comme celui de l'*armadillo*, mais un peu moins fortement arrondi sur les côtés et un peu moins largement aux angles postérieurs ; bordé largement sur les côtés de testacé, se fondant avec la couleur du disque. Elytres coupées largement et obliquement de chaque côté à la base, épaules en angle large et émoussé, d'un ferrugineux obscur, avec la base et le bord latéral bruns. Dessous d'un noir de poix ; hanches postérieures largement bordées de roux-testacé, pattes d'un testacé pâle. — Plus petit, plus court et moins atténué en arrière que l'*armadillo*, il s'en distingue par sa pubescence couchée, très courte, mais un peu plus serrée.

13. *CLAMBUS MINUTUS* Sturm. Deuts. Ins. II. 1807. 64. — Gyl. Ins. Suec. IV. 514. — Fairm. Fn. Fr. 327. — Duv. Glan. 26*. — *armadillus* Rdt. Fn. Aust. 1849. 158, et 1857. 298. — *nigriclavus* Steph. Ill. Brit. Col. V. 404. — Long: 1-1,2 mill. — Angleterre, Suède, France, Autriche ; Algérie.

Fort subhémisphérique-globuleux, très fortement déclive en arrière, atténué tout-à-fait au sommet qui est obtus acuminé. Tête comme dans les précédents ; bouche et antennes testacées ou roussâtres ; massue plus ou moins brune. Prothorax comme dans *armadillo* avec une bordure latérale large, et basale étroite, ferrugineuses.

Elytres largement coupées obliquement de chaque côté de la base, épaules en angle très obtus et émoussé, d'un ferrugineux obscur sur le disque. Dessous noir, hanches postérieures ferrugineuses, pattes plus ou moins brunes ou roussâtres. — Quelquefois la couleur ferrugineuse envahit tout le dessus, et les pattes sont testacées.

14. CLAMBUS PUNCTULUM Gyl. Ins. Suec. iv. 1827. 515. — Fairm. Fn. Fr. 328. — Duv. Glan. 27. 4°. — *nitidus* Steph. III. Brit. Col. v. 405. — Long. 0,8 mill. — Angleterre, Allemagne, Suède, France : Montpellier, Fontainebleau ; Afrique, Asie.

Subhémisphérique-globuleux, déclive en arrière, graduellement et faiblement atténué postérieurement, obtus au sommet ; noir-obscur ou un peu brunâtre, très luisant, lisse, glabre en dessus. Tête comme dans les précédents, bouche ferrugineuse ; antennes testacées, massue un peu brunâtre. Pronotum comme dans l'*armadillo*, mais un peu plus étroit sur les côtés, angles postérieurs aussi fortement et largement arrondis, avec une étroite bordure latérale d'un roux testacé. Elytres largement coupées obliquement de chaque côté à la base, épaules à angle obtus et mousse, plus ou moins ferrugineuses à l'extrémité. Dessous noir, hanches postérieures étroitement bordées de testacé, pattes brunes, tarsi d'un testacé pâle.

Var. Pronotum brun, ainsi que la tête, largement bordé sur les côtés de roux testacé ; élytres d'un ferrugineux devenant brunâtre vers la base ; dessous brun-ferrugineux, hanches postérieures largement roux-testacé, pattes testacées.

3. — Loricaster Muls.

A. Elytres très finement pointillées, la ponctuation pas plus forte sur les côtés.

B. Plus grand ; brun-jaune sale ; élytres densément ponctuées avec une fine pubescence serrée. Dessus à fond lisse. — Long. 1 mill. 1. *Viertli* Rtr. Hong^a.

B'. Plus grand ; jaune-rouge vif ; élytres à points très indistincts, obsolètes, à pubescence pulvérulente. Dessus à fond alutacé-aciculé. — Long. mill.

2. *caspicus* Rtr. Lenkor.

3.

- B". Très petit ; jaune-rouge vif, élytres à pointillé très fin, obsolète, difficile à voir. Dessus à fond lisse. — Long. 0,6 mill.
 3. *atomus* Rtr. Syr.
- A'. Elytres ponctuées très finement, mais pas densément, plus fortement sur les côtés derrière les épaules. Dessus couvert d'une pubescence pulvérulente.
 B. Dessus à fond alutacé aciculé. — Long. 0,8 mill.
 4. *testaceus* Muls. F. Dalm.
- B'. Dessus à fond lisse. — Long. 0,6 mill.
 5. *pumilus* Rtr. Cors. Tyr.

15. LORICASTER TESTACEUS Muls. Op. xn. 1861. 135*. — Long. 0,6 ; larg. 0,5 mill. — Mousses et détrit, collines du Lyonnais et du Beaujolais.

Globuleux, très convexe, rouge-testacé un peu brillant, couvert d'une pubescence jaunâtre, courte, couchée, assez épaisse. Tête grande, transverse, réfléchie en dessous, obtuse-arrondie en devant, sensiblement plus étroite que le prothorax, faiblement convexe, d'un roux testacé assez brillant, très finement et très légèrement ponctuée, couverte d'une fine pubescence jaunâtre, couchée, assez serrée, épistome largement et faiblement échancré, bouche testacée ; yeux petits, peu saillants, irréguliers, brunâtres, à facettes très grosses. Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, d'un testacé pâle et luisant, 1^{er} article assez grand, intermédiaires très petits, 3 derniers en massue oblongue, en pointe obtuse au sommet. Prothorax très court transverse, de la largeur des élytres à la base, rétréci en avant, 3 fois plus large que long au milieu, côtés obliques rectilignes, largement et très faiblement échancré au sommet, avec les angles effacés et largement arrondis, subbisiné légèrement à la base avec le milieu obtus-arrondi et les angles presque droits et un peu émoussés, très convexe, roux-testacé assez brillant, points fins et très légers, pubescence jaunâtre couchée, assez serrée. Ecusson petit, triangulaire, roux-brunâtre, assez brillant. Elytres globuleuses, 3 fois plus longues que le prothorax, légèrement arrondies sur les côtés et un peu rétrécies en arrière, roux-testacé, assez brillant, quelquefois un peu plus pâle, pointillé très fin, très léger, assez dense ; pubescence jaunâtre, fine, couchée et assez

serrée; épaules peu marquées. Dessous déprimé, à points très fins et très-légers, à pubescence jaunâtre couchée, assez serrée, roux-testacé avec les sutures des segments un peu plus pâles; hanches arrondies obliquement en dedans, pattes petites, très grêles, finement pubescentes, d'un testacé pâle; 4^e article des tarsi aussi long que les 2 précédents réunis.

4. — *Calyptomerus* Redt.

A. Pubescence serrée pulvérulente, gris-jaunâtre, à reflet soyeux. Corps presque triangulaire, très fortement rétréci par derrière, brun-ferrugineux unicolore, seulement les élytres ont le sommet plus clair, transparent.

B. Elytres à pointillé très dense et fin, rugueux et condensé. — Long. 1,5 mill.

1. *alpestris* Redt. Eur. méd. Cauc.

B'. Elytres ponctuées très densément et finement, un peu ruguleusement au sommet, très obsolètement et bien plus éparsément à la base, presque lisses près des épaules. — Long. 1,2 mill. 2. *caucasicus* Rtr. Cauc.

A'. Pubescence très fine mais simple et plus longue, jaune. Corps jaune-rouge, unicolore, souvent jaune-brunâtre avec la tête, le prothorax et l'extrémité des élytres un peu plus clairs.

B. Corps ovale, assez densément pubescent. — Long. 1-1,1 mill.

3. *dubius* Marsh. Eur.

B'. Corps presque triangulaire, fortement rétréci par derrière, éparsément pubescent. — Long. 0,7 mill.

4. *troglydites* Fvl. F.

16. CALYPTOMERUS ALPESTRIS Redt. Fn. Aust. 1849. 159 et 1874. 298. — Fairm. Fn. Fr. 328. — Fauv. Soc. Ent. Fr. 1861. 575. 1^r. — Long. 1,6 mill. — Grande-Chartreuse; Autriche.

Oviforme, presque triangulaire, très convexe en avant, brillant, brun-roussâtre, prothorax et tête à peine plus clairs, couvert d'une fine pubescence fauve, couchée, très fine et très courte, bien moins serrée que dans le *dubius*, surtout en avant; dernier article des antennes obtus, plus court que le précédent, Prothorax très court, bord postérieur confondu avec les latéraux, angles antérieurs subarrondis. Elytres en triangle subacuminé au sommet,

avec une grande tache ferrugineuse couvrant les 2/3 postérieurs, plus claire à la suture, ce qui fait paraître la base enfumée, à ponctuation extrêmement fine et visible seulement en arrière sous un certain jour ; strie suturale effacée.

17. CALYPTOMERUS CAUCASICUS Reitr. Deuts. Zeits. 1876. 289*.—
— Long. 1 mill. — Caucase, Elisabethopol.

Petit, subovale, atténué au bout, assez luisant, assez densément pubescent, très obsolètement pointillé, d'un ferrugineux obscur, antennes et pattes testacées ; élytres avec une transparence claire au bout. — Très semblable à *l'alpestris*, mais constamment beaucoup plus petit, ponctuation plus dense et encore plus obsolète, pubescence un peu plus longue, etc.

18. CALYPTOMERUS DUBIUS Marsh. Ent. Brit. 234. — Duv. Glan. 29.
— Fauv. Soc. Ent. Fr. 1861. 575. 2*. — *enshamensis* Steph. Ill. Brit. Col. II. 184. — Fairm. Fn. Fr. 328. — Duv. Gen. Col. pl. 38. f. 189. — 3 Per. Fr. Soc. Ent. 1852. 574. pl. 14. f. 1-10. — Long. 1-1,3 mill. — Europe : Angleterre, France.

Ovale, subparallèle, bien plus petit que *alpestris* ; peu luisant, brunâtre ou brun-roussâtre. Prothorax à peine plus clair, et une bande transverse à l'extrémité des élytres peu distincte, d'un ferrugineux obscur. Dernier article des antennes plus long que le précédent, ovale. Entièrement couvert d'une pubescence fauve assez courte, mais bien plus longue et plus écartée que dans *alpestris*. Prothorax un peu plus étroit, angles antérieurs subacuminés. Elytres notablement moins rétrécies en arrière, plutôt subparallèles, subtronquées à l'extrémité, à ponctuation assez fine, mais bien visible sur les 2/3 postérieurs ; strie suturale courte, très rapprochée de la suture, mais distincte.

19. CALYPTOMERUS TROGLODYTES Fauv. Soc. Ent. Fr. 1861. 576.
3*. — Long. 0,6-0,8 mill. — France : Caen, St-Lô.

Voisin du *dubius*, mais se rapprochant encore davantage de *l'alpestris* par sa forme triangulaire ; bien plus petit, brillant, roux-testacé avec la tête et le prothorax rougeâtre, entièrement couvert d'une fine pubescence jaunâtre assez longue, mais bien plus écartée que chez le

dubius, surtout en avant. Prothorax comme chez l'*alpestris*, angles antérieurs presque arrondis. Elytres subtriangulaires, devenant insensiblement plus claires vers le sommet, à ponctuation très fine, et visible seulement sous un certain jour; stries suturales moins courtes, plus marquée. — Confondu avec le *dubius*, il s'en distingue par sa très petite taille, sa forme, la couleur de son prothorax, sa pubescence écartée, etc.

5. — *Bisaya* Reitter.

20. BISAYA NOSSIDIIFORMIS Reitr. Brünn. xxii. 1883. Sépar. 3. 3°. — Long. 1,4 mill. — Caucase : Lenkoran, Lirik ; très rare.

Roux-testacé, antennes, palpes et pattes plus clairs, assez convexe, ovale-oblong, pubescent de fauve, luisant; tête finement, prothorax très finement et obsolètement ponctués; prothorax fortement transverse, fortement rétréci en courbe par devant, angles postérieurs aigus, à pointe un peu saillante, marge basale prolongée au milieu en arc large; élytres ovales, convexes, densément et finement ponctuées, un peu en pointe arrondies au bout, prises ensemble.

CORYLOPHIDÆ.

1. — *Sacium* Le Conte.

1. SACIUM DAMRYI Reitr. Deuts. Zeits. 1884. 58°. — Long. 1,4-1,5 mill. — Corse; Grèce : nord de la Morée, Kumani ; écorce de chêne.

Ovale-oblong, luisant, vêtu d'une pubescence pâle, très fine et serrée, très finement ponctué, noir; prothorax très légèrement transverse, subelliptique, à peine plus étroit que les élytres, base un peu prolongée au-devant de l'écusson, limbe latéral et 2 taches en avant et 2 basales, placés sur une ligne transverse, rapprochées, d'un testacé translucide; élytres oblongues, très peu élargies derrière les épaules, indistinctement plus claires au bout, de petits points simples assez denses; pygidium brun, antennes et pattes rousses, cuisses légèrement rembrunies ou concolores. — Très voisin du *brunneum*, presque de la même forme; ponctué de même, cependant distinctement plus clair, pubescent de gris. Prothorax très peu plus large

que dans le *brunneum*; outre les 2 taches antérieures, il s'en trouve encore 2 autres d'un rouge ferrugineux, placées côte à côte à la base au dessus de l'écusson.

2. — *Sericoderus* Steph.

2. SERICODERUS LATERALIS Gyl. Ins. Suec. iv. 1827. 516*. — *thoracicus* Steph. Ill. Brit. II. 188. — Duv. Gen. Col. II. pl. 56. f. 280. — Long. 1 mill. — Europe : Suède, Angleterre, France, Allemagne.

Ovale court. Tête petite, entièrement cachée sous le pronotum, brune en dessus, yeux globuleux noirs; bouche et palpes pâles; antennes pâles, plus obscures en dehors. Prothorax court, en demi-cercle en devant, assez profondément bisinué à la base, avec le lobe médian arrondi et les angles aigus saillants, embrassant les épaules; convexe, égal, testacé pâle, luisant, lisse, transparent, laissant voir le noir de la tête et des yeux. Ecusson petit, arrondi, brun-testacé. Elytres plus étroites à la base que le prothorax, plus de 2 fois plus longues que lui, obtuses au bout, subtronquées, peu convexes, très finement pointillées, faiblement pubescentes, d'un testacé obscur, rembrunies à la base et sur les côtés. Propectus pâle, le reste brun, luisant, finement pointillé, anus pâle. Pattes assez courtes robustes, en entier d'un testacé pâle, postérieures très distantes à la base.

3. SERICODERUS REVELIEREI Reitr. Deuts. Zeits. 1878. 126*. — Long. 1 mill. — Corse.

Semblable au *lateralis*, mais un peu plus grand; noir de poix, prothorax de couleur plus claire avec tout le pourtour étroitement ferrugineux, bord antérieur un peu plus largement pâle, luisant. Elytres d'un obscur foncé, peu luisantes avec une sculpture plus distinctement strigueuse, alutacée-aciculée; chacune ordinairement avec une tache plus claire, ovale, indéterminée, qui manque quelquefois. Antennes, pattes, puis le dessous du prothorax jaune-ferrugineux; chaque anneau du ventre est très étroitement bordé de clair. — Se distingue du *lateralis* par la couleur générale foncée, et l'éclat des élytres moindre, parce que la sculpture foncière, qui manque dans *lateralis*, en ternit l'éclat.

Var. Noir de poix, prothorax d'un ferrugineux obscur,

avec le dos rembruni ; élytres avec une tache antéapicale ovale plus claire.

Var. Noir de poix, marge antérieure du prothorax étroitement ferrugineuse.

www.libtool.com.cn

3. — *Corylophus* Steph.

4. CORYLOPHUS CASSIDOIDES Marsh. Ent. Brit. 77. — Duv. Gen. Col. II. 234*. — Long. 1 mill. — Allemagne, France, Angleterre.

Subovale, convexe, glabre, très finement réticulé, noir de poix, prothorax, moitié postérieure des élytres, antennes et pattes d'un roux testacé ; prothorax pointillé très finement et à peine distinctement ; élytres atténuées par derrière, distinctement marquées, à un très fort grossissement, de petits points peu profonds, assez serrés.

5. CORYLOPHUS SUBLÆVIPENNIS Duv. Gen. Col. II. 234*. pl. 56. f. 281. — Long. 0,8-1 mill. — France méridionale.

Ovale, convexe, glabre, on ne peut plus finement réticulé en dessus, testacé, moitié basale des élytres au moins sur les côtés, poitrine et abdomen brunâtres ; pronotum presque lisse ; élytres légèrement atténuées par derrière, moins densément marquées, à un fort grossissement, de très petits points obsolètes. — Bien distinct du *cassidoïdes* par sa couleur plus claire, son corps un peu plus court et moins distinctement rétréci en arrière, et surtout la ponctuation moins serrée, bien plus fine et même à peine visible de ses élytres.

4. — *Gleesosoma* Woll.

Moronillus Duv.

6. GLÆOSOMA PUMILUM Reitr. Deuts. Zeits. 1884. 117*. — Long. 0,6-07 mill. — Corfou, sous l'écorce de l'ébénier.

Très semblable au *ruficollis*, de même couleur, cependant de moitié plus petit, plus ovale, un peu plus allongé avec une ponctuation plus forte.

5. — *Orthoperus* Steph.

Microsphæra Redt. — *Pitophilus* Heer.

- A. Noir ou brun-noir, réticulé en dessus.
B. Ovale-allongé, luisant.

- C. Elytres légèrement ponctuées, de moyenne taille.
 1. *brunnipes* Gyl. Eur.
 Non entièrement coloré. v. *corticalis* Redt. A.
 C'. Elytres assez fortement ponctuées à la base, grand.
 2. *punctatus* Wank. R'.
 B'. Très large, subarrondi.
 C. Elytres assez fortement ponctuées à la base, noir,
 grand. 3. *punctulatus* Rtr. Eur.
 C'. Elytres légèrement ponctuées.
 D. Points bistriguleux.
 E. Dessus luisant, de moyenne taille.
 (Rép. 77.) 4. *Kluki* Wank. R.
 E'. Dessus peu luisant, très petit. 5. *coriaceus* Rey F'.
 D'. Points simples
 E. Dessus peu luisant, très petit. 6. *anxius* Rey F'.
 E'. Dessus luisant, noir-brun, de moyenne taille.
 7. *pilosiusculus* Duv. Eur.
- A'. Jaune-brun, large.
 B. Dessus réticulé, points obsolètes, grand.
 8. *picatus* Marsh. Eur.
 B'. Dessus non réticulé, élytres assez fortement ponc-
 tuées à la base. 9. *punctum* Marsh. Eur.
7. ORTHOPERUS BRUNNIPES Gyl. Ins. Suec. 1. 185. — Heyd. Berl.
 Zeits. 1874. 118. pl. 1. f. 1. — Duv. Gen. Col. II. 236*. — *picus*
 Steph. Ill. Brit. Ent. II. 186. — *obscuratus* Pand. Perris Fr. Soc.
 Ent. 1876. 187. — *corticalis* Redt. Fn. Aust. 1858. 299. — Kr.
 Berl. 1874. 121. — Long. 0,8-1 mill. — Europe.
- Ovale court, convexe, luisant, dessus très finement ré-
 ticulé, presque glabre, noir ou brun de poix, bord apical
 des élytres le plus souvent roussâtre; pronotum plus
 fortement avancé sur l'écusson au milieu de la base et
 légèrement mais distinctement sinué de chaque côté;
 dessus, à un très fort grossissement, très finement réti-
 ticulé de petits points fins, épars, mêlés; élytres aussi
 très finement réticulées, avec de petits points fins, écartés;
 antennes et pattes d'un roux testacé.
8. ORTHOPERUS PUNCTULATUS Reitr. Deuts. Zeits. 1876. 312*. —
 Long. 1 mill. — Sous les écorces de hêtre, dans les parties basses
 du mont Hoverla, nord-est de la Hongrie.
- Taille et ponctuation du *punctatus*, mais couleur tout

autre. — Ovale-court, convexe, luisant, noir profond, une étroite bordure aux côtés du prothorax et à l'extrémité des élytres, pâle, transparente. Antennes et pattes brun-ferrugineux, massue noire. Ponctuation distincte sur le pronotum, plus forte vers la base, elle forme presque une rangée transverse, juste au devant du bord postérieur. De même, les élytres sont assez densément et distinctement ponctuées, mais la ponctuation devient un peu obsolète vers l'extrémité. — Dans le *punctatus* la partie postérieure des élytres, les segments postérieurs de l'abdomen, les antennes et les pattes sont ordinairement d'un jaune rouge, ce qui n'a pas lieu dans le *punctulatus*.

9. ORTHOPERUS CORIACEUS Rey Op. xn. 1861. 132*. — Long. 5 ; larg. 4 mill. — Collines du Lyonnais et du Beaujolais.

Ovale-court, légèrement convexe, presque glabre ; noir de poix assez brillant. Tête petite, transverse, rétrécie en avant, 3-4 fois plus étroite que la base du prothorax, inclinée, faiblement convexe, glabre, presque lisse, noir de poix assez brillant ; bouche d'un testacé plus ou moins pâle ; yeux arrondis, peu saillants, noirs, à facettes grossières. Antennes atteignant presque la base du prothorax, testacées, massue rembrunie et pilosellée, 1^{er} article grand, épaissi, arqué ; 2^e moins épais, allongé ; intermédiaires petits, graduellement plus courts ; 3 derniers formant une massue très allongée assez brusque ; 9^e obconique, 10^e un peu transverse, dernier ovale-court, obtus. Prothorax grand, transverse, de la largeur des élytres à la base, une fois moins long que large, plus étroit en avant qu'en arrière, légèrement échancré au sommet, subbisiné à la base, dont le milieu largement arrondi, légèrement arqué et presque indistinctement rebordé sur les côtés, angles antérieurs obtus, peu saillants et légèrement arrondis au sommet, postérieurs presque droits, à peine émoussés ; faiblement convexe, glabre, lisse ou très obsolètement chagriné, noir de poix assez brillant, avec les côtés graduellement un peu plus clairs. Ecusson très petit, transverse, subtriangulaire, noir de poix assez brillant. Elytres en ovale court, 2 fois plus longues que le prothorax, légèrement arrondies sur les

côtés, obtusément tronquées ou largement arrondies au sommet, faiblement convexes, glabres, d'un noir de poix assez brillant avec l'extrémité graduellement d'une teinte ferrugineuse ; très finement chagrinées et marquées d'une ponctuation très légère, assez serrée, toujours bien distincte ; épaules peu saillantes. Dessous assez convexe, glabre et lisse, brun de poix brillant, intersection des segments d'un testacé plus ou moins obscur. Pattes assez courtes, testacées ; cuisses allongées, légèrement comprimées, jambes et tarses assez grêles ; premières à peine, seconds distinctement pubescents.

10. *ORTHOPERUS ANXIUS* Rey Op. xn. 1861. 131* — Long. 0,5; larg. 0,4 mill. — Provence, sous les détritns.

Ovale court, légèrement convexe, presque glabre, obsolètement chagriné, noir de poix assez brillant. Tête petite, transverse, rétrécie en avant, trois fois plus étroite que la base du prothorax, inclinée, faiblement convexe, glabre, presque lisse, noir de poix assez brillant, bouche d'un testacé pâle; yeux médiocres, arrondis, peu saillants, noirs, à facettes grossières. Antennes assez longues, atteignant presque la base du prothorax, d'un testacé pâle, massue obscure et pilosellée, 1-2 articles grands, épaissis, oblongs, 2^e un peu plus étroit que le 1^{er}, intermédiaires petits, 3 derniers en massue allongée, 9^e obconique, 10^e transverse, dernier ovalaire, en pointe obtuse. Prothorax grand, transverse, aussi large que les élytres à la base, une fois moins long que large, bien plus étroit en avant qu'en arrière, légèrement arrondi sur les côtés avec les angles antérieurs obtus, et fortement arrondis au sommet, postérieurs presque droits et légèrement émoussés, échancré au sommet, obsolètement bisinué à la base, légèrement convexe, glabre, lisse, noir de poix assez brillant, côtés un peu plus élevés et un peu relevés. Ecusson très petit, transverse, subtriangulaire, noir de poix assez brillant. Elytres en ovale court, deux fois plus longues que le prothorax, légèrement arrondies sur les côtés, obtuses-arrondies au sommet, faiblement convexes, glabres, très finement et obsolètement chagrinées, noir de poix assez brillant, avec l'extrémité un peu plus claire,

épaules peu saillantes. Dessous assez convexe, lisse, glabre, brun de poix brillant, intersections des segments un peu plus claires. Pattes assez courtes, à peine pubescentes, d'un testacé plus ou moins obscur. Cuisses allongées, légèrement comprimées, jambes et tarses grêles, jambes antérieures coudées avant l'extrémité.

11. ORTHOPERUS PILOSIUSCULUS Duv. Gen. Col. Eur. II. 235*. — Long. 0,6 mill. — Europe : Hongrie, France : Montpellier, détritus au pied des Tamarix, dans le voisinage des étangs salés.

Ovale court, convexe, luisant, on ne peut plus finement réticulé, à pubescence très fine, éparse, brun de poix, côtés du prothorax et bord apical des élytres plus ou moins largement testacés de roux ; pronotum assez régulièrement testacé à la base, et dessus très finement réticulé et vêtu de poils courts très fins, quoique distincts ; élytres atténuées par derrière, très finement réticulées, avec de petits points écartés très obsolètes, entremêlés, et des poils courts très fins, écartés, mais bien distincts ; antennes et pattes d'un roux testacé pâle.

12. ORTHOPERUS PICATUS Marsh. Ent. Brit. 1802. 80. — Steph. Ill. Brit. II. 186. — *atomus* Gyl. Ins. Suec. I. 1808. 185. — Duv. Gen. Col. II. 236* pl. 57. 283. — Steph. Ill. Brit. II. 187. — *nigrescens* Steph. Ill. Brit. II. 187. — *truncatus* Steph. Ill. Brit. II. 187. — Long. 1 mill. — Europe.

Ovale arrondi, convexe, assez luisant, très finement alutacé, à pointillé très fin et peu serré ; brun ou roux de poix ; antennes et pattes testacé clair. — Se reconnaît à sa couleur jaune-brun, ordinairement avec un éclat moins terne et une ponctuation obsolète, plus grand que *brunnipes*, qui est plus large et plus comprimé et est moins brillant ; il se rapproche par la taille des *punctatus* et *punctulatus*.

13. ORTHOPERUS PUNCTUM Marsh. Ent. Brit. 1802. 80. — Steph. Ill. Brit. II. 186. — *atomarius* Heer Col. Helv. 433. — Duv. Gen. Col. II. 236*. — Long. 0,6 mill. — Europe.

Ovale globuleux, convexe, luisant, non réticulé en dessus, presque glabre, entièrement testacé flave ou testacé pâle ; pronotum assez régulièrement arqué à la base, et élytres, à un fort grossissement, assez densément et

distinctement marqués de petits points assez profonds; antennes et pattes pâles.

PTILIDÆ.

1. — *Hydroscapha* Le C.

1. HYDROSCAPHA GYRINOIDES Aubé Gren. Cat. 1863. 127. 155* (*Limnebius*). — Long. 0,5 mill. — France, Fréjus; Asie mineure.

Très petit, ovale, un peu allongé, plus étroit en arrière. Tête noirâtre, assez brillante, avec les antennes, la bouche et les palpes testacés. Prothorax d'un brun ferrugineux, plus clair sur les côtés, lisse, brillant, deux fois aussi large que long, plus étroit en avant où il est aussi large que la tête. Ecusson assez grand, lisse. Élytres ovalaires, tronquées en arrière, moins de deux fois aussi longues que larges, entièrement couvertes d'une ponctuation bien visible, surtout en arrière où elle est un peu plus forte et plus serrée; de chacun des points sort une petite soie très fine, assez longue et couchée. Extrémité du corps dépassant les élytres et terminée par deux petites soies raides en dessous. Tête et prothorax testacés, poitrine et abdomen noirâtres, ce dernier un peu ferrugineux à son extrémité. Pattes testacées.

2. HYDROSCAPHA GRANULUM Mots. Etud. iv. 1855. 84* (*Lymobius*). — Smyrne.

Presque deux fois plus petit que *Limnebius atomus* Duft., et plus fortement atténué postérieurement; noir, avec le prothorax et les élytres d'un roux brunâtre ou jaunâtre. Antennes, pattes et poitrine encore plus claires.

2. — *Nossidium* Er.

3. NOSSIDIUM SCAPHIDIFORME Hoch. Mosc. Bul. 1872. 215*. 2. — Long. 0,5 mill. — Russie méridionale, Kiew.

Brièvement ovale, assez convexe, noir de poix, luisant, à peine pubescent; très densément ponctué; élytres raccourcies, subtronquées, leur extrémité, les antennes et les pattes testacées. — Un peu plus court et un peu plus fortement convexe que *pilosellum*, de même largeur, un peu plus atténué en pointe par derrière. Ponctuation la même, cependant le *pubescens* la présente plus légère.

Le prothorax est au bord postérieur aussi large que les élytres, un peu rétréci également par devant. Les élytres ne couvrent pas l'extrémité de l'abdomen, et chacune est légèrement arrondie au bout, de sorte qu'elles paraissent comme tronquées; leur marge apicale est, ainsi que les antennes et les pattes, d'un brun-jaune pâle; dans les exemplaires foncés presque noirs, d'un jaune plus foncé; dans les clairs, d'un jaune plus pâle. — Cette espèce doit former un genre distinct: il a cependant les élytres tronquées, ne couvrant pas tout à fait l'abdomen, les élytres rétrécies par derrière et les proportions des autres parties du corps des *Nossidium*, il s'en éloigne par les cuisses postérieures qui sont écartées et ne sont pas entièrement couvertes par la plaque des hanches; il s'éloigne des *Ptenidium* par le prothorax large par derrière et densément serré, et surtout par la forme du corps. A première vue, il présente le faciès d'un *Scaphisoma* excessivement petit.

3. — *Ptenidium* Er.

4. PTENIDIUM LATICOLLE Hoch. Mosc. Bul. 1872. 214. 5*. — Long. 0,6 mill. — Russie méridionale, Kiew.

Voisin du *fuscicorne*, mais un peu plus grand et facile à distinguer par le prothorax fortement arrondi en dehors sur les côtés, et distinctement plus large au milieu que les élytres. — Très luisant, noir et lisse. Antennes et pattes entièrement jaune-pâle, rarement aussi le bord apical des élytres brunâtre ou jaunâtre. La plus grande largeur du prothorax se trouve un peu derrière le milieu, et en ce point il est de $\frac{1}{4}$ plus large que les élytres à la base et même encore plus large qu'elles au milieu. Elytres subovalaires, ayant leur plus grande largeur un peu avant le milieu. Les fovéoles ponctiformes particulières au genre sont souvent plus distinctes, souvent aussi plus indistinctes; on en compte tantôt 2, tantôt 4, et quelquefois il n'y en a pas trace.

5. PTENIDIUM LONGICORNE Füss. Berl. Zeits. 1868. 357. 6*. — Long. 0,8 mill. — Allemagne, Ahrweiler.

Noir luisant, très voisin pour la forme de l'*apicale*, mais distinctement plus grand, élytres plus élargies der-

rière les épaules ; pubescence sur le pronotum et les élytres plus courte et encore plus écartée. Antennes plus longues que la tête et le prothorax, brunâtres, à fond rougeâtre, dernier article garni de très longs poils gris, dressés. Tête lisse, prothorax distinctement plus étroit que les élytres dans leur plus grande largeur, angles antérieurs arrondis, postérieurs très obtus, côtés subarrondis au milieu, dessus convexe, à points épars à peine visibles, de chaque côté près des angles postérieurs avec une fossette distincte mais superficielle, au-dessus de l'écusson 2 plus petites fossettes semblables, peu perceptibles. Ecusson grand, triangulaire en pointe, nettement séparé. Elytres plus élargies en ventre sur les côtés jusqu'au tiers, que dans *apicale*, de là graduellement rétrécies jusqu'au sommet qui est d'un brunâtre transparent, et arrondies séparément ; garnies de petits points distincts, plus écartés que dans *apicale*, presque disposés en séries ; suture légèrement élevée en pli sur sa moitié postérieure. Pattes jaune-brunâtre.

6. PTENIDIUM COECUM Joseph Berl. Zeits. 1882. 46. 97*. — Long. 0,6 mill. — Carniole, grotte de Luëg.

Voisin du *laevigatum* Gilm. Er. — Sans yeux, aptère, jaune-clair, antennes de la longueur de la moitié du corps, prothorax un peu plus large que long, élytres aplaties, arrondies chacune par derrière.

4. — Ptilium Er.

7. PTILIUM LINEATICOLLE Mots. Mosc. Bul. 1868. 170*. (*Micrella*). Russie.

Forme et couleur de *discoidea* Gilm., mais plus petit, élytres plus longuement atténuées à l'extrémité et plus visiblement tronquées, pronotum plus fortement rétréci à la base, 3 lignes subparallèles, au milieu, médiane légèrement enfoncée, mais complète, les latérales plus profondes et raccourcies ; surface luisante.

8. PTILIUM FISSICOLLE Reitr. Deuts. Zeits. 1864. 116*. — Long. 0,5 mill. — Zante et Corfou.

Ovale-allongé, légèrement convexe, vêtu d'une pubescence grise, très courte, marron obscur, élytres peu plus

claires, antennes testacées largement à l'extrémité, pattes également testacées; tête plus étroite que le prothorax, en triangle court; pronotum transverse, obsolètement pointillé, canaliculé longitudinalement au milieu, brièvement en avant et au bout, non impressionné de chaque côté, arrondi latéralement, légèrement resserré à la base, angles postérieurs presque droits; écusson triangulaire, très finement et densément pointillé; élytres à peine plus larges que le prothorax, ovales-oblongues, densément et très finement pointillées, côtés légèrement arrondis, légèrement atténués du milieu au sommet; 9^e article des antennes plus étroit que le 10^e, massue subbiarticulée. — Forme et couleurs du *myrmecophilum*, cependant 2 fois plus grand; il s'éloigne des espèces voisines par le sillon médian du prothorax profond, et l'absence d'impression dorsale sur les côtés.

9. PTILIUM TENUE Kraatz Berl. Zeits. 1858. 131*. — Long. 0,4 mill.
— Grèce, Nauplie.

Très voisin du *canaliculatum*, auquel il ressemble, cependant d'une couleur plus claire, un peu plus densément ponctué et pubescent, moins luisant. Antennes jaunes. Tête, proportionnellement au prothorax, un peu plus petite que dans *tenue*; prothorax plus arrondi sur les côtés, plus rétréci par derrière; les 3 sillons dorsaux plus fins que dans le *tenue*, les latéraux moins raccourcis par devant. Ecusson plan. Elytres ovale-oblong, brun-rouge foncé, plus claires à la base, brun-jaune au bout. Pattes jaunes.

5. — *Ptinella* Mots.

10. PTINELLA BIIMPRESSA Reitr. Deuts. Zeits. 1878. 48*. — Long. 0,8 mill. — Nord de la Hongrie, Csap.

Allongé, subparallèle, déprimé, flave pâle, peu densément vêtu de poils courts, pâles. Tête grande, obtuse en devant; prothorax transverse, à peine 2 fois plus large que long, à peine plus long mais peu plus large que la tête, côtés subdilates-arrondis en devant, rétrécis vers la base, angles postérieurs obtus, dos très obsolètement râpeux, aplati et très légèrement biimpressionné; élytres assez allongées, subparallèles, moins densément couvertes

d'aspérités pointillées très fines; abdomen large, obtus-arrondi au bout. — Vient dans le groupe dont l'abdomen est à pointe arrondie obtuse : *britannica*, *testacea*, *denticollis* et *Maria*; il s'en distingue par les angles du prothorax obtus; le dos est aplati et il est marqué au milieu de 2 impressions longitudinales plus ou moins bien accusées, mais qui existent toujours; les élytres sont assez longues, presque parallèles; l'abdomen est court et non pointu.

HISTERIDÆ.

1. — *Hololepta* Payk.

1. HOLOLEPTA AMURENSIS Reitr. Deuts. Zeits. 1879. 213*. — Long. 11; larg. 5,3 mill. — Amur, un seul exemplaire ♂.

Large, parallèle, déprimé, noir, luisant, lisse. Front plan, sans strie transverse. Prothorax bisinué à la base, légèrement et régulièrement arrondi sur les côtés, avec un fin rebord distinct, angles antérieurs ♂ avec une fossette, tout au plus une trace de strie longitudinale sur le milieu du dos, très finement et éparsement ponctué sur les côtés. Ecusson très petit, en triangle allongé. Elytres aussi larges que le prothorax à la base, très peu plus longues à la suture, de chaque côté avec 2 stries dorsales raccourcies, dont l'externe est appendiculée d'un court rudiment subapical. Propygidium marqué sur les côtés de gros points épars, légers, de différentes dimensions. Pygidium très densément et fortement ponctué. Antennes noires. Jambes antérieures avec 3 grandes dents obtuses, et une seulement indiquée, les postérieures avec 3 épines dentiformes.

2. — *Platysoma* Leach.

2. PLATYSOMA SIMEANI Muls. God. Lyon Soc. Lin. xxi. 1874. 419. — Op. xvi. 1875. 85*. — Long. 5; larg. 3 mill. — Beyrouth, sous l'écorce d'un olivier.

Noir brillant. Front uni, séparé de l'épistome par une strie entière. Antennes noires, massue brunâtre. Prothorax quadrangulaire, un peu plus large que long, lisse, rayé latéralement d'une strie entière. Ecusson petit, lisse, triangulaire. Elytres 1 1/2 fois plus longues que le prothorax, de sa largeur à la base, parallèles, lisses; repli

latéral ponctué, bisillonné ; les 3 premières stries dorsales entières, plus profondes à la base qu'à l'extrémité, les 3 suivantes raccourcies, 4° au quart postérieur, 5° au tiers, 6° à la moitié. Propygidium et pygidium couverts de très gros points ocellés. Prosternum saillant, muni en devant d'un lobe largement arrondi, bordé d'une strie, visiblement pointillé. Mésosternum rebordé d'une strie entière, fortement échancré à son bord antérieur pour recevoir la base du prosternum ; côtés de la poitrine et de l'abdomen fortement et ruguleusement ponctués. Pattes d'un rouge brun, toutes les jambes armées de 3 petites dents.

3. PLATYSOMA BETULINUM Hoch. Mosc. Bul. 1872. 219. 2°. — Long. 3,8 mill. — Russie méridionale, Kiew ; assez rare, sous des écorces de bouleau.

Ovale, peu convexe, luisant, noir, pronotum légèrement ponctué, subruguleux sur les côtés, élytres à 3 stries internes raccourcies. — A peu près de la forme du *frontale*, mais toujours un peu plus petit que les plus petits exemplaires de celui-ci, se rapproche plus pour la taille, mais non pour la forme, du *depressum*, les proportions sont ici renversées : ses plus petits exemplaires sont encore beaucoup plus grands, particulièrement plus larges que le *depressum* ; il a la forme du *frontale* et l'armature des jambes du *depressum*. Le pronotum est densément et finement ponctué-strigieux longitudinalement sur une assez large bande d'avant en arrière, pas très bien limitée en dedans. Chaque élytre présente 6 stries dont les 3 externes sont entières, la 4° remonte au-delà du milieu, la 5° presque jusqu'au milieu, la 6° juxtasaturale ne l'atteint pas et est fortement raccourcie par derrière. Tous les exemplaires présentent la même disposition dans les stries, et surtout dans la forme du corps et la ponctuation, seulement dans le ♂ les hanches antérieures et les antennes, à l'exception de la massue plus obscure, sont plus ou moins rouge-brun.

3. — Pachycrærus Mars.

4. PACHYCRÆRUS ARABICUS Lewis Ent. Month. Mag. xvi. 1819. 77°. — Long. 3,8 mill. — Arabie, Jeddah.

Ovale, peu convexe, noir de poix, luisant ; antennes et

pattes d'un roux de poix ; strie du front entière ; côtés du pronotum ponctués plus fortement, dos finement, strie marginale interrompue ; élytres à stries dorsales 1-3 entières, 4-5 et suturale raccourcies ; jambes antérieures munies de 6 dents, **intermédiaires** de 5 et postérieures de 4. — Allié au *cyanescens*, mais plus parallèle, moins convexe et autrement coloré.

4. — *Hister* Lin.

5. *HISTER TURANUS* Solsky Turk. II. 1876. 223. 4°. — Long. 7,6 ; larg. 5,5 mill. — Sarafschan ; un seul.

Ovale presque carré, convexe, noir, luisant, antennes brun de poix. Front marqué de 2 impressions, strie entière, droite par devant. Pronotum transverse, peu rétréci par devant, garni de cils courts de chaque côté et bistrifié, stries entières. Elytres à stries dorsales 1-3 entières, 4° peu plus courte, 5° raccourcie avant le milieu, 6° au-delà, subhumérale interne raccourcie en devant, sans appendice ; épipleure impressionnée, bistrifiée, lisse. Propygidium ponctué de points épars à la base, lisse au bout ; pygidium assez densément et finement ponctué. Prosternum arrondi au bout, mésosternum large, assez profondément sinué, strie entière. Jambes antérieures armées de 3 fortes dents, apicale bilobée, postérieures avec 2 rangs de 5-6 dentelures épineuses.

6. *HISTER SUCCICOLA* Thoms. Skand. Col. IV. 1862. 224. 6°. — Long. 7-8 mill. — Suède, Scanie.

Allié et semblable au *cadaverinus*, certainement distinct par son impression frontale biarquée, l'avance prosternale non tronquée au bout, le sinus du mésosternum anguleux, le pygidium plus densément et plus finement ponctué, et par son habitat. — Tête bien plus petite que le prothorax, front presque lisse, impression échancrée en devant ; palpes ferrugineux. Antennes à scape épais, arqué, funicule brun de poix, massue noir-obscur. Prothorax pas plus étroit que les élytres à la base, 2 fois plus court que large, échancré au sommet, sans rebord au milieu, angles antérieurs saillants, côtés rebordés, un peu rétréci vers le bout, largement arrondi à la base, avec les angles postérieurs droits, à pointe obtuse, disque

à peine convexe, lisse, noir, avec de rares points fins sur les côtés, 2 stries latérales, interne entière subflexueuse, externe cessant un peu avant la base. Ecusson en triangle, très petit. Elytres plus longues 2 fois que le prothorax, à peine plus longues que larges, dilatées-arrondies sur les côtés, peu convexes, noires, luisantes; 6 stries dorsales, suturale raccourcie au milieu, 2^e avant, 3^e atteignant presque la base, 3 externes entières, latérales raccourcies près de l'épaule, fossette épipleurale assez profonde, très ponctuée. Propygidium couvert de points moins profonds, et d'autres plus petits; pygidium, de points serrés et très fins. Dessous du corps ponctué, lisse au milieu; prosternum à mentonnière ponctuée, légèrement abaissée en rostre, acuminée au bout; mésosternum assez profondément, presque anguleusement échancré en devant. Pattes noires, jambes antérieures 5-6 dentées, tarsi ferrugineux.

7. HISTER CHRISTOPHI Reitr. Deuts. Zeits. 1879. 214*. — Long. 5; larg. 3,5 mill. — Sibérie orientale.

Ovale, convexe, noir, luisant, antennes et pattes rouge-brun, cuisses obscures. Tête petite, front plan, avec une strie arquée, un peu sinuée par devant. Pronotum très finement ponctué, un peu plus distinctement sur les côtés, plus de 2 fois aussi large que long, convexe, rétréci par devant avec les angles antérieurs saillants; la strie marginale à peine visible, la strie latérale raccourcie au milieu, la 2^e manque. Elytres avec une strie subhumérale entière, ainsi que 4 dorsales, un rudiment de 5^e et de suturale visibles à l'extrémité; la partie antérieure des élytres rendue inégale par des sillons irréguliers, qui ne sont peut-être qu'individuels; fossette allongée des épipleures à peine ponctuée, avec un sillon. Propygidium et pygidium densément et fortement ponctués. Poitrine comme dans *marginatus*, mentonnière du prosternum plus longue et arrondie en pointe. Jambes antérieures avec 5 denticules obtus.

8. HISTER ATTICUS Schmidt Vien. Ent. Zeit. 1844. 10. 3*. — Long. 4,5-5 mill. — Attique.

Ovale, subconvexe, noir, luisant, antennes et pattes d'un brun roux. Front à strie subsinuée en devant, épis-

tome légèrement impressionné. Pronotum à strie latérale interne entière, externe courte. Elytres à stries 1-4 entières, suturale presque raccourcie au milieu, 5° courte, apicale; une tache rouge triangulaire; fossette des épipleures bisillonée; stries subhumérales nulles; la tache rouge-foncé commence à l'épaule dans le 1^{er} interstrie, limitée en dehors par la 1^{re} strie dorsale, s'étend postérieurement jusqu'aux 4/5 et touche à la strie suturale. Propygidium et pygidium à points assez fins et espacés. Jambes antérieures à dent supérieure très petite, quelquefois obsolète, apicale bifide. — Très voisin du *bissexstriatus* pour la disposition des stries, il en diffère par la coloration, la forme plus parallèle, l'épistome impressionné, les stries latérales externes du pronotum bien développées, et le mésosternum bien plus fortement échancré.

9. *HISTER FALSUS* Solsky Turk. u. 229. 10°. — Long. 6; larg. 4,2 mill. — Samarkand.

Oblong, ovale presque carré, convexe, noir, luisant, obsolètement et finement pointillé en dessus, antennes brun-roux, noirâtres à la base. Strie frontale droite en devant, subsinuée au milieu; mandibules planes en dessus, finement ruguleuses. Pronotum peu rétréci par devant, strie latérale interne entière, externe raccourcie avant le milieu. Elytres plus longues que le prothorax, strie subhumérale nulle, 1-3 dorsales entières, lisses, 4 et 6 raccourcies apicales, 5° presque nulle, 6° raccourcie de moitié; fossette épipleurale lisse, bistriée. Propygidium et pygidium moins densément ponctués, celui-ci lisse au bout. Mésosternum échancré en devant, à strie entière. Jambes antérieures 4-dentées, dent apicale bilobée; postérieures avec 7-8 denticules épineux. — *Var.* 4° et 5° stries tout à fait nulles.

5. — *Tribalus* Er.

10. *TRIBALUS ACRITOIDES* Reitr. Deuts. Zeits. 1884. 75°. pl. 1. f. 5. — Long. 1,3 mill. — Morée, Kumani.

Petit, luisant, ovale, légèrement convexe, marron; front plan, à peine perceptiblement pointillé; prothorax transverse, rétréci en devant, à rebord très fin sur les côtés,

nul devant et derrière, à pointillé très fin, très indistinct et rare, presque lisse; écusson très petit, en triangle, lisse; élytres à pointillé fin et très peu serré, sans stries sur le dos, strie submarginale bien marquée; pygidium à peine ponctué, antennes et tarses roux. — A peine le tiers du *minimus*, semblable à un grand *Acritus*; il s'éloigne de tous par son front plat.

6. — *Heterius* Er.

11. HETÆRIUS GRANDIS Reitr. Vien. Ent. Zeit. u. 1883. 143*. — Long. 3-3,2 mill. — Talysch : Rasano.

Ferrugineux obscur, subarrondi, garni de petites soies courtes et rares, cilié sur les côtés; pronotum rétréci en devant, à points denses, très fins, à peine perceptibles, sillonné de chaque côté, sinué sur les bords latéraux; élytres un peu opaques, finement striées; pattes robustes, cuisses larges.

12. HETÆRIUS LIODERUS Fairm. Pet. nouv. ent. 1877, 98; Fr. Soc. Ent. 1879. 162. 15*. — Long. 2 mill. — Algérie : Lambessa.

Ovale court, convexe, roux de poix, luisant; tête plane, ponctuée; prothorax court, deux fois plus large que long, en trapèze, rétréci en avant, angles postérieurs aigus, légèrement obliques en dehors, antérieurs largement tronqués-obliques, disque assez convexe, très finement et à peine perceptiblement pointillé, parsemé de points rares, râpeux-pilifères, accompagné sur les côtés d'une fine ligne parallèle, marge postérieure impressionnée de chaque côté; élytres globuleuses, presque carrées, à peine visiblement, assez densément pointillées, stries obliques, 3 externes plus visibles, interstries parsemés de points râpeux-piligères, rares et fins; pygidium très finement ponctué et éparsément râpeux, vilieux de roux; pattes courtes, larges, comprimées, jambes antérieures obtuses-anguleuses en dehors. — Ressemble au *cavisternus*; en diffère par le corps brillant, à ponctuation presque indistincte, le pronotum moins large, les élytres à séries de granulations villigères peu nombreuses, mais bien marquées, le pygidium bien moins ponctué; le corps est plus convexe, moins vilieux, le bord externe des jambes est plus angulé; la taille est aussi un peu plus grande.

13. *HETÆRIUS PLURISTRIATUS* Fairm. Pet. nouv. ent. 1877. 98; Fr. Soc. Ent. 1879. 164. 18°. — Long. 1,8 mill. — Algérie : Daya. Fourmières de *Myrmica testaceo-pilosa*.

Voisin du *cavisternus*, plus roux, plus luisant, presque glabre, et moins ponctué. Tête ponctué; pronotum près de trois fois plus large que long, très finement et à peine sensiblement pointillé, plus visiblement sur les côtés, sans points râpeux-villigères, plus étroit par devant, angles postérieurs peu prolongés, antérieurs obtus, bord latéral presque droit, légèrement impressionné à la base de chaque côté; élytres finement et densément pointillées, marquées de chaque côté de 3-4 stries assez visibles à la base, oblitérées postérieurement, points râpeux nuls. Pygidium densément ponctué, lisse; pattes courtes, larges, jambes anguleuses en dehors. — Un peu plus petit que *cavisternus*, plus roux, plus brillant, distinct par le corps non villeux, lisse, à ponctuation excessivement fine, sans granulations villigères, côtés du pronotum presque droits, non sinués, et stries des élytres plus marquées.

14. *HETÆRIUS ARACHNOIDES* Fairm. Pet. nouv. ent. 1877. 97; Fr. Soc. Ent. 1879. 163. 17°. — Long. 3,2 mill. — Maroc.

Ovale, atténué en avant, roux, très luisant, peu densément hérissé de longs poils roussâtres; tête très densément, assez finement ponctué, moins luisante; pronotum en carré transverse, avec les angles postérieurs aigus, saillants obliquement, séparés par un sillon oblique, antérieurs prolongés, tronqués obliquement, disque lâchement parsemé de points râpeux, convexe, côtés onduleux, étroitement rebordés; élytres convexes, beaucoup plus larges que le prothorax au milieu, à stries très obsolètes, marginale et latérale plus marquées, réunies postérieurement, interstries avec des points râpeux, en séries lâches et assez régulières; propygidium très finement ponctué, avec de faibles aspérités éparses; pattes fort allongées, comprimées, jambes antérieures à peine sensiblement anguleuses en dehors; cuisses postérieures dépassant de beaucoup l'extrémité du corps. — Ressemble à l'*hispanicus*, mais très distinct par son aspect lisse, imponctué, moins villeux, le prothorax plus étroit, presque carré,

les élytres à granulations villigères très marquées, et les pattes notablement plus grandes.

15. HETÆRIUS PLICICOLLIS Fairm. Pet. nouv. ent. 1876. 49; Fr. Soc. Ent. 1879. 163. 16*. — Long. 1,2 mill. — Algérie : Bouçada.

Un peu carré, légèrement convexe, roux, luisant; tête et prothorax densément vêtus de poils squamuleux très courts, élytres villeuses de gris, tête impressionnée au milieu; prothorax court, large, plus de deux fois plus large que long, rétréci par devant, presque droit sur les côtés, bord basal obtusément anguleux au milieu, densément et finement pointillé, avec un court sillon profond de chaque côté, l'espace entre le sillon et le côté élevé; élytres avec 3 stries à peine distinctes, plus profondes à la base, épaules plissées; propygidium et pygidium convexes, finement villeux; pattes courtes, comprimées. — Très reconnaissable à son pronotum, marqué de chaque côté à la base d'un sillon oblique, court et profond, dont le bord externe est fortement relevé, et à sa ponctuation serrée, dont chaque point émet une soie fauve très courte.

16. HETÆRIUS LÆVIDORSIS Fairm. Pet. nouv. ent. 1876. 37; Fr. Soc. Ent. 1879. 164. 19*. — Long. 2,3 mill. — Algérie : Lambessa.

Un peu carré, arrondi sur les côtés, médiocrement convexe, roux-marron, luisant, élytres un peu moins luisantes; tête finement pointillée, marquée d'une légère impression triangulaire à côtés élevés; pronotum plus de deux fois plus large que long, très rétréci par devant; obsolètement pointillé, avec une profonde impression oblique de chaque côté, espace marginal assez convexe; élytres courtes, tronquées à l'extrémité, très obsolètement pointillées, stries nulles, strie marginale obsolète; propygidium pointillé; jambes antérieures larges, arrondies en dehors, très finement denticulées au bout. — Remarquable par sa grande taille et par ses élytres à stries indistinctes.

17. HETÆRIUS LEWISI Reitr. Wien. Ent. Zeit. n. 1883. 143*. — Deuts. Zeits. 1884. 75. pl. 1. f. 4. — Long. 2,5 mill. — Morée : Kumani.

Ferrugineux obscur, luisant, à peine perceptiblement pubescent, subcilié sur les côtés; pronotum rétréci en

devant, densément et distinctement ponctué, avec un mélange de points plus grands à la partie antérieure, marqué à la base près des angles postérieurs d'une profonde fovéole triangulaire, presque droit et non sillonné sur les côtés, également convexe sur le dos; élytres densément et très subtilement ponctuées, à 4 stries raccourcies au-delà du milieu; pattes robustes, jambes larges.

18. *HETÆRIUS SETULOSUS* Reitr. Berl. Zeits. 1872. 179*. — Long. 1,8 mill. — Oran, fourmis sous les pierres, près du marabout Mouley Abd-el-Kader.

Se reconnaît par sa ponctuation dense et assez forte, et sa pubescence squamuleuse, mêlée de longues soies poilues. — Rouge-ferrugineux foncé, front ponctué de points serrés, irréguliers, côtés à rebord étroit élevé; pronotum rétréci par devant, angles postérieurs pointus, antérieurs obtus, largement tronqués et un peu réfléchis; au devant de ceux-ci, le bord latéral présente une légère sinuosité; côtés non épaissis en bourrelet, la ponctuation du dessus, pas très dense, devient plus serrée et très légèrement enfoncée au bord antérieur près des angles; bord postérieur près des angles présente une impression fovéiforme. Elytres d'un rouge ferrugineux un peu clair, à points un peu plus serrés et assez égaux sur toute la surface; près des épaules, 3 fines stries raccourcies par derrière. Pygidium finement ponctué et pubescent. Tout le dessus garni de très fines soies, qui ont l'apparence de squamules, et de plusieurs rangées de longs poils jaunes dressés, également visibles sur le pronotum. Côtés pubescents très finement et distinctement, moins densément en dessous. Postpectus longé d'un sillon longitudinal assez profond.

7. — *Eretmotes* Mars.

19. *ERETMOTES PALUMBOI* Rag. Nat. Sic. 1. 1882. 7*. — Long. 2,2 mill. — Italie: bois de Ficuzza; Castelbuono, sous une pierre avec une fourmi noire.

Arrondi, convexe, brun-roussâtre, luisant, densément ponctué, avec les antennes ferrugineuses; front légèrement relevé aux bords; prothorax transverse, convexe, avec les angles saillants et près d'eux une fossette trian-

gulaire très distincte, qui s'allonge en une impression oblongue, toute recouverte sur les côtés, et là où les points sont plus marqués, d'une pubescence soyeuse jaune assez longue. Élytres plus larges que le prothorax, et beaucoup plus larges que longues, assez convexes, avec 3 stries dorsales, dont la 1^{re} est entière, la 2^e interrompue aux 2/3 du bout, et la 3^e au milieu; recouvertes d'une ponctuation très fine, avec des poils semblables à ceux du pronotum, épars latéralement, et terminés comme un toupet à la base. Pattes garnies d'une pubescence comme celle du prothorax, mais plus courte. — Semblable à l'*ibericus*, dont il diffère par la pubescence et la ponctuation des jambes.

20. ERETMOJES TALYSCHENSIS Reitr. Wien. Ent. Zeit. n. 1883. 143*.

— Long. 2 mill. — Talysch : Rasano.

Subcylindrique, convexe, ferrugineux, luisant, garni de petites soies courtes, à pointillé très fin et peu serré; front à bord élevé, épistome concave; pronotum rebordé sur les côtés, presque droit, parallèle. angles postérieurs fortement et obliquement déprimés, antérieurs subarrondis, légèrement fovéolés; élytres peu plus larges que le prothorax, mais deux fois plus longues, subparallèles, à stries un peu irrégulières, plus ou moins divergentes par derrière; jambes anguleusement dilatées, antérieures très larges, arrondies, crénelées en dehors.

S. — *Saprinus* Er.

21. SAPRINUS BRENSKEI Reitr. Deuts. Zeits. 1884. 75*. pl. 1. f. 6.

— Long. 7 mill. — Grèce : Hagios-Vlassis.

Noir-bronzé, luisant; front plan, pointillé, strie fine, le plus souvent obsolète en devant; pronotum avec une impression sur les côtés, fortement et largement rugueux, couvert à la base de points oblongs grands et serrés; élytres marquées en dehors et postérieurement de points forts et serrés, stries dorsales 1-4 profondes, 1, 3 et 4 raccourcies de moitié, 2 dépassant de beaucoup le milieu, suturale raccourcie en avant, les deux subhumérales courtes, interne disjointe; pygidium densément et fortement ponctué, mésosternum parsemé au

milieu de points très fins, à strie entière; prosternum large, peu pointillé, stries ascendantes et très peu écartées en devant. Jambes antérieures armées de 7-8 fortes dents. — Vient près du *nitidulus*, dont il se distingue par sa couleur, sa ponctuation plus grosse et serrée, et par la longueur de la 2^e strie dorsale; intervalles entre la strie humérale et la 2^e dorsale couverts de points forts, serrés et un peu rugueux, chacune des stries dorsales 2-4 est accompagnée en dedans d'une ligne de points, la base des 2 premiers interstries est aussi ponctuée. Postpectus et prosternum très finement mais distinctement ponctués. Jambes antérieures fortement dentées.

22. SAPRINUS RUGIPENNIS Hoch. Mosc. Bul. 1872. 225, 5*. — Long. 3,8 mill. — Steppes devant Novomirgorod; sables humides.

Taille et forme des plus petits *nitidulus* ou des plus plus grands *immundus*, sa sculpture sur les élytres empêche de le confondre avec aucun autre. — Noir luisant, dessus, particulièrement les élytres, brillant d'un vert métallique, tarses, jambes et funicule des antennes, d'un brun de poix, front plan très finement et densément ponctué, sans strie transverse. Pronotum, sur les côtés et de part et d'autre au bord postérieur, assez fortement et densément ponctué, lisse, poli au milieu, sans points. Elytres densément ponctuées et finement ridées, à l'exclusion d'un espace pas très nettement limité, au milieu de la base et des côtés; les rugosités sont par ci par là plus fortes ou marquées par quelques lignes enfoncées; ces rugosités s'étendent sur la moitié antérieure des élytres d'avant en arrière et sur la moitié postérieure des côtés au milieu de la strie suturale en une légère courbe. En outre, chaque élytre présente, partant du bord antérieur, 4 stries nettes et profondes, qui sont ponctuées au fond, occupent un 5^e de l'élytre, et se terminent par derrière en points aciculés; au-dessus de ces stries qui se dirigent droit par derrière, partent les stries humérales 4 à 5 obliques, marquées légèrement par des points. On trouve encore de chaque côté près de la suture, au milieu, une ligne courte indiquée par quelques points. Jambes antérieures munies de 5-6 denticules devenant plus forts vers l'extrémité.

23. SAPRINUS FOVISTERNUS Schmidt Wien. Ent. Zeit. 1884. 9. 1*.
— Long. 3,5–3,8 mill. — Caucase, Baku.

Ovale, subconvexe, vert-obscur; front pointillé, strie interrompue; pronotum ponctué finement sur le disque, rugueusement sur les côtés, qui sont subimpressionnés; élytres ponctuéés partout, région scutellaire et épaules plus lisses, interstries ruguleux, stries dorsales raccourcies vers le milieu, 4^e réunie avec la suturale entière, subhumérale interne disjointe, externe courte; mésosternum rebordé, ponctué; prosternum bifovéolé en devant; stries divergentes en avant; jambes antérieures 7-8 denticulées. — Très semblable au *virescens*, mais vert plus foncé, quelquefois vert-bleu, pas si fortement arrondi par devant ni si convexe, et partout plus finement ponctué; pronotum ponctué très finement au milieu, plus grossièrement et rugueusement sur les côtés dans une légère impression longitudinale. Ponctuation des élytres plus fine et plus serrée que dans le *virescens*, très épars près de l'écusson et aux épaules, au contraire longitudinalement strigieuse dans les interstries; prosternum non convexe dans sa longueur, les stries sont plus divergentes que dans le *virescens* et se terminent dans une assez profonde fossette, placée tout près du bord antérieur.

24. SAPRINUS SPARSUTUS Solsky Turk. II. 238. 12*. — Long. 4,2; larg. 3 mill. — Sarafschan.

Voisin du *tenuistrius*, ovale presque carré, assez court, luisant, noir, élytres à extrémité d'un brun de poix, pattes et antennes de même couleur, massue ferrugineuse. Front densément pointillé, sans strie. Pronotum à points très fins épars au milieu, plus fortement et densément ponctué-ruguleux sur les côtés, marqué d'une impression longitudinale, terminée un peu avant l'angle postérieur par une fossette oblongue, rapprochée du bord, fovéoles postoculaires distinctes. Elytres pointillées partout, points plus fins, plus épars autour de l'écusson, plus forts, mais denses par derrière; strie suturale entière unie à la base avec la 4^e dorsale; stries dorsales raccourcies au milieu; strie humérale raccourcie par derrière non réunie avec la subhumérale interne, subhumé-

rale externe courte, basale. Pygidium assez densément ponctué. Prosternum à stries convergentes, strie mésosternale entière. Jambes antérieures 5-6 denticulées.

25. *SAPRINUS LATERISTRIOUS* Solsky Turk. n. 1876. 240. 15*. — Long. 3; larg. 2 mill. — Taschkent.

Ovale-oblong, convexe, noir de poix, luisant, antennes et pattes brun de poix, celles-ci roussâtres. Tête finement, moins densément pointillée; front marqué en avant d'une impression transverse et subcarénée de chaque côté; strie frontale interrompue au milieu. Pronotum transverse subsinué de chaque côté à la base, rétréci en courbe vers les angles antérieurs, convexe, disque très finement et moins densément, un peu plus densément et plus fortement vers les bords antérieur et latéraux, à la marge basale se trouvent mêlés de plus grands points; strie marginale entière, à laquelle s'ajoute en dedans une striole raccourcie devant et derrière, parallèle au bord latéral. Elytres peu arrondies sur les côtés, pointillées, à l'extrémité seulement vers l'angle interne, finement et éparsément; stries dorsales raccourcies un peu après le milieu, 1^{re} plus courte que les autres, 4^e se réunissant en devant avec la suturale, subhumérale interne raccourcie, réunie à l'humérale, externe marquée à la base. Pygidium couvert de points moins fins, profonds, serrés. Prosternum avec les stries latérales rapprochées peu à peu en devant. Jambes antérieures garnies de 4-5 denticules, les 3 dernières dents fortes.

26. *SAPRINUS OVILLUM* Solsky Turk. n. 1876. 240. 14*. — Long. 2,6; larg. 1,8 mill. — Sarafschan.

Ovale-oblong, convexe, noir de poix, noir-bronzé en dessus, luisant, antennes et pattes brun de poix. Front densément pointillé, avec une carène transverse obsolète en devant, strie nulle. Pronotum transverse, légèrement arrondi, à peine bisinué à la base, arrondi sur les côtés, rétréci en devant, convexe, ponctué sur le disque, finement et moins densément vers la base, d'ailleurs moins finement et densément; strie marginale entière. Elytres finement et éparsément ponctuées à l'extrémité près la suture; strie suturale entière réunie à la base en arc avec

la 4^e dorsale, dorsales raccourcies un peu derrière le milieu, 1 et 2 un peu plus courtes, subhumérale interne réunie à l'humérale, raccourcie par derrière, externe nulle. Pygidium densément ponctué. Prosternum à stries parallèles, confluentes au bout. Jambes antérieures à 5 dents, les 3 dernières fortes.

27. SAPRINUS BRUNNENSIS Fleisch. Vien. Ent. Zeit. II. 1883. 179^e.
Long. 4,5-6 mill. — Brunn.

Semblable au *lautus*, cependant plus grand et distinct surtout par la ponctuation des élytres. — Noir, luisant, sans teinte métallique, massue et tarsi rouge-brun foncé. Front densément ponctué, sans rebord par devant. Prothorax ponctué finement et éparsement sur le dos, fortement et densément rugueux sur les côtés; marqué aux angles antérieurs et postérieurs d'un faible enfoncement, avec une strie marginale très fine. Elytres entièrement ponctué, sans espace lisse luisant, comme dans le *nitidulus* et autres; ponctuation fine et éparse autour de l'écusson, plus profonde et un peu plus serrée à l'extrémité, dense et un peu rugueuse à l'épaule entre la 2^e et 3^e strie dorsale; 4 stries dorsales et une strie suturale entière, qui se réunit par un arc à la 4^e dorsale; celle-ci raccourcie au tiers, les 3 autres atteignent le milieu, sous la bossette humérale une strie humérale très courte. Pygidium assez densément et finement ponctué. Jambes antérieures avec 6-7 fins denticules. — Se distingue aisément du *nitidulus* et de ses voisins, par les élytres ponctué sur toute leur surface et la strie suturale entière.

28. SAPRINUS SPECULUM Schmidt Vien. Ent. Zeit. III. 1884. 9. 2^e.
— Long. 3 mill. — Russie, Sarepta.

Subarrondi, bronzé, très densément rugueux-ponctué en dessus; front très ponctué et caréné; pronotum avec 2 espaces lisses au-devant de l'écusson. Elytres avec les épaules et un espace scutellaire lisses; 1^{re} strie dorsale presque entière, ondulée, les autres réduites de moitié, 4^e réunie à la suturale, les 2 subhumérales distinctes; prosternum avec les stries réunies au milieu; jambes antérieures 6-denticulées. — Faciès et couleur du *specularis*, mais plus petit et un peu plus convexe; punctua-

tion frontale très dense, mais sans aucune trace de stries transverses, les 2 plaques lisses du pronotum petites et mal arrêtées, au contraire celle des élytres qui atteint le tiers de la longueur est nettement limitée par la jonction de la 4^e dorsale avec la suturale, sur toute sa longueur il n'y a pas de points dans l'interstrie sutural; la 1^{re} dorsale descend presque jusqu'à l'extrémité, subondulée à partir du milieu, les 3 autres, à peine visibles dans la ponctuation, ne vont pas jusqu'au milieu. Le prosternum forme sur sa moitié antérieure une carène aiguë, s'élargit vers la base, les 2 stries se réunissent un peu au-dessus du milieu. Les 3 dernières dents des jambes antérieures sont bien plus grandes que les autres. — Se distingue aisément du *specularis* par les plaques lisses des élytres, qui sont réunies en une, la strie suturale étant partout visible; du *Pelleti* par les 2 plaques luisantes du pronotum moins nettes et par les stries prosternales se réunissant en devant; de l'un et de l'autre par la rugosité du front entièrement obsolète et la longueur de la 1^{re} strie dorsale.

29. SAPRINUS ASPHALTINUS Hoch. Mosc. Bul. 1872. 226. 9*. — Long. 3 mill. — Russie méridionale : Kiew.

Stature et taille des plus petits exemplaires du *nitidulus*, mais il se rapproche davantage des plus grands *virescens*; il se distingue à première vue de l'un et de l'autre par sa couleur d'un noir pur, la ponctuation des élytres moins serrée et le manque de strie suturale. — Noir profond, fort luisant, seulement les tarses et les épines des jambes postérieures d'un brun de poix. Front peu convexe, finement ponctué, sans rebord élevé. Pronotum assez densément ponctué sur les côtés et près des bords antérieur et postérieur, dos lisse poli. Elytres couvertes sur la moitié postérieure de points fins assez clairsemés; strie suturale nulle, ou marquée au milieu seulement par une courte et fine rangée de points, les 5 stries dorsales obliques sont finement ponctuéées et vont jusqu'au milieu, où commence la ponctuation éparse; la 1^{re} forme en haut, vers la suture, un arc. Jambes antérieures fortement élargies vers le bout et garnies de forts denti-

cules, au nombre de 4-6, les 2 1^{ers} ont la forme de tubercules pointus ou manquent tout à fait.

30. SAPRINUS (*Gnathoncus*) PUNCTULATUS Thoms. Skand. Col. iv. 1862. 242. 2^e. — Long. 2,3 mill. — Suède, Smoland, Scanie.

Très semblable au *rotundatus*, plus petit, il se distingue par les antennes, les pattes et l'extrémité des élytres plus claires, celles-ci à points plus fins et plus rares, 3 stries dorsales intérieures atteignant à peine le milieu, suturale nulle, prothorax à peine rétréci vers le bout sur les côtés, les 2 derniers segments de l'abdomen plus finement ponctués. — Tête petite, très finement ponctuée, noire, palpes ferrugineux, mandibules brun de poix. Antennes courtes, ferrugineuses, scape à peine plus obscur à la base. Prothorax 2 fois plus court que large, à peine plus étroit que les élytres à la base, échancré au bord antérieur avec les angles subaigus; côtés droits de la base au milieu, rétrécis en devant; base bisinuée, prolongée sur l'écusson, angles droits, noir luisant, brunâtre sur les côtés, peu convexe, à points fins moins denses, un peu plus forts sur les côtés. Ecusson très petit, à peine visible. Elytres 1 1/2 fois plus longues que le prothorax, un peu arrondies sur les côtés, brunes, plus obscures vers la base, un peu lisses en avant et latéralement, postérieurement avec des points moins nombreux et profonds; interstries plans, larges, non rugueux; strie suturale nulle; 4 dorsales, 3 internes raccourcies au milieu, 4^e atteignant presque l'extrémité, humérale distincte. Propygidium transverse, pygidium grand, tous deux subdéprimés, très finement et densément ponctués. Dessous noirâtre, ponctué, lisse au milieu. Pattes d'un ferrugineux de poix, jambes antérieures 6-8 dentées.

31. SAPRINUS DISJUNCTUS Solsky Turk. II. 1876. 242. 2^e. — Long. 3,5; larg. 2,5 mill. — Samarkand.

Ovale, convexe, noir de poix, antennes et pattes à peine plus claires, tarsi roux de poix. Front très finement pointillé, strie nulle. Pronotum transverse, rétréci peu à peu par devant, bisinué à la base, finement, moins densément pointillé partout, strie marginale entière. Elytres plus longues que le prothorax, légèrement arrondies sur

les côtés, rétrécies vers le sommet, assez densément et finement ponctuées sur la moitié postérieure, lisses sur les côtés, strie suturale nulle, ou marquée seulement par un point basal, 1-4 dorsales lisses, raccourcies un peu après le milieu, 3^e arquée en dedans à la base, 4^e largement interrompue avant la base; stries humérale et sub-humérale interne courtes, disjointes, subhumérale externe marquée seulement à la base, 2 marginales. Prosternum atténué en avant, stries convergentes. Jambes antérieures 5-6 dentées.

9. — *Teretrius* Er.

32. *TERETRIUS PULEX* Fairm. Pet. nouv. ent. 1877. 161.; Fr. Soc. Ent. 1879. 162. 14°. — Long. 1,2 mill. — Tuggurth; un seul, immature.

Oblong, parallèle, assez convexe, roux-testacé, très luisant, finement et assez densément pointillé. Tête convexe, mandibules ponctuées à la base; prothorax à peine de moitié plus large que long, bord antérieur presque droit, légèrement sinué de chaque côté, base presque droite, très étroitement rembrunie ainsi que celle des élytres; élytres de la largeur du prothorax, pas plus longues, tronquées au bout, marquées le long de la suture d'une impression transverse obsolète, une strie très courte oblique de chaque côté avant les épaules; pygidium et propygidium assez densément ponctués; jambes antérieures dilatées anguleusement, 4-5 spinules. — Remarquable par sa petite taille, qui le fait ressembler à un *Acritus*; diffère du *Mulsanti* par la taille plus petite, la forme plus courte, plus convexe, la ponctuation fine partout, et le prothorax presque coupé droit.

33. *TERETRIUS HISPIDULUS* Bremi Stet. Ent. Zeit. 1855. 198°. — Long. 2,4; larg. 1,8 mill. — Suisse; sous l'écorce d'un poirier, avec les *Polyporus citrinus*.

Ovale court, large et tronqué droit. Noir profond, très luisant. Antennes et pattes, ainsi que le bord inférieur des élytres, brun-jaune. Tête plane et finement ponctuée. Pronotum fortement ponctué sur tout le dos, les points des bords latéraux et postérieur encore plus grands et plus serrés; les côtés avec un sillon fin mais distinct.

Elytres avec un fin sillon sutural, qui disparaît avant l'extrémité qui est tronquée, mais qui, en devant, à l'écusson imperceptible, diverge et finit dans une fossette piriforme; des 5 stries obliques les 3 1^{res} disparaissent avant le milieu, la 4^e atteint presque l'angle externe du bord apical, la 5^e derrière la bosse humérale s'oblique fortement vers le bord latéral; sur chaque strie on trouve une faible rangée de fines soies blanches dures et raides.

34. TERETRIUS BRUNNEUS Lewis Ent. Monthl. Mag. XVI. 1872. 78*.

— Long. 1,6 mill. — Arabie, El-Hahaz.

Cylindrique, assez allongé, brun luisant, assez densément pointillé partout; strie latérale du pronotum entière; strie oblique des élytres très courte, base et suture d'un brun de poix, lisses; jambes antérieures garnies de 6 denticules, intermédiaires de 5, postérieures dentelées au bout. — Son corps plus étroit et sa couleur le distinguent parfaitement.

10. — *Styphrus* Mots.

35. STYPHRUS CORPULENTUS Mots. Mosc. Bul. 1845. 54*. — Turcomanie.

Genre d'Histérides remarquable par son corps convexe. Le *St. corpulentus* est noir et bordé de poils roussâtres. Il est de la taille du *Saprinus nitidulus*, auquel il ressemble.

11. — *Onthophilus* Leach.

36. ONTHOPHILUS CICATRICOSUS Reitr. Deuts. Zeits. 1884. 76*. — Long. 3,5 mill. — Attique; Kumani, Hagios Vlassis.

Grand, ovale-court, convexe, un peu déprimé en dessus, noir, luisant, front très élevé au-dessus de l'épistome; pronotum à points fovéolés gros et serrés, mêlés de points plus petits, cicatrisé, marge latérale et 5 côtes longitudinales, intermédiaire interrompue et géminée en devant; élytres, marge latérale, suture et 3 fortes carènes, intervalles à 5 carénules et bisérialement crénelés; propygidium trituberculé, les tubercules extérieurs obsolètes, milieu élevé longitudinalement; pygidium inégalement fovéolé, pointillé. — Très semblable au *sulcatus* F., un peu plus grand, tout noir, pronotum densément marqué

Nouveau Répertoire III. — 1884.

5

de très gros points fovéolés, avec quelques petits points entremêlés; carène médiane ordinairement simple à la base, rarement sillonnée; tandis que dans le *sulcatus* il est partagé en 2 carènes par un profond sillon; propygidium marqué au milieu d'une forte bosse longitudinale; élytres légèrement impressionnées avant le milieu.

37. ONTHOPHILUS ORDINARIUS Lewis Ent. Month. Mag. xvi. 1878.
78°. — Long. 3 mill. — Irkutsk, sud de la Sibérie.

Suborbiculaire, gibbeux en dessus, noir, subopaque, ponctué, antennes et pattes d'un ferrugineux de poix, massue rousse; front avec une faible carène triangulaire; pronotum à marge latérale élevée, 6 côtes raccourcies, 4 externes sur le disque, 2 antérieures au milieu; stries des élytres 1, 3, 5 un peu élevées, 2, 4 et suturale obsolètes, interstries bisérialement ponctués; propygidium ponctué, caréné, un peu élevé au milieu. — La convexité et la forme générale du dessus le rapprochent de l'*alternatus*, mais il n'en a pas la sculpture et les sillons profonds; les stries ne sont pas plus marquées que dans l'*exaratus*.

12. — *Abraeus* Leach.

38. ABRAEUS CONVEXUS Reitr. Vien. Ent. Zeit. 1884. III. 8°. —
Long. 1,5-1,9 mill. — Attique; Syrie; Caïfa.

Subarrondi, convexe en dessus, noir, luisant, glabre. Tête et pronotum ponctués densément et finement, élytres un peu plus fortement. Pronotum sans ligne arquée transverse au milieu près de la base, cependant comme dans la plupart, tout à la base au-devant de l'écusson, quelques points allongés, plus grands, placés sur une ligne transversale. Ecusson à peine visible. Elytres marquées sur les côtés de 2 stries très obsolètes, dont l'externe plus courte que l'interne. Dessous noir, luisant, ponctué comme le dessus, seulement les segments du ventre, à l'exception du 1^{er}, alutacés-réticulés, et à peine distinctement ponctués. Prosternum large, transverse, s'élargissant un peu par devant, tronqué à la base, sans strie marginale sur les côtés. Bord antérieur du mésosternum entièrement rebordé. Pattes d'un brun noirâtre, jambes postérieures étroites, les antérieures élargies au

milieu, arrondies en dehors, sans former d'angle au milieu.

39. ABRÆUS AREOLATUS Reitr. Brünn. xxii. 1883. Sépar. 5*. —

Long. 1,5 mill. — Hamarat.

Très brièvement ovale, convexe, luisant, brun de poix, antennes et pattes ferrugineuses, massue des antennes testacée; tête et prothorax ponctués finement, élytres fortement et médiocrement, ces dernières avec un espace commun imponctué avant le milieu; jambes antérieures dilatées anguleusement au milieu, et au-delà subdentées.

40. ABRÆUS RADDEI Reitr. Deuts. Zeits. 1877. 292. 6*. — Var.

subplicatus Reitr. — Long. 1,5 mill. — Géorgie : Tiflis; sous les pailles, et sous l'écorce dans les montagnes de Mangliss (Caucase).

Taille et forme du *globulus*, mais peu convexe en dessus, presque légèrement déprimé, brun-ferrugineux, mat, antennes et jambes peu plus claires, pygidium un peu luisant. Dessus ponctué de points légers, pas très denses, dessous de points bien plus fins et plus serrés. Pattes assez étroites, jambes antérieures assez fortement mais non anguleusement élargies vers le milieu, de là rétrécies en courbe vers l'extrémité, ne formant d'angle nulle part. — Très voisin du *globosus*, mais plus grand, mat.

41. ABRÆUS MINUTISSIMUS Reitr. Brünn. xxii. 1883. Sépar. 5*. —

Long. 1 mill. — Lenkoran.

Très brièvement ovale, convexe, luisant, ferrugineux; tête et prothorax densément et très finement ponctués; celui-ci avec une ligne de points antéscutellaire, un peu courbe, très légèrement marquée; élytres densément et finement ponctuées; jambes antérieures larges, à peine dentées en dehors.

42. ABRÆUS PUNCTULUM Reitr. Brünn. Nat. Hist. xxii. 1883.

Sépar. 5. 11*. — Long. 0,6-0,7 mill. — Lenkoran.

Très petit, très brièvement ovale, convexe, luisant, ferrugineux. Tête et pronotum à points peu nombreux, à peine perceptibles, presque lisse; pronotum avec une ligne antéscutellaire subarquée, légèrement marquée; élytres parsemées d'un pointillé très fin assez rare; jambes antérieures dilatées, à peine dentées au dehors.

13. — *Aeritus* Le Conte.

- A. Base du pronotum longée d'une ligne transverse de points.
- B. Dessus mat, intervalle compris entre la strie basilaire et la base du pronotum densément et finement ridé longitudinalement. 15. *rhenanus* Fuss.
- B'. Dessus luisant, intervalle entre la strie basilaire et le bord basal sans rides longitudinales.
- C. Elytres densément ponctuées, brun de poix, d'ordinaire antennes et pattes claires.
- D. Elytres avec 2 sillons distincts sur les côtés, raccourcies vers l'extrémité ; massue des antennes jaune. 7. *sulcipennis* Fuss.
- D'. Elytres sans sillons latéraux.
- E. Brun-rouge ou brun-noir, massue rouge-jaune ; jambes antérieures à peine élargies vers le bout ; prosternum un peu plus long que large, strie mésosternale non interrompue au bord antérieur.
- F. Points des élytres placés à la base d'une striole obsolette. 8. *minutus* F.
- F'. Points des élytres libres ; très petit. 9. *microscopicus* Rtr.
- E'. Brun-noir, massue noir-brun ; jambes antérieures élargies peu à peu vers l'extrémité ; prosternum beaucoup plus long que large ; strie marginale du mésosternum interrompue au bord antérieur. Ressemble beaucoup au *minutus*. 10. *nigricornis* Hofm.
- C'. Dessus non ponctué, rouge-jaune luisant, bord postérieur du pronotum finement bordé de noirâtre ; antennes et pattes jaunes. 6. *Hoffgarteni* Rtr.
- A'. Base du pronotum sans ligne de points transverse.
- B. Elytres à ponctuation à peine visible ou nulle. Ovale-allongé, rouge-jaune. 4. *atomarius* Aubé.
- B'. Elytres distinctement ponctuées.
- C. Corps allongé, presque cylindrique, éparsément ponctué, rouge-ferrugineux. (*littoralis* Ferrar.) 3. *punctum* Aubé.
- C'. Ovale-large, peu convexe, densément ponctué ; antennes et pattes rouge-ferrugineux, massue jaune-clair.
- D. Elytres avec une strie dorsale obsolète ; prosternum

près de 3 fois aussi long que large. 1. *fulvus* M.
D. Noir-brun, antennes et pattes brun-rouge; massue
grande, jaune-clair; élytres sans stries dorsales;
prosternum 2 fois aussi long que large.

www.libtool.com 2. *tataricus* Rtr.

43. ACRITUS CLARULUS Reitr. Brunn. xxii. 1883. Sépar. 5. 12*. —
Long. 0,5-0,6 mill. — Lenkoran.

Très petit, ovale-oblong, légèrement convexe, très lisse,
non ponctué, roux-testacé; pronotum sans ligne ponc-
tuée transverse le long de la base.

44. ACRITUS HOPFFGARTENI Reitr. Deuts. Zeits. 1878. 49*. — Long.
0,8 mill. — Hongrie : Szombatzag.

Ovale, assez convexe, roux-ferrugineux clair, luisant,
très lisse, massue antennaire flave clair; pronotum à
ligne de points très petits à peine perceptible, très rap-
prochée de la base, presque droite, l'extrême bord basal
noirâtre; élytres non ponctuées; mésosternum arrondi
en devant, bordé d'une strie entière, séparé du métaster-
num par une série de stries longitudinales; jambes an-
térieures sublinéaires, à peine élargies au bout. — Très
semblable à l'*atomarius*, un peu plus large, plus obtus
devant et derrière, rouge-ferrugineux beaucoup plus clair
ou rouge-jaune, massue antennaire encore plus pâle.
Dessus lisse luisant, sans points (de très fins petits points
dans l'*atomarius*); pronotum marqué au devant et très
près de la base d'une rangée transverse de points on ne
peut plus fins et très rapprochés, qui est assez droite et
facile à passer, parce que l'espace qui se trouve entre
elle et la base paraît toujours noirâtre; la présence de
cette ligne le reporte dans la 2^e division, pendant que
l'*atomarius* fait partie de la 1^{re}; prosternum comme
dans *atomarius*, mais le mésosternum est plus vite ar-
rondi par devant, et la strie marginale n'est pas inter-
rompue; le mésosternum est séparé du métasternum par
des strioles bien plus serrées, placées sur une ligne
droite transverse enfoncée.

45. ACRITUS SULCIPENNIS Fuss. Berl. Zeits. 1868. 312*. — Long.
0,6 mill. — Allemagne : Kœnigsberg.

Semblable pour la forme au *minutus*, pas si régulière-

ment ovale, les élytres étant un peu élargies au-delà des épaules; assez convexe, comme *nigricornis*, brun-noir, très luisant, avec les pattes et les antennes d'un jaune brunâtre. Tout le corps ponctué densément et très finement, plus fortement et plus éparsément sur les élytres (en dehors de l'espace basal). Prothorax marqué au devant du bord postérieur d'une ligne transverse droite de petits points; angles antérieurs droits, ponctués, postérieurs aigus. Ecusson non visible. Elytres, à la base de chaque côté près de la suture, un peu impressionnées, et en ce point très finement et à peine visiblement pointillées; du milieu du bord antérieur de chaque élytre avec un sillon net et profond allant vers le bord latéral; une ligne sulciforme un peu plus courte et plus légère va de l'épaule sur le bord latéral; où ces 2 sillons s'affaiblissent, commence entr'eux en dedans de l'épaule, une 3^e ligne semblable, s'avancant sur le bord latéral. Pygidium ponctué très densément et finement, mais distinctement. Toutes les jambes sont étroites, les antérieures arrondies au bord externe, et densément garnies de fins petits poils.

46. ACRITUS MICROSCOPICUS Reitr. Brunn. xv. 1877. 16*. — Long. 0,8 mill. — Transylvanie : mont Kerz.

Brièvement ovale, luisant, brun de poix, on ne peut plus finement et rarement pointillé, antennes et pattes testacé de poix; pronotum marqué avant la base d'une série arquée transverse de points, élytres non alutacées ni longitudinalement striguleuses, jambes antérieures légèrement dilatées vers le bout, garnies au bout de fines dentelures distinctes. — Très voisin du *nigricornis*, mais moitié aussi grand et la plus petite espèce connue, brun-clair, ponctuation du dessus encore plus fine et plus écartée; la plus grande largeur au milieu (dans le *nigricornis* derrière), jambes antérieures plus distinctement denticulées. Dans la plupart des autres espèces, elles sont garnies seulement de soies plus ou moins raides. Enfin, les points du dessus sont partout simples, tandis que dans le *nigricornis* ils sont striguleux sur les élytres.

MÉMOIRES sur les Coléoptères de l'Ancien-Monde
(Europe, nord de l'Afrique et de l'Asie), publiés
dans l'ABEILLE, qui se vendent séparément :

CARABIQUES :

Recueil des descriptions isolées (954 espèces), pages 524 ; 1880	18 fr »»
Ditomides (Mon.), p. 100 ; 1877	4.50
Pœcilus (Mon.), p. 54 ; 1876	3.»»
Amaroïdes (Mon.), p. 100 ; 1870	4.»»

HYDROCANTHARES ET PALPICORNES : Recueil des descriptions isolées (377 esp.), p. 196

7.»»

CLAVICORNES :

Paussides, Clavigérides, Psélaphides, Scydménides (Synopsis), p. 216 ; 1883	7.»»
Silphides (Précis), p. 204 ; 1884	7.»»
Anisotomes, Clambides, Corylophides, p. 60 ; 1884	2.»»
Histers malais, p. 98 ; 1864	4.50
Phalacrides, Nitidulides, Trogositides, Colyrides, Cucujides, Cryptophagides, Mycetophagides, etc. (Précis), sous presse.	
Trichopterygides (Mon.), p. 72 ; 1881	3.50
Meligethes (Synopsis), p. 36 ; 1872	2.»»
Latridiides (Synopsis), p. 178 ; 1881	5.»»

LAMELLICORNES : Glaphyrids (Mon.), p. 24 ; 1864

1.50

STERNOXES : Buprestides (Mon.), p. 540 ; 1865

18.»»

MALACODERMES :

Lycides (Mon.), p. 120 ; 1882	5.»»
Lampyrides (Révision), p. 60 ; 1884 ; 2 pl.	3.50
Téléphorides (Mon.), p. 112 ; 1864 ; 1 pl.	4.50
Malthinides (Mon.), p. 112 ; 1878	6.50
Malachides (Mon.), p. 312 ; 1877	13.»»

HÉTÉROMÈRES :

Asides (Mon.), p. 146 ; 1869	6.»»
Hélopides (Révis.), p. 80 ; 1876	5.»»
Omophilus (Synopsis), p. 44 ; 1870	1.50
Anthicides (Mon.), p. 228 ; 1879 ; 2 pl.	18.»»
Mordellides (Mon.), p. 128 ; 1876	6.50
Meloides (Synopsis), p. 4 ; 1878	»50
Mylabrides (Mon.), p. 204 ; 1870	9.»»

CURCULIONIDES :

Otiorrhynchides, Phyllobides (Mon.), p. 815, 2 vol. ; 1872 ...	36.»»
Apionides (Mon.), p. 162 ; 1864	7.50
Attelabides (Mon.), p. 21 ; 1868	1.50
Rhinomacérides (Mon.), p. 112 ; 1868	5.»»
Magdalinus (Mon.), p. 64 ; 1869	3.50
Nanophyes (Mon.), p. 48 ; 1869	3.»»

PHYTOPHAGES :

Eumolpides (Mon.), p. 38 ; 1876	1.50
Cryptocéphales (Mon.), p. 326 ; 1875	18.»»

PHYTOPHAGES (suite) :

Cyrtionides et Timarchides (Mon.), p. 108 ; 1883	5. »
Chrysomélines (Mon.), Entomoscelis, Lina, Phædon, etc., (sous presse).	
Galerucides (Mon.), p. 168. 1 pl.; 1866.....	8. »
Altivides (Mon.), p. 338 ; 1866.....	10. »
Erotylides (Mon.), p. 50 ; 1868.....	3. »
Endomychides (Mon.), p. 88 ; 1863	4.50

RÉPERTOIRE DES ESPÈCES DÉCRITES ISOLÉMENT DEPUIS 1863..... 54. »

- I. Carabiques, Hydrocanthares, Palpicornes, Brachélytres,
p. 412 ; 1871.
- II. Psélaphes, Scydmanes, Clavicornes, Sternoxes, Malaco-
dermes, p. 448 ; 1873.
- III. Térédiles, Ténébrionides, Vésicants, Curculionides, Lon-
gicornes, Phytophages, p. 456 ; 1874.

**CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE ET CONFINS (pour échan-
ges), p. 148 ; 1866.....** 2 10

INDEX DES COLÉOPTÈRES DÉCRITS DEPUIS 1866, p. 100 ; 1877 ... 3.10

LES ENTOMOLOGISTES ET LEURS ÉCRITS, p. 1-144 (12 feuilles) .. 5. »

Aubé, p. 1 ; Boheman, p. 141 ; Chaudoir, p. 6 ; Chapuis, p. 42 ;
Capiomont, p. 61 ; Dejean, p. 61 ; Erichson, p. 43 ; Eschscholtz,
p. 73 ; Fischer de Valdeheim, p. 117 ; Gebler, p. 71 ; Germar, p. 112 ;
Giraud, p. 110 ; Guérin-Ménéville, p. 75 ; Gyllenhal, p. 74 ; Haag,
p. 50 ; Kieserwetter, p. 63 ; Lacordaire, p. 11 ; Le Conte J.-E.,
p. 124 ; Le Conte J.-L., p. 124 ; Ménétrières, p. 137 ; Mulsant, p. 20 ;
Murray, p. 106 ; Olivier, p. 121 ; Perris, p. 14 ; Putzeys, p. 102 ;
Rambur, p. 100 ; Schaum, p. 51 ; Schœnherr, p. 136 ; Solier, p.
39 ; Suffrian, p. 108 ; Wollaston, p. 46.

**CATALOGUE SYNONYMIQUE DES COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN-MONDE. — La
feuille de 24 pages, 1 fr. 50 ; et pour servir d'étiquettes, 2 fr. 40. —
— 1-7 feuilles, comprenant Carabiques à Silphides inclusivement,
p. 1-144 ; 1882-1884.....** 18.50

Recueil des NOUVELLES, 1^{re} série 1-50 et 2^e série 1-50..... 12. »

Autres Mémoires d'Entomologie :

**MONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES HISTÉRIDES (1853-1862), 38 pl. (complet
très rare).....** 75. »

HISTERS NOUVEAUX (1871).... 5.50 ; — id., (1879-1880).. 2.50

HÉTÉROMÈRES DU JAPON (1876)..... 6.60

MONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES MYLABRES (1872), 6 pl. noires ... 22. »
6 pl. dont 2 colorées 26. »

SYNOPSIS DES CASSIDES DE FRANCE..... » 50

*Pour se procurer un ou plusieurs de ces ouvrages, il suffit d'en adresser le
prix en un mandat sur la Poste (avec les frais d'affranchissement en sus), à
M^r S. de MARSEUL, boul. Pereire sud, 271, Ternes-Paris. — Toute demande
de renseignements non accompagnée d'un timbre pour la réponse, sera consi-
dérée comme non avenue. — On n'envoie pas de spécimen.*

1^{er} mai 1885.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

Harvard MCZ Library



3 2044 066 304 510

www.libtool.com.cn

Digitized by Google

www.libtool.com.cn